

فلوموسيل®

زامبون

التركيب

العنصر الفعال: أسيتيلسيسين Acetyl cysteine

الأسوقة

حبوب الدواء: النكهات. أسبرتام. سُربريتول.

الأقراص الفوارة: النكهات. أسبرتام.

شراب معد للاستعمال: النكهات. سكرين. الماء الحافظة: E211, E218.

الأقراص المغلفة حراريًّا: الأسوجة في الفرض.

شكل الدواء وكمية العنصر الفعال في كل وحدة

حبوبات في مغلفٍ ١٠٠ و ٢٠٠ ملء من الأسيتيلسيسين.

الأقراص الفوارة ٢٠٠ و ٤٠٠ ملء من الأسيتيلسيسين.

شراب معد للاستعمال ١٠٠ ملء من أسيتيلسيسين/٥ مل

الأقراص المغلفة حراريًّا ١٠٠ ملء من الأسيتيلسيسين.

دواعي الاستعمال/إمكانات الاستعمال

كل أنواع إلتهابات الجهاز التنفسي التي تؤدي إلى إفرازات كثيفة يصعب بصفتها على غرار الالتهاب الشعبي الحاد والمزمن. إلتهاب الحنجرة. إلتهاب الجيوب. إلتهاب الرغامي. الزكام. الربو الشعبي ولليفة الكيسية (كلاعِج إضافي).

الجرعات/طريقة الاستعمال

الجرعة العادمة في حالات الأمراض الحادة.

الأطفال بين ٢ و ١٢ سنة: ٣ مرات في اليوم، مغلف واحد ١٠٠ ملء أو ٥ مل من الشراب المعد للاستعمال أو مرتين في اليوم بعده ٢٠٠ مل.

الأطفال ما فوق ١٢ سنة والبالغون: ٦٠٠ ملء في اليوم. يتم تناولها دفعة واحدة أو على عدة دفعات (على سبيل المثال: ٣ جرعات بعده ٢٠٠ ملء أو ١٠ مل من الشراب المعد للاستعمال).

الجرعات الخاصة

العلاج لمدة طولية: ٤٠٠ - ٦٠٠ ملء في اليوم موزعة على دفعة واحدة أو على عدة دفعات. ومتى المدة

القصوى للعلاج من ٣ إلى ٦ أشهر.

في حال لم يختفي الإفراز المفرطة للمادة المخاطية وما يرافقه من سعال بعد علاج لمدة أسبوعين. ينبغي

مراجعة الطبيب حتى يفترض لكم بدقة السبب ويستبعد مثلاً مرضًا خبيثًا من الجهاز التنفسي.

اللبلة الكيسية: مثل ما ذكر سابقاً. للأطفال إبتداءً من عمر ٦ سنوات. تناول الدواء ٣ مرات في اليوم

بجرعة ٦٠٠ ملء ما يوازي ١٠ مل من الشراب المعد للاستعمال أو جرعة واحدة في اليوم بقدر ٦٠٠ ملء.

تذويب محتوى المغلف أو القرص الفوار في كوب ماء بارد أو ساخن. لا ينصح بتذويب دواء فلوموسيل مع

غيره من الأدوية في الماء.

إن رائحة الكبريت الخفيفة التي تنبع من فتح المغلف أو تتبخر سريعاً ليس لها أي تأثير على مفعول الدواء.

موانع الاستعمال

الأطفال دون عمر السنين

حساسية مفرطة على الأسيتيلسيسين أو على غيره من الأسوجة.

قرحة هضمية فعالة.

بواسل تخلفي حبيبات الدواء. أقراص فوار. بسبب السواغ أسبرتام الذي يتحول إلى فينيلالاتين).

حساسية مفرطة على الفروكتوز في حالة النقص الوراثي في السكر مثلاً. ديفوسفاتاز (بسبب

محلّي الدواء سُربريتول الذي يتحول إلى فروكتوز).

شراب معد للاستعمال: حساسية مفرطة بارزة على: E218, E211. حساسية متشابكة.

خذيرات واحتياطات

موانع الاستعمال النسبية

الأقراص الفوار والأقراص المغلفة حراريًّا ٦٠٠ ملء: الأطفال ما دون ٦ سنة (الأطفال الذين يعانون من اللبلة الكيسية: ما دون ٦ سنوات).

إن تناول مضادة للسعال بالتزامن مع هذا الدواء غير مستحب طبياً (انظر "خذيرات واحتياطات").

خذيرات واحتياطات

ينبغي توخي المذر في ما يخص المرضى الذين يواجهون خطر التزيف المغوي (مثلاً في حال القرحة

الهضمية المستترة أو الدوالى في الترع) نظراً إلى أن الأسيتيلسيسين الذي يوصف بتناوله

بالفم ممكن أن يسبّب التقيؤ. وبسبب خطر الإصابة بالتشنج الشعبي، ينبغي توخي المذر أيضاً في

ما يخص المرضى الذين يعانون من الربو الشعبي مصحوباً بنشاط شعبي ذي ردة فعل مفرطة.

مع بروز مظاهر الحساسية المفرطة والتشنج الشعبي ينبغي الكشف سريعاً عن تناول الدواء وأخذ

المذكرة الملائمة عند الإقتضاء. يمكن لوصف مضادة للسعال بالتزامن مع هذا الدواء أن يؤدي إلى خلق

من شأنه أن يزيد السعال وينتظم المجرى التنفسية (انظر "موانع الاستعمال النسبية").

ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم ولا يسمح لهم البتة بتناول الملح أن

يتخروا المذر وينتهيوا إلى أن كل قرص فوار ٢٠٠ و ٤٠٠ ملء من الأسيتيلسيسين يحتوى على ما

يقارب ١٤٠ ملء من الصوديوم (ما يعادل ٣٥٠ ملء من NaCl). في حالات مائلة. ينصح بوصف دواء

فلوموسيل على شكل حبات وفرضيات تذوب تحت اللسان أو شراب معد للاستعمال أو أي دواء آخر

يحتوى على مادة الأسيتيلسيسين ولا يحتوى على الملح.

التفاعلات الدوائية

بسبب تفاعل عنصريول الأساسية مع الأسيتيلسسي مع المضادات الحيوية كالأمبيسالين

والتراسيكلينات والمكاروليدات والسيفالوسيورينات والأمينوغликوزيدات والأمفوتيرسين عندما يحتلة

الأسيتيلسسي مباشرةً مع هذه المادة (محلول الرذاذ. الحقن المتواصل. إلخ...). ينبغي الإشارة في ما

يخص الأموكسيسيلين إلى أنه عندما يتزامن تناوله مع الأسيتيلسسي ميزداد مستوى النسيجي.

عندما يتم تناول الأسيتيلسسي بالفم بالتزامن مع هذه المضادات الحيوية يجب مراعاة التأثيرات

بعد نحو ساعتين على تناول هذه الأدوية.

مع الاستعمال المتزامن لنيترات الكلبسول قد يزداد مفعول موسع العروق وممانع ختم الريقيات الدموية.

الاستعمال المتزامن لمضادة السعال: راجع "خذيرات واحتياطات".

الحمل والإرضاع

الحمل

لم تُظهر الدراسات حول عدد محدد من النساء الحوامل أي تأثيرات سلبية غير مستحبة على الحمل

أو على صحة الجنين أو المولود. لم يُجْرَ أي اختبارات للدراسات الوبائية. لم تُظهر الاختبارات الجنينية

أي سمية مباشرة أو غير مباشرة لها تأثير على الحمل أو على تكوين الجنين وأو تطور الجنين في مرحلة

ما قبل الولادة. ينبغي المذر من تناول الدواء خلال فترة الحمل.

الإرضاع

لا يملك دراسات حول مرور مادة الأسيتيلسسي في حليب الأم. ونظراً إلى الخطر غير الواضح تماماً

حول التأثيرات غير المستحبة على الرضيع وبالأخذ بعين الاعتبار الإفادة العلاجية لللواتي يُقْمِن بالإرضاع

ينبغي على النساء اللواتي يُوصَف لهن هذا المستحضر الطبي بشكل احتضاري خلال الإرضاع أن

يتوقفن عن الإرضاع قبل الشروع في العلاج بالفلوموسيل.

التأثير في القدرة على قيادة السيارات وتشغيل الآلات

لا يوجد لأي تأثير من هذا النوع حتى الساعة.

التأثيرات غير المستحبة

نادرًاً ما يحدث اضطرابات معدية. معوية خفيفة مثل الاحتراق في المعدة. الغثيان. القيء أو الإسهال.

وفي حالات نادرة يحدث الطفح الجلدي وأوجاع الرأس والحمى.

لدى المرضى العزفيين للأمراض. يمكن أن تستجد لديهم الحساسية المفرطة على صعيد التفاعلات

الجلدية والأعضاء التنفسية. كما يمكن أن يظهر التشنج الشعبي (راجع "خذيرات واحتياطات")

لدى المرضى الذين يعانون من الربو الشعبي ويلكون نظاماً شعبياً ذي ردّة فعل مفرطة.

يمكن للنفس أن يحمل رائحة كريهة وذلك بسبب انقسام إيدروجين الكبريت.

فرط الجرعة

لا وجود حتى الآن لأي حالات لفرط الجرعة المفرطة.

ملاحظات خاصة

لا يستعمل الدواء بعد تاريخ نهاية صلاحيته المشار إليه على العلبة بالعلامة EXP.

يحفظ الشراب المعد للاستعمال متى فتح لدّة ١٥ يوم في مكان تتراوح الحرارة فيه بين ١٥ و ٤٥ درجة مئوية.

ملاحظات متعلقة بالتخزين

يحفظ الدواء بعيداً عن الرطوبة والضوء. في درجة حرارة تقل عن ٢٥ °C.

تمت مراجعة النشرة في تشرين الأول ٢٠١٠.

المصنع:

رامبون - إيطاليا S.p.A.

صاحب إجازة التسويق:

رامبون إيطاليا S.r.l. - إيطاليا