

# رينوفلوميوسيل®

## زامبون

### ١- الإسم التجاري للمستحضر الطبي

رينوفلوميوسيل Rinofluimucil ، ٠.٥% + ١% محلول رذاذ للأنف.

### ٢- التركيبة الكمية والنوعية

١٠٠ ملغ ختوي على:

- مكونات فعالة

أسيتيلسيستين ٠.٠٠٠ غ

كبريتات توامينو هيتان ٠.٥٠٠ غ

للأسوغة. راجع الفقرة ١-٦.

### ٣- الشكل الدوائي

رذاذ للأنف. محلول.

### ٤- الخواص السريرية

#### ١-٤. دواعي الاستعمال

- التهاب الأنف الحادّ وما دون الحادّ الذي يُظهرُ بنوعٍ خاصٍّ إفرازاتٍ مخاطيّةٍ متفتّحةٍ بطينة التبدّد.

- التهاب الأنف والغشاء المخاطيّ المزمن والمُسنّري.

- التهاب الأنف المُحرّك للوعيّة الدمويّة.

- التهاب الجيوب الأنفيّة.

#### ٢-٤. الجرعة وطريقة الاستعمال

يوصفُ رينوفلوميوسيل ليوضَعُ داخلَ الجيوب الأنفيّة بواسطة الرشّ الموضوعيّ (راجع الفقرة ٦-٦).

البالغون: رشّتان في كلّ أنف من ٣ إلى ٤ مرّات في اليوم.

الأطفال ما فوق ١٢ سنة: رشّة واحدة في كلّ أنف من ٣ إلى ٤ مرّات في اليوم.

لا تزدُ على الجرعات الموصى القيام بها.

متى فُتحت الزجاجة يجب أن يُستعملَ محتواها ضمن ٢٠ يوماً.

#### ٣-٤. موانع الاستعمال

يحذّرُ من استعمال هذا الدواء لدى المرضى الذين يعانون من الحساسيّة المفرطة على أيّ من مكونات المحلول.

وعلى الأشخاص الذين يعانون من الرّزق ذات الزاوية الضيّقة وفي حالات فرط الغدّة الدرّقيّة. يجب عدم استعمال الدواء خلال العلاج بمُثبّطات أحاديّ الأمينات أو كسيدات و خلال الأسبوعين اللذين يليان العلاج.

يحذّرُ على الأطفال ما دون ١٢ سنة إستعمال هذا الدواء.

#### ٤-٤. تحذيرات واحتياطات خاصة للاستخدام

في حالة المرضى الذين يعانون من أمراض القلب وبخاصّة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يخضع إستعمال مزبل الاحتقان الأنفيّ في أيّ من الأوقات لموافقة الطبيب.

يُصرّفُ هذا المستحضر الطبيّ بحذرٍ للمرضى الذين يعانون من الربو. كما يتطلّبُ عناية خاصّة عند وصف الرينوفلوميوسيل في سنّ الطفولة علماً بأنّه يُحظّرُ استخدامه لدى الأطفال ما دون ١٢ سنة.

إنّ استعمال المستحضرات الطبيّة التي تحتوي على مقيّض العروق لفترة طويلة من شأنها أن تعيق الوظيفة الطبيعيّة لمادّة الجيوب المخاطيّة الأنفيّة وغير الأنفيّة إلى جانب إمكانيّة البدء بالإدمان على الدواء. لذلك يمكن للعلجات الموضوعيّة المتكرّرة لفترات طويلة أن تُحدّث آثاراً مضرّة.

ينبغي على هذا المستحضر أن يُستعملَ بحذرٍ لدى المسنّين ولدى الأشخاص الذين يعانون من تضخّم البروستات نظراً إلى خطر إحتباس البول.

إنّ الاستعمال ولمدّةٍ طويلةٍ بنوعٍ خاصٍّ للأدوية الموضوعيّة يمكن أن يؤدّي إلى ظاهرة الحساسيّة: في هذه الحالة.

من الضروريّ إيقاف العلاج والبدء بعلاج ملائم وفقاً للحالة. وفي غياب أيّ إستجابةٍ علاجيّةٍ كاملةٍ في غضون أيام يجب إستشارة الطبيب. على أيّ حال ينبغي ألاّ تتخطّى مدّة العلاج أسبوعاً واحداً.

قد يُدعّمُ هذا المستحضر الطبيّ وفقاً لرأي الطبيب بعلاج ملائم مضادّ للميكروبات.

إنّ هذا المستحضر الطبيّ غير صالح للاستعمال المتعلّق بالعين.

أبقوا هذا المستحضر بعيداً عن متناول الأولاد.

#### ٥-٤. التفاعلات مع الأدوية الأخرى وأشكال أخرى من التفاعلات

لم تُسجّل أيّ تفاعلات طبيّة هامّة مع المكونات الفعّالة الموجودة في هذا المستحضر الطبيّ.

#### ٦-٤. الحمل والإرضاع

ينبغي أن يُستعملَ هذا المستحضر لدى النساء الحوامل في حالات الضرورة القصوى على أن يخضع العلاج لمراقبةٍ طبيّةٍ مباشرة.

#### ٧-٤. التآثيرات على القدرة على قيادة السيارات وتشغيل الآلات

لم تُسجّل أيّ افتراضات أو مؤشّرات أنّ هذا الدواء قد يعدّل قدرة الانتباه وأوقات الارتكاسات.

#### ٨-٤. الآثار الجانبية غير المستحبة

إنّ الاستعمال المتكرّر لهذا المستحضر الطبيّ بجرعاتٍ كبيرةٍ قد يسبّبُ آثاراً جانبيّةٍ من النوع المتعلّق بعوارض المرض (على غرار إزداد سرعة الاهتياج. خفقان القلب. الرجفة. إلخ). وقد تظهرُ في بعض الأحيان حالات جفاف الأنف والحلق والطفح الجلديّ المصحوب بحبّ الشباب. تختفي هذه الآثار كليّاً مع توقّف العلاج.

#### ٩-٤. الجرعات المفرطة

في حال الإفراط في تناول الجرعة قد تظهر حالات فرط ضغط الدم الشريانيّ، رُهاب الضوء. صداع قويّ والإنقباض الصدريّ. كما يمكن ملاحظة فتور الحرارة لدى الأطفال مصحوباً بتسكين ملحوظ مما يتطلّب إتخاذ تدابير طارئة ملائمة.

#### ٥. الخصائص الصيدلانية

##### ١-٥. الخصائص المتعلقة بتأثيرات الأدوية

مجموعة الأدوية العلاجيّة: المستحضرات الطبيّة المتعلّقة بالتهاب الأنف والأغشية المخاطيّة. مزبل الإحتقان.

##### مقلّدت وديّة مشتركة. رمز R٠١AB٠٨ ATC

إنّ أنشطه مذوّب المخاط وانقباض العروق لهذا المستحضر الطبيّ تعكس الخصائص الصيدلانيّة للمكوّنات الفريدة.

إنّ الأسيتيلسيستين ينضوي في إطار نشاط المذوّب المخاطيّ الذي يتفاعل عبر خرق ترابط الدّييسالفيد للبروتينات

المخاطيّة بواسطة السولفيدريل فيسمح بذلك ببلوغ التأثير المسيلّ على الإفرازات الأنفيّة- البلعوميّة.

إنّ كبريتات توامينو هيتان هي عبارة عن أمينات مقلّدت وديّة تقوم بنشاط إنقباض العروق من خلال الاستعمال

الموضعيّ من دون أن تلحق أيّ تأثيرات عامّة على الجسم.

##### ٢-٥. الخصائص الحركية للدواء

لا تمصّن قناة الجهازية المكوّنات المنفردة للمستحضر الطبيّ في جرعاتٍ فعّالة.

##### ٣-٥. معلومات الوقاية ما قبل السريرية

أظهرت الدراسات حول إمكانيّة حدوث أيّ آثارٍ تسبّب موضعياً أو عامّة القدرة الجيّدّة على امتصاص المستحضر الطبيّ عند المناطق المخاطيّة والمصليّة.

#### ٦- الخصائص الصيدلية

##### ١-٦. قائمة بالأسوغة

كلوريد البنزالكونيوم. ديتيوتريبتول. صوديوم إديتات. فوسفات الصوديوم الثنائي الفاعلة. فوسفات الصوديوم الأحاديّ الفاعلة. إدروكسيد الصوديوم. كحول. سلولوز الهيدروكسي بروبيل ميثيل. سريبتول ٧٠٪. نكهة النعناع الطبيعيّة. مياه منقّاة ١٠٠ مل.

##### ٢-٦. عدم الملاءمة

غير معروفة حتى الآن.

##### ٣-٦. مدة الصلاحية

٣٠ (ثلاثون) شهراً.

يشيرُ تاريخ إنتهاء الصلاحية إلى المستحضر الطبيّ في حال كان في إطار التخزين وغير مستعمل بعد.

متى فُتح الأنبوب لا يمكن إستعماله إلاّ خلال ٢٠ يوماً.

##### ٤-٦. إحتياطات خاصة للتخزين

يحفظ في درجة حرارة تقلّ عن ٢٥ م.

##### ٥-٦. طبيعة ومحتوى المستوعب

أنبوب زجاجيّ أصفر اللون يحتوي على ١٠ مل من المحلول مسدود بحلقيةٍ مصلّطيّةٍ من الألومنيوم مع غطاءٍ معدّ للحماية والوقاية.

تحتوي العبوة على زجاجيّ واحدة ١٠ مل. ومردّة لولبيّة ومنشور التوضيب.

##### ٦-٦. إحتياطات خاصة للاستعمال ولمعالجات أخرى

تعليمات خاصّة بفتح الزجاجة وباستخدام المردّة:

١- إفتح الزجاجة بالشدّ على جانبي الحلقة المطاطيّة بالتزامن مع فكّ اللولب.

٢- أدر المردّة لولبيّاً بعد إزالة واقي الأنبوب.

٣- أزل غطاء المردّة.

٤- إضغط على المضخّة عدّة مرّات للبدء باستعمالها.

##### ٧- المصنّع:

زامبون S.p.A. - إيطاليا

٨- صاحب إجازة التسويق:

زامبون S.p.A. - إيطاليا

تمّت مراجعة النشرة في أيار 2015