

السوانغ

بولي سوريبات، أفيسال، تيلوز، سوربيتول، متيل بارابين، بروبييل بارابين، سوكرالوز وماء نقي.

الشكل الصيدلاني

معلق في زجاجة سعة ٢٠٠ مل.

التصنيف العلاجي الدوائي

مضاد قيء، مضاد دوامين، عامل منظم لحركية المعدة.

الخصائص الدوائية

دومبيريدون هو مضاد دوامين مع خصائص مضادة للقيء.

دومبيريدون لا يعبر الحاجز الدماغي- الدموي، ولكن بسبب ارتفاع في مستويات البرولاكتين من النخامي. لقد تبين من الدراسات التي أجريت على حيوانات التجربة وجود تأثير محيطي سائد للدومبيريدون على مستقبلات الدوبامين.

يزيد الدومبيريدون من حركية المريء ويؤدي إلى تقوية عضلة فتحة المريء السفلية. يزيد من الحركية الهضمية ويسهل الاقراغ الهضمي ويسرع انتقال محتويات المعدة إلى الأمعاء، مخفضاً بذلك زمن الانتقال إلى الأمعاء الدقيقة.

دومبيريدون ليس له تأثير على الافراز الهضمي.

الحركية الدوائية

يمتص الدومبيريدون بسهولة بعد تناوله فمياً، كما يحقق أعلى تراكيز له في البلازما خلال فترة تتراوح بين ٣٠ - ٦٠ دقيقة تقريباً.

يرتبط الدومبيريدون بقوة (٩١ - ٩٣٪) ببروتينات البلازما. الدومبيريدون الفموي لا يتراكم أو يحرض استقلابه.

يتعرض الدومبيريدون إلى استقلاب كبدي شديد وسريع عن طريق نزع ن - الكيل على موقع (CYP3A4) والحلمة العطرية على موقع (CYP3A4 و CYP1A2). ينطرح الدومبيريدون في البراز (٦٦٪) وفي البول (٢١٪). أن نسبة الدواء المطروح غير المتبدل هي صغيرة (١٠٪ من الانطراح البرازي و ١٪ من الانطراح البولي تقريباً).

أن نصف العمر البلازمي بعد تناول جرعة فموية واحدة هو ٧ - ٩ ساعات تقريباً.

دواعي الاستعمال

يستعمل دوميدون شفا® في الحالات التالية :

١- اعراض عصر الهضم المعقدة والتي تترافق عادة مع تأخير في الاقراغ الهضمي، ارتجاع معدي مريئي والتهاب مريء.

- الاحساس الشرسوفي بالامتلاء، الشبع السريع، الشعور بالتمدد البطني، الألم البطني العلوي.

- التظبل، التجشؤ، النفخة.

- الغثيان والاقياء.

- حرقة في المعدة مع أو بدون قلنس لمحتويات المعدة إلى الفم .

٢- الغثيان والاقياء الوظيفي الناتج عن مصدر عضوي، انتاني أو غذائي أو محرض بواسطة العلاج بالأشعة أو علاج دوائي.

التأثيرات الجانبية

في بعض الحالات، يمكن أن يحدث جفاف فم، حكة جلدية عابرة، صداع، عطش، اسهال وعصبية. الدومبيريدون يمكن أن يحرض ارتفاع في مستوى برولاكتين البلازما مؤدياً ، في حالات نادرة، إلى ثر اللبن والتثدي عند الرجال.

الجرعة الزائدة

تتضمن اعراض الجرعة الزائدة تأثيرات على الجملة العصبية المركزية (نعاس، توهان، وتفاعلات خارج هرمية) وتأثيرات قلبية وعائية (اضطراب النظم وانخفاض الضغط).
المعالجة الداعمة هي اعطاء الفحم الفعال ومراقبة المريض.

التداخلات الدوائية

يرجى اعلام الطبيب اذا كان هناك ادوية اخرى يتناولها المريض في نفس الوقت مع دوميدون شفا®.

المحاذير

يجب تجنب تناول دوميدون شفا® عند الاطفال اقل من عمر السنة، لأن الحاجز الدماغي الدموي يكون غير مكتمل، وذلك لامكانية حدوث اعراض عصبية مركزية. يجب استخدامه بحذر عند المرضى المصابين بمضاعفات كبدية .

يجب استخدامه تحت إشراف طبي عند المرضى الذين يعانون من اضطراب التوصيل الكهربائي للقلب (خصوصاً إطالة فترة QT)، من اضطرابات كبيرة في الكهارل، أو من أمراض القلب القائمة (مثل فشل القلب الاحتقاني)؛ وخاصة عند المرضى الذين تخطوا ٦٠ عاماً والمرضى الذين يتلقون جرعات عن طريق الفم يومياً تفوق ٣٠ ملغ.

موانع الاستعمال

الحساسية المفرطة للدومبيريدون أو لأي من مكونات التركيبة.

المرضى المصابون بنزيف، ائساد آلي أو انقلاب هضمي. المرضى المصابون بورم نخاعي محذر للبرولاكتين (سرطان البرولاكتين).

استخدامه مع مثبطات CYP3A4 والتي تطيل فترة QTc.

الجرعة والاستعمال

يجب تناول دوميدون شفا® ١٥ - ٣٠ دقيقة قبل الطعام.

دومبيريدون ينبغي أن يستخدم بأقل جرعة فعالة. الاطفال ٢،٥ مل/١٠ كلغ

الكبار ١٠ مل.

يجب تناول الجرعة ٣ مرات يومياً قبل الطعام.

خض جيداً قبل الاستعمال.

الحفظ

يجب ان تحفظ جميع الادوية بعيداً عن متناول الاطفال.

يجب عدم الاستخدام عند انتهاء تاريخ الاستعمال (انتهاء التاريخ مسجل على العلبة).

يحفظ بدرجة حرارة تحت ٣٠ درجة مئوية، وبعيداً عن الضوء.