

## Caduet®

amlodipine besylate/atorvastatin calcium  
from 5mg/10mg to 10mg/80mg tablets

(كاد-ويت)

يُرجى قراءة نشرة معلومات المريض المرفقة مع كادويت قبل البدء في تناوله، وفي كل مرة تُؤخذ فيها صرفه، فربما تتجدد معلومات جديدة. لا تحل هذه المعلومات محل التحدث إلى الطبيب الخاص بك حول حاليك أو علاجك. إذا كانت لديك أية أسئلة حول كادويت، فاسأل طبيبك أو الصيدلي.

**ما هو كادويت؟**  
كادويت عبارة عن دواء لا يؤخذ إلا بوصفة طبية يشتمل على نورفاسك® (أملوديبين بيزيليت) وليبيتور® (اتورفاستاتين كالسيوم) في الفرض الواحد.  
يستخدم كادويت لعلاج البالغين الذين يحتاجون إلى نورفاسك وليبيتور.

يستخدم نورفاسك لعلاج:

- ارتفاع ضغط الدم
- وألم الصدر (الذبحة الصدرية)
- وانسداد شرايين القلب (مرض الشريان التاجي)

يستخدم ليبيتور لخفض مستويات الكوليستيرون "الضار" والدهون الثلاثية في الدم، كما يمكنه زيادة مستويات الكوليستيرون "الجيد".

يستخدم ليبيتور كذلك للحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات الدماغية والألم الصدر والحد من الحاجة البعض أنواع الجراحات القلبية، وذلك لدى المرضى المصابة بأمراض قلبية أو من لديهم عوامل خطر يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض القلبية، مثل:

- السن، التدخين، ارتفاع ضغط الدم، انخفاض مستويات الكوليستيرون "الجيد"، تاريخ عائلي للإصابة بالأمراض القلبية.

كما يمكن للبيتور أن يحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات الدماغية لدى المرضى المصابة بداء السكري وليبيتور عوامل خطر مثل:

- مشكلات بالعين أو بالكلية تتعلق بالسكري أو التدخين أو ارتفاع ضغط الدم.

لم يتم دراسة استخدام كادويت لعلاج الأطفال.

من يجب أن يمتنع عن استخدام كادويت؟

**لا تتناول كادويت إذا كنت:**

- حاملاً أو تظنين أنك حاملاً أو تخططين للحمل. يمكن أن يلحق كادويت الضرر بالجنين.
- إذا حدث أن حملت، فتوقف عن تناول كادويت واتصل بطبيبك على الفور.
- ترتعشين رضاعية طبيعية. يمكن لكادويت أن يفرز في لين الثدي وقد يضر بطفلك.
- تجنب الارضاع الطبيعي أثناء تناول كادويت.
- كنت تعاني من مشكلات في الكبد.
- تعاني من الحساسية ضد أي من عناصر كادويت. المكونات الفعالة هي أتورفاستاتين كالسيوم وأملوديبين بيزيليت. ارجع للجزء الآخر من هذه النشرة للاطلاع على قائمة كاملة بالمكونات.

**ما الذي يجب أن أخبر به طبيبي قبل تناول كادويت؟**

أخبر طبيبك بكل ظروفك الصحية، بما في ذلك إذا كنت تعاني من:

- مرض قلب
- ألم أو ضعف في العضلات
- داء المثلثي
- مشكلات في الغدة الدرقية
- مشاكل في الكلى
- أو تتعاطى أكثر من كأسين من الكحول يومياً

أخبر طبيبك بكل الأدوية التي تتناولها، سواء كانت تصرف بوصفة طبية أو دونها، بما في ذلك الفيتامينات والمكملات العشبية. قد يتفاعل كادويت مع بعض الأدوية الأخرى مسبباً آثاراً جانبية خطيرة. أخبر طبيبك خاصه إذا كنت تتناول أدوية خاصة به:

• جهازك المناعي • منع الحمل

• عداوى • فشل كلبي

• كوليستيرون • فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)

إذا كنت تتناول أو قد تناولت في آخر 7 أيام دواء يدعى حمض الفوسفديك (هو دواء لعلاج العدوى البكتيرية) عن طريق الفم أو الحقن. إن الجمع بين حمض الفوسفديك وكادويت يمكن أن يسبب مشكلات خطيرة بالعضلات (انحلال الربيدات). إذا كنت تحتاج إلى تناول حمض الفوسفديك عن طريق الفم لعلاج عدوى بكتيرية، فستحتاج إلى إيقاف استخدام هذا الدواء مؤقتاً. سيخبرك طبيبك متى سيكون آمناً أن تبدأ في تناول كادويت من جديد. قد يؤدي تناول كادويت مع حمض الفوسفديك في حالات نادرة إلى ضعف العضلات أو الشعور بالألم أو إلام بالعضلات (انحلال الربيدات).

يمكنك استخدام التنروجلسرين وكادويت معاً إذا كنت تتناول تنروجلسرين لأنم الصدر (الذبحة الصدرية)، فلا توقف عن تناوله عند تناول كادويت.

احرص على معرفة كافة الأدوية التي تتناولها، واحتفظ بقائمة بها لإطلاع طبيبك والصيدلي عليها.

**كيف يجب علىي تناول كادويت؟**

- تناول كادويت مرة يومياً، تماشاً كما أخبرك طبيبك. لا تقم بتغيير جرعتك أو إيقاف تناول كادويت دون التحدث مع طبيبك.

• تناول كادويت يومياً، في أي وقت من اليوم، واحرص على تناوله في الوقت ذاته من كل يوم. يمكن تناول كادويت مع الطعام أو دونه.

• لا تكسر الأقراص قبل تناولها. قم باستشارة طبيبك إذا كنت تواجه مشكلة في ابتلاع الأقراص.

• ينبعي أن يخضعك الطبيب لنظام غذائي منخفض الدهون قبل إعطائك كادويت.

استمر على هذا النظام الغذائي منخفض الدهون أثناء العلاج بكادويت.

إذا نسيت جرعة، خذها بمجرد تذكرها. لا تتناول جرعة كادويت الفائتة إذا ما مر أكثر من 12 ساعة على موعدها الأصلي. انتظر وتناول الجرعة التالية في لوقت المحدد لها. لا تتناول جرعةين متتاليتين من كادويت في نفس الوقت.

في حالة تناول جرعة أكبر من اللازم من كادويت عن غير قصد، اتصل بطبيبك أو يمركز مكافحة السموم أو توجه إلى أقرب قسم طوارئ.

**ما الذي يجب أن أتجنبه أثناء تناول كادويت؟**

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور واتصل بطبيبك.

تجنبي الارضاع الطبيعي. يمكن لكادويت أن يفرز في لين الثدي وقد يضر بطفلك.

**ما هي الأعراض الجانبية المحتملة لكادويت؟**

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور واتصل بطبيبك.

تجنبي الارضاع الطبيعي. يمكن لكادويت أن يفرز في لين الثدي وقد يضر بطفلك.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.

تجنبي حروث الحمل. إذا أصبحت حاملاً، فتوقف عن تناول كادويت على الفور.