نشرة العبوة: معلومات للمستخدم

لازوكسين

500 ميكروغرام/محلول للحقن 2 مل

(ديبوكسين)

يُرجى قراءة محتويات هذه النشرة بالكامل بعناية قبل البدء باستخدام هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك.
- احتفظ بهذه النشرة؛ فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي استفسارات أخرى، اسأل الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة.
- تم وصف هذا الدواء لك، ولا ينبغي إعطاؤه للآخرين، فربما يضرهم حتى لو كانوا يعانون من نفس الأعراض التي تعاني منها.
- إذا ظهرت عليك أي أعراض جانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. وتشمل هذه الأعراض الجانبية المحتملة غير مدرجة في هذه النشرة. راجع القسم 4.

محتويات هذه النشرة:

1. ما هو محلول الحقن لازوكسين ؟ وما هي دواعي استعماله
2. ما ينبغي معرفته قبل استعمال محلول الحقن لازوكسين
3. كيفية استخدام محلول الحقن لازوكسين
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية تخزين محلول الحقن لازوكسين
6. معلومات أخرى

1. ما هو محلول الحقن لازوكسين وما هي دواعي استعماله

يحتوي لازوكسين على المادة الفعالة ديبوكسين والتي تنتمي إلى مجموعة من الأدوية التي تعالج عليها أدوية المضادات الحيوية. وهي تستخدم لعلاج الالتهابات الناتجة عن أنواع معينة من البكتيريا. والمضادات الحيوية هي مضادات للبكتيريا. وتعمل هذه الأدوية من خلال تدمير البكتيريا التي تسبب المرض. والمضادات الحيوية لا تعمل ضد الفيروسات مثل نزلات البرد والأنفلونزا. ويعمل هذا الدواء من خلال تدمير بكتيريا معينة في دمك. وقد يساعد ذلك أو صديد داخل جسمك في شفاء التهاب الكبد الوبائي (ب) أو التهاب الكبد الوبائي (د) أو التهاب الكبد الوبائي (ب) الذي يصيب الجسم.

2. ما ينبغي معرفته قبل استعمال محلول الحقن لازوكسين

لا تستخدم محلول الحقن لازوكسين إذا:
- كنت تعاني من حساسية تجاه الديبوكسين أو لأي من مواد الجلوكوسايد الناشئة الأخرى أو أي من المكونات الأخرى في هذا الدواء (المذكورة في القسم 6).
- كنت تعاني من مشاكل خطيرة في القناة مثل انسداد القناة الصفراوية (انسداد القناة الصفراوية الذي يمنع تدفق الصفراء من الكبد إلى الأمعاء) أو التهاب القناة الصفراوية (التهاب القناة الصفراوية الذي يسبب ألمًا في البطن والحمى والقشعريرة).
- كنت تعاني من انتظام ضربات القلب الذي تسبب فيه المعدة بمادة المايكوكسيد القلبية أو العالات الهضمية مثل مكرمة وعيقة بارکينسون وإيلي.
- كنت تعاني من اعتلال عضلة القلب الاتساعي (تضخم عضلة القلب).

التحذيرات والاحتياطات

تحدث مع طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة قبل استعمال هذا الدواء:
- إذا كنت تستخدم هذا الدواء، فقد يطلب منك الطبيب إجراء اختبارات منتظمة للدم من أجل تحديد كمية اللازوكسين في الدم. وقد يكون هذا مهمًا بشكل خاص إذا كنت مسنًا، فقد تكون أكثر عرضة من الكبار لتطور مشاكل في الكلى.
- وفي حالة تطور شيخوخة اللازوكسين، فقد يؤدي هذا إلى انسداد متزايد من الكبد في الدم. وقد يتطلب الأمر إجراء فحوصات دم إضافية.
- إذا كنت تعاني من انسداد القناة الصفراوية، فقد يتسبب هذا في تضخم الأوعية (تضخم الأوعية الدموية) في بعض الحالات الذي. وقد يصبح الطبيب دواءً مختلفًا.
- إذا كنت تعاني من مرض بري بري (وهو الفشل الذي يتسبب في تضخم في قلبك. ت-1).
- إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل (التهاب الكبد الذي يتسبب في التهاب).
- إذا كنت تعاني من مرض عضال يصيبك بالتهاب التنفسي (الرئتين-وذلك لأنه قد يكون لديه نسبة مرتفعة من الحساسية لدواء اللازوكسين).
- إذا كنت تعاني من مرض عضال يصيبك بالتهاب التنفسي (الرئتين-وذلك لأنه قد يكون لديه نسبة مرتفعة من الحساسية لدواء اللازوكسين).
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو الكلى. قد يحتاج طبيبك إلى تعديل الجرعة الخاصة بك.