

لاميزيل®

كريم/ محلول/ رذاذ/ دريم جل

الخصائص/ الاستعمال العلاجي

ما هو لاميزيل ومتى يتم استعماله؟

لاميزيل بصيغة كريم ومحلول ورذاذ ودريم جل، هو مجموعة أدوية (عوامل مضادة للفطريات) الغرض منها علاج العدوى الجلدية التي تسببها الفطريات، مثل سعة القدم أو الأنواع الأخرى من الفطريات الجلدية السطحية أو النخالية المرقشة versicolor Pityriasis.

كما أن لاميزيل كريم هو علاج فعال ضد العدوى التي تسببها الحماثر (داء المبيضات Candidiasis الجلدي).

لاميزيل بصيغة كريم ومحلول ورذاذ ودريم جل، يثبت بسرعة بعض الأعراض مثل الاستحكاك (التلتهف للحك)، والتقشر والبقع الحمراء.

معلومات إضافية

ما هي المحطات التي يمكن اتخاذها، عدا عن العلاج؟

من أجل تفادي الإصابة بالفطريات، يجب مراعاة القواعد التالية:

قم بتغيير ملابسك كل يوم لأن من المحتمل أن تبقى الجراثيم عالقة بأجزاء من الملابس التي تلامس المناطق المصابة من الجلد.

تجنب ارتداء الملابس الضيقة أو التي تستصعب على نفوذ الهواء.

جفف الأجزاء المصابة بعناية بعد الغسيل.

في كل يوم، قم بتغيير المششفة وملابس النوم.

إذا كنت مصاباً بمرض سعة القدم، لا تمسح حافي القدمين. وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أن ترش السطوح الداخلية لجواربك وحذاءك كل يوم بمسحوق أو برذاذ فعال ضد العدوى الفطرية.

موانع الإستعمال

متى يجب عدم استعمال لاميزيل؟

لا تستعمل هذا المنتج إذا كنت مصاباً بحساسية (أرجية) من أحد مكوناته.

بما أن التجارب المتعلقة باستعمال الدواء من قبل الأطفال دون سن الـ ١٢ ما زالت محدودة، فمن غير المستحسن أن يستعمل الأطفال دون سن الـ ١٢ لاميزيل بصيغة كريم أو محلول أو رذاذ أو دريم جل.

الاحتياطات

ما هي التحذيرات التي يجب مراعاتها عند استعمال لاميزيل؟

لاميزيل بصيغة كريم أو محلول أو رذاذ أو دريم جل يجب استعماله خارجياً فقط. تجنب ملامسته للعينين.

وإذا صادف أن لاسم هذا المنتج (محلول أو رذاذ أو دريم جل) العينين، يجب غسلهما بعناية بماء بارد. قم باستشارة الطبيب إذا استمر الانزعاج بعد ذلك.

لاميزيل بصيغة محلول أو رذاذ أو دريم جل يجب استعماله بحذر على الجروح المفتوحة لأن هذه المنتجات تحتوي على مادة الكحول التي يمكن أن تسبب تهيجاً.

لاميزيل بصيغة محلول أو رذاذ أو دريم جل يجب أن لا يستعمل على الوجه.

قم باستشارة الطبيب في حالة وجود مساحة واسعة من العدوى الفطرية أو عندما تشمل العدوى الأظافر.

الرجاء إبلاغ الطبيب أو الصيدلي عما إذا كنت تعاني من أمراض أو حساسيات أخرى أو كنت تستعمل أدوية أخرى داخل الجسم أو خارجه (حتى ولو كنت تستعملها بدون وصفة طبيب).

الحمل/ الإرضاع

هل يمكن استعمال لاميزيل أثناء فترة الحمل أو الإرضاع؟

فقط عندما يأذن الطبيب بذلك.

الجرعة/ طريقة الاستعمال

كيف يتم استعمال لاميزيل؟

للبالغين وللأطفال فوق سن الـ ١٢ سنة: قبل استعمال لاميزيل، اغسل بعناية الأجزاء المصابة بواسطة قطعة من القطن والماء الفاتر ثم جففها بعناية.

كريم لاميزيل: ضع كريم لاميزيل على الأجزاء المصابة والمناطق المحيطة بها ثم افركه بلطف لتأكد من تسربه فيها.

محلول/ رذاذ لاميزيل: استعمل محلول/ رذاذ لاميزيل بتنقيعه وإنفاذه بعناية إلى الأجزاء المصابة والمناطق المحيطة بها.

دريم جل لاميزيل: ضع دريم جل لاميزيل على الأجزاء المصابة والمناطق المحيطة بها ثم افركه بلطف.

فترة المعالجة العادية

للبالغين وللأطفال فوق سن الـ ١٢ سنة:

كريم لاميزيل: لمرض سعة القدم والفطريات الجلدية السطحية استعمل الدواء مرة واحدة يومياً لمدة أسبوع.

داء المبيضات Candidiasis الجلدي: استعمل الدواء مرة أو مرتين يومياً لمدة أسبوع. لداء النخالية المرقشة Pityriasis versicolor: استعمل الدواء مرة أو مرتين يومياً لمدة أسبوعين.

محلول/ رذاذ لاميزيل: لمرض سعة القدم والفطريات الجلدية السطحية استعمل الدواء مرة واحدة يومياً لمدة أسبوع واحد.

لداء النخالية المرقشة: استعمل الدواء مرتين يومياً لمدة أسبوع واحد.

دريم جل لاميزيل: لمرض سعة القدم والفطريات الجلدية السطحية وداء النخالية المرقشة: استعمل الدواء مرة واحدة يومياً لمدة أسبوع واحد.

لتجنب عدم الإصابة بالعدوى من جديد، قم باتباع العلاج كما هو مذكور أعلاه. وإذا لم يظهر أي تحسن بعد مرور أسبوع واحد، قم باستشارة الطبيب.

الرجاء مراعاة الجرعة المذكورة في نشرة المعلومات هذه أو الموصوفة من قبل طبيبك. وإذا شعرت بأن فعالية الدواء ضعيفة جداً أو قوية جداً، فالرجاء استشارة الطبيب أو الصيدلي.

الأثار الجانبية غير المرغوبة

ما هي المضاعفات الجانبية غير المرغوبة التي يمكن أن يسببها لاميزيل؟

يحدث في بعض الحالات تخرish أو احمرار أو إحساس خفيف بالحرقة على الجلد، لكن من النادر أن تؤدي هذه الأعراض إلى التوقف عن العلاج.

ومن النادر حصول ردود فعل أرجية (متعلقة بالحساسية) مثل الاستحكاك والطفح الجلدي وانتشار البقع. وإذا لاحظت ظهور أي من هذه الأعراض، قم بإيقاف العلاج واستشر طبيبك.

ملاحظات خاصة

ما الذي يجب أخذه أيضاً بعين الاعتبار؟

ينبغي حفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

كريم لاميزيل: لا يُحفظ الدواء عند حرارة تفوق ٣٠ درجة مئوية.

محلول/ رذاذ لاميزيل: لا يُحفظ الدواء عند حرارة تفوق ٣٠ درجة مئوية. لا يُحفظ في البراد/ الثلاجة.

دريم جل لاميزيل: لا يُحفظ الدواء عند حرارة تفوق ٣٠ درجة مئوية.

يجب عدم استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة بجانب الرمز <EXP>.

للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة، قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي اللذين تكون بحوزتهما معلومات تفصيلية مخصصة للعاملين بالبحال الطبي.

التكوين

الكريم: يحتوي ١ غرام من الكريم على ١٠ ملليغرام من هايدروكلورايد الترينايفين (عنصر فعال)، والكحول البنزيلي وأسوغة أخرى.

المحلول/ الرذاذ: يحتوي ١ مليلتر من المحلول/ الرذاذ على ١٠ ملليغرام من هايدروكلورايد الترينايفين (عنصر فعال) وبروبيلين غلايكول والكحول وأسوغة أخرى.

الدريم جل: يحتوي ١ غرام من الجل على ١٠ ملليغرام من الترينايفين (عنصر فعال)، والكحول البنزيلي والكحول وبيوتيل هايدروكسي توكيون (ني ٣٢١) وأسوغة أخرى.

حجم العبوات

الكريم ١٪ : أنبوب يحتوي على ٧,٥ غرام أو ١٥ غرام.

المحلول ١٪ : قنينة تحتوي على ٣٠ مليلتر.

الرذاذ ١٪ : قنينة تحتوي على ١٥ مليلتر أو ٣٠ مليلتر.

الدريم جل ١٪ : أنبوب يحتوي على ١٥ غرام أو ١٥ غرام أو ٣٠ غرام.

من مصنوعات:

الكريم | الدريم جل:

شركة نوفارتيس كونسيومر هلث المحدودة

نيون، سويسرا

الرذاذ | المحلول:

شركة نوفارتيس فارما إس إيه إس

أونينج، فرنسا

لصالح شركة نوفارتيس كونسيومر هلث المحدودة

نيون، سويسرا

تاريخ تحديث هذه المعلومات

شهر يوليو/ تموز ٢٠٠١



(هذا دواء طبي)

- الدواء الطبي هو منتج يؤثر على صحتك، وبعد استعماله بعكس التعليمات عملاً خطراً بالنسبة إليك.
- احرص على التطبيق الصارم لوصفة الطبيب وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي اشترى منه الدواء.
- يعتبر الطبيب والصيدلي من الخبراء الملمين بالطب وبتفاعله ومخاطره.
- لا تقم من تلقاء نفسك بتقطع فترة العلاج الموصوفة لك.
- لا تقم بإعادة استعمال نفس الوصفة بدون استشارة الطبيب.

احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال

اجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيدالة العرب