

## هذا الدواء

- مستحضر يوثر على صحتك، واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر. اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما خبران في الدواء وفي نفعه وضرره.
  - لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تقاء نفسك.
  - لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
  - لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

## ما هو دواء فلوميزين ومتى يجري استعماله؟

منتج دوائي لا يصرف إلا بوصفة طبية. يحتوي دواء فلوميزين على المادة الفعالة المعروفة باسم كلوريد ديكوبالينيوم، وهي مادة لها خصائص مضادة للعدوى والعدوى والفساد (مادة مطهرة). بعد إدخال أقراص فلوميزين المهبلية إلى المهبل ووضعها فيه، تتحلل هذه الأقراص وتطلق مادتها الفعالة. كلوريد ديكوبالينيوم هو مادة فعالة ضد العديد من الجراثيم المسببة للأمراض والعدوى المهبلية، مثل أنواع معينة من البكتيريا والفطريات (كانديدا). وتقتصر فعالية أقراص فلوميزين المهبلية على منطقة المهبل، وهي تستخدم لعلاج أنواع العدوى التي تسببها البكتيريا والفطريات في تلك المنطقة. في العادة يطرأ تحسن ملحوظ على حجم الإفرازات والالتهابات في غضون فترة تتراوح ما بين أربع وعشرين (24) وأثنين وسبعين (72) ساعة.

## ما الذي يجب مراعاته قبل الاستخدام؟

تم وصف هذا الدواء لك من طبيب لعلاج مرضك الحالي. إن استعمال دواء تم اختباره بطريقة خاطئة أو بجرعات غير سليمة يمكن أن يؤدي إلى إحداث مضاعفات. لذلك، يجب عليك عدم استعمال هذا الدواء أبداً من تقاء نفسك لعلاج أي أمراض أخرى وعدم إعطائه لأي شخص آخر. وحتى في حالة إصابتك بالعدوى مرة أخرى، فيجب لا استعمال أقراص فلوميزين المهبلية في علاجها بدون استشارة الطبيب.

## متى لا يسمح باستخدام دواء فلوميزين؟

يجب عدم استعمال دواء فلوميزين في حالة وجود:

- قرح على الغشاء المخاطي لبطانة الرحم أو عنق.
- حالة حساسية مفرطة للمادة الفعالة لدواء فلوميزين أو لأية مادة من مواد تركيبه.
- كما يجب عدم معالجة البنات قبل أول دورة شهرية (حيض).

## متى يجب اتخاذ الحيوطة عند استعمال دواء فلوميزين؟

إذا تم استعمال دواء فلوميزين بطريقة سلية مطابقة للتعليمات والإرشادات، فليس هناك إجراءات احتياطية يجب اتباعها. لا ينتمي فلوميزين مع وظيفة أنواع الواقي الذكري المصنوعة من اللاتكس المطاطي. لا توجد دراسات متاحة حول توازن المستحضر مع أنواع الواقي الذكري أو العازل المهبلاني وغيره من وسائل العزل غير المصنوعة من اللاتكس لذلك؛ ينبغي تجنب استخدام أنواع الواقي الذكري والعازل المهبلاني غير المصنوعة من اللاتكس بالتزامن مع فلوميزين لمدة 12 ساعة على الأقل بعد استخدام الأقراص المهبلية.

لا ينتمي فلوميزين مع الصابون أو غيره من المواد ذات الأسطح الأيونية النشطة. يجب عدم استعمال أقراص فلوميزين لعلاج أي أجزاء أخرى من الجسم.

أخرى طبيك المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملين معه بالأمور التالية:

- الأمراض الأخرى التي تعانين منها؛
- أنواع الحساسية لديك؛
- الأدوية الأخرى التي تتعاطينها أو تستخدمينها للعلاج الخارجي أو السطحي للمهبل (بما في ذلك الأدوية التي قمت بشرائه من تقاء نفسك دون استشارة طبيب).


## هل يجوز استخدام دواء فلوميزين أثناء فترات الحمل والرضاع؟

بناء على الخبرة التي تجمعت لدينا حتى هذا يومنا هذا، اتضح أنه إذا تم استعمال دواء فلوميزين بطريقة سلية مطابقة للتعليمات والإرشادات، فليس هناك أية مخاطر معروفة يخشى منها على الطفل. ومع ذلك، فمن باب الاحتياط، يجب عليك أن تمتلك قدر الإمكان عن استعمال الأدوية بصفة عامة في فترة الحمل والرضاع، أو استشيري طببك المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملين معه بشأن تلك الأدوية وإمكانية استعمالها.


## طريقة استخدام دواء فلوميزين

إذا لم يقر طببك المعالج خلاف ذلك، يتم استخدام أقراص فلوميزين كما يلي: يوضع قرص في مكان عميق داخل المهبل مساء قبيل النوم كل يوم أثناء فترة علاج طولها ستة (6) أيام.

- أغسلي يديك جيداً



- استلقي على ظهرك مع الحفاظ على ركبتيك في وضع متنه.
- أخلي القرص المهبلاني بعمق في المهبل.



يجب أن يوقف العلاج أثناء مدة الحيض، ثم استئناف العلاج بعد ذلك.

تحتوي أقراص فلوميزين على بعض المكونات التي لا تتحلل بالكامل، لذلك يمكن العثور على بقايا من القرص في الملابس الداخلية. لكن هذا ليس من شأنه التقليل من فعالية هذا الدواء.

في الحالات النادرة التي يكون فيها المهبل مرة أخرى. يمكن من المحتمل لا يتحلل قرص فلوميزين، فيخرج القرص الكامل من المهبل مرة أخرى. يمكن ترتيب القرص المهبل بقطرة واحدة من الماء قبل إدخاله إلى المهبل شديد الجفاف واستخدام فوط يومية أو فوط صحية.

لا ينصح حدوث أية آثار لونية على الملابس الداخلية. كما يجب غسل الملابس الداخلية والمناشف وفوط الغسيل ومساحيق يومياً بماء ساخن لا تقل درجة حرارته عن ستين (60) درجة مئوية. إذا نسيت استعمال دواء فلوميزين في أحد الأيام، فلا تستعمل في اليوم التالي ضعف الجرعة التي وصفها الطبيب لك من أجل تعويض الجرعة التي نسيتها. في مثل هذه الحالات، يجب عليك الاستمرار في استعمال قرص واحد كل يوم.

إذا قصرت فترة العلاج بأقراص فلوميزين عن ستة (6) أيام، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نكسة مرضية ومعاودة ظهور الأعراض المرضية مرة أخرى. ويجب الانتهاء إلى أنه غالباً ما تختفي الأعراض قبل الزوال الكامل للالتهاب. لذلك، يجب عليك الاستمرار في العلاج رغم زوال الأعراض مثل الحكة والإفرازات والرائحة.

إن استعمال أكثر من قرص من أقراص فلوميزين يومياً لا يؤدي إلى زيادة فعالية هذا الدواء، بل يمكن أن ينجم عنه زيادة الآثار الجانبية.

النرمي باستخدام فلوميزين تماماً كما وصفه لك طببك المعالج. إذا كنت تعتقدين أن هذا الدواء أضعف أو أشد مما يجب، أخبري طببك المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملين معه فوراً بذلك.

## ما هي الآثار الجانبية التي يمكن أن تترتب على استخدام دواء فلوميزين؟

يمكن أن تظهر الآثار الجانبية التالية مع استعمال أقراص فلوميزين:

إن أنواع العدوى المهبلية المختلفة تسبب عادة حكة وحرقاناً وخروج إفرازات، لكن هذه الأعراض المزعجة غالباً ما تختفي أثناء فترة العلاج مع استعمال أقراص فلوميزين.

قد تتمثل بعض الآثار الجانبية السابقة ذكرها أيضاً في الآثار الجانبية التالية مع استعمال أقراص فلوميزين:

ليس من الضروري في مثل تلك الحالات إيقاف العلاج. ولكن إذا استمرت الأعراض أو زادت شدتها، فلا بد من استشارة طببك المعالج في أقرب وقت ممكن.

شائعة تصيب من 1 إلى 10 مستخدمين من بين 100 مستخدم: إفرازات مهبلية حكة، حرقان غير شائعة (تصيب من 1 إلى 10 مستخدمين من بين 1000 مستخدم): التهاب المثانة، التهاب منطقة العانة والمهبل، العدوى الفطرية للجلد، الهرس التنسالي، الصداع، العثيان، تزيف مهبلني، احمرار المهبل، الشعور بالمهبل شديداً، تفاعلات حساسية (على سبيل المثال، طفح جلدي، حكة، احمرار)، تلف في الغشاء المخاطي المهبل.

نادرة (تصيب من 1 إلى 10 مستخدمين من بين 10000 مستخدم): جفاف مهبلني، وغيره من مصادر التوعك المهبل.

غير معروفة: ألم في البطن، قيء، إسهال، في حالة حدوث حمى، يجب إيقاف العلاج بفولوميزين.

إذا لاحظت حدوث أية آثار جانبية غير مذكورة هنا، فعليك أن تخبري طببك المعالج أو الصيدلي الذي تتعاملين معه فوراً بذلك.

## ما الذي يجب مراعاته أيضاً؟

فترقة صلاحية هذا الدواء

يراعي عدم استخدام هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المبين على عبوته.

طريقة حفظ هذا الدواء

يُحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ثلاثة (30) درجة مئوية. يجب حفظ فلوميزين داخل علبته الأصلية. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

## معلومات أخرى

إذا كان لديك أي استفسار أو أردت الحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بطببك المعالج أو بالصيدلي الذي تتعاملين معه، فهو لا يختصون بدورهم معلومات تقنية عن الدواء.

ماذا يحتوي عليه دواء فلوميزين؟

يحتوي كل قرص مهبل على:

10.0 ملغمغرام من المادة الفعالة كلوريد ديكوبالينيوم المكونات الأخرى هي لكتور أحادي الماء، سيليلوز ديفتة التلور، وмагنيسيوم ستارايت لكل قرص.

أين يمكن الحصول على دواء فلوميزين؟

وما حجم العبوات المتوفرة؟

يمكن الحصول على دواء فلوميزين من الصيدليات بناء على وصفة طبية فقط. العبوات المتوفرة بها ستة (6) أقراص.

## شركة المصنعة:

Rottendorf Pharma GmbH

Ostfelder Strasse 51-61

Ennigerloh 53-520

ألمانيا

لصالح:

medinova AG

Eggbüchlistr. 28

Zürich 8050

سويسرا

تم آخر مراجعة لهذه النشرة الداخلية في نوفمبر 2021.

380252 / 318310

380252 / 318310

25.08.22

11.37