



دليل استخدام الدواء، معلومات مخصصة للمريض

أورادوس أقراص مغلقة ه ملغ

ديسلوراتادين

يرجى قراءة هذا الدليل بالكامل بدقة قبل البدء بتناول هذا الدواء لأنه يحوي معلومات هامة بالنسبة إليكم.

- على المريض الاحتفاظ بهذا الدليل إذ قد يحتاج إلى قراءته مرة أخرى.
- إذا كنت لدى المريض أي أسئلة إضافية، ينبغي عليه أن يطرحها على الطبيب أو الصيدلي.
- تم وصف هذا الدواء للمريض فقط، لذا عليه ألا يصفه للآخرين لأنه قد يؤذيهم حتى وإن كانوا يعانون من الأعراض عينها التي يعاني منها.
- في حال ظهور لدى المريض أي آثار جانبية، يرجى منه إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بها ويشمل ذلك أي آثار جانبية لم تذكر في هذا الدليل.

في هذا الدليل:

١. ما هو أورادوس ولماذا يُستخدم
٢. ما عليك معرفته قبل استخدام أورادوس
٣. كيفية استخدام أورادوس
٤. الآثار الجانبية المحتملة
٥. كيفية حفظ أقراص أورادوس
٦. محتويات العلبة وغيرها من المعلومات

١. ما هو أورادوس ولماذا يُستخدم

يحتوي أورادوس على مادة الديسلوراتادين النشطة. هو دواء مضاد للحساسية لا يتسبب بالنعاس. يساعد هذا الدواء في السيطرة على الحساسية وأعراضها. يخفف هذا الدواء من الأعراض المصاحبة للتهاب المجاري الأنفية الناتجة عن حساسية (التهاب الأنف التحسسي) مثلاً حتى القش أو حساسية عث الغبار. تشمل هذه الأعراض العطس، سيلان أو حكة في الأنف، حكة في الحلق أو حكة، احمرار أو تورم في العينين. كما يستخدم هذا الدواء للتخفيف من الأعراض المصاحبة للشرى (حالة جلدية ناتجة عن الحساسية). تشمل هذه الأعراض الحكة والخلخايا. الإرتياح من هذه الأعراض يستمر ليوم كامل ويساعدك على استئناف الأنشطة اليومية العادية والنوم.

يوصف هذا الدواء للبالغين والمراهقين (١٢ سنة وما فوق).

٢. ما عليك معرفته قبل تناول أورادوس

لا تتناول أورادوس: إذا كنت تعاني من الحساسية (فرط الحساسية) على الديسلوراتادين أو لوراتادين أو على أي من مكونات هذا الدواء (الدرجة في القسم ٦).

تحذيرات واحتياطات:

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أورادوس:

- إذا كنت تعاني من قصور كلوي

الأولاد والمراهقون:

لا يُنصح بوصف هذا الدواء للأولاد الذين يقل عمرهم عن ١٢ عاماً.

أدوية أخرى وأورادوس:

ينبغي على المريض إبلاغ الطبيب أو الصيدلي على أي أدوية أخرى يتناولها أو تناولها في الفترة الأخيرة أو قد يتناولها بما فيها تلك التي اشتراها بدون وصفة طبيب. ما من حالات معروفة عن تفاعل هذا الدواء مع أدوية أخرى.

أورادوس مع الطعام والشراب:

يمكنك تناول أورادوس مع الطعام أو بدون.

الحمل والرضاعة:

إذا كنت متقندين أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل عليك استشارة طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء. إذا كنت حاملاً أو تقيمين بإرضاع طفل، لا يُنصح بتناول هذا الدواء.

القيادة واستخدام المكاتب

إذا تم تناول هذا الدواء حسب وصفة الطبيب، من المفترض ألا يتسبب للمريض بأي نعاس أو قلة انتباه. غير أنه في بعض الحالات القليلة، يشكو الأشخاص من النعاس مما قد يؤثر على قدرتهم على القيادة أو استخدام المكاتب.

٣. كيفية تناول أورادوس

يتعين على المريض دوماً تناول هذه الأقراص تماماً حسب وصفة الطبيب وعليه استشارته أو استشارة الصيدلي إذا لم يكن أكيداً.

البالغون والمراهقون (١٢ عاماً وما فوق) :

- يتم تناول قرص واحد يومياً.
- يتم ابتلاع القرص كامل مع الماء، مع أو بدون طعام.
- في ما يتعلق بفترة العلاج، يقوم الطبيب بتحديد نوع الحساسية التي يعاني منها المريض وتبعاً لذلك يحدد فترة العلاج التي يحتاجها.
- إذا كانت حساسية الأنف لدى المريض متقطعة (وجود أعراض لأقل من أربعة أيام في الأسبوع أو لأقل من أربعة أسابيع)، ينصح الطبيب بجدول للعلاج يعتمد على تقييم تاريخ المرض.
- إذا كانت حساسية الأنف لدى المريض متواصلة (وجود أعراض لأربعة أيام أو أكثر في الأسبوع والآخر من ٤ أسابيع)، يمكن للطبيب أن يصف علاجاً لفترة أطول.
- بالنسبة للشرى، تختلف فترة العلاج من مريض إلى آخر وبالتالي على المريض اتباع إرشادات الطبيب.

في حال تناول المريض أقراص أورادوس أكثر مما يجب

على المريض تناول الدواء حسب وصفة الطبيب. لا يتوقع وقوع مشاكل خطيرة في حال تناول جرعة زائدة عرضياً، لكن، في حال تناول المريض جرعات من هذا الدواء أكثر مما يجب، عليه الاتصال بالطبيب أو الصيدلي.

في حال نسي المريض تناول أقراص أورادوس

في حال نسي المريض تناول إحدى الأقراص في موعدها، عليه تناولها في أقرب وقت ممكن ويعود لاتباع جدول المواعيد. لا يجب تناول جرعة مضاعفة (جرعتان في الوقت نفسه) للتعويض عن القرص الذي نسي أن يتناوله.

إذا كانت لدى المريض أي أسئلة إضافية حول استخدام هذا الدواء، عليه طرحها على الطبيب أو الصيدلي.

٤. الآثار الجانبية المحتملة

شأن أقراص أورادوس شأن كافة الأدوية، فقد تتسبب بآثار جانبية على الرغم من أنها لا تحصل لغرضهم رصد حالات حساسية خطيرة (صعوبة في التنفس، صفير، حكاك، خلخايا وتورم) نادرة جداً.

في هذه الحالات على المريض طلب تدخل طبي مباشر.

لدى البالغين، كانت الآثار الجانبية مشابهة لأعراض الدواء الوهمي. غير أن حالات التعب وجفاف الحلق وآلام الرأس التي تم رصدها كانت أكثر من تلك التي تم رصدها لدى تناول الدواء الوهمي.

لقد تم رصد آثار جانبية نادرة جداً:

طفح جلدي، خفقان، ضربات قلب سريعة، آلام في المعدة، غثيان (الشعور بالغياء)، تقيؤ، اضطرابات معوية، إسهال، دوخة، نعاس، عدم قدرة على النوم، آلام في العضل، هلوسة، نوبات مرضية، أرق تصاحبه زيادة في الحركة الجسدية، التهاب الكبد، وفحوصات مخبرية تشير إلى عدم انتظام في وظيفة الكبد.

إذا واجه المريض أيًا من هذه الآثار الجانبية، عليه استشارة طبيبه أو الصيدلي. يشمل ذلك أي

آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذا الدليل.

٥. كيفية حفظ أقراص أورادوس

- يجب إبعاد هذا الدواء عن متناول الأطفال وعن مرآهم.
- يجب ألا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء صلاحيته المذكور على النشرة وعلى العلبة من الخارج والذي يشير إلى آخر يوم من الشهر المذكور.
- يجب أن تحفظ أقراص أورادوس في درجة حرارة تقل عن ٣٠° مئوية بعيداً عن الضوء والرطوبة.

- لا تستخدم علب أورادوس التي تظهر عليها علامات التضرر.

- لا يتم التخلص من أي أدوية عبر رميها في المجاري. ينبغي استشارة الصيدلي حول طريقة التخلص من الأدوية التي لم يعد المريض يستخدمها، لأن هذه الإجراءات سوف تساعد في حماية البيئة.

٦. محتويات العلبة وغيرها من المعلومات

ماذا تحوي اقراص أورادوس

-المرصدة المغطاة في أورادوس هي الديسلوراتادين.

كل قرص مغلف يحتوي على ٥ ملغ من الديسلوراتادين.

- أما المكونات الأخرى فهي ميكروكريستالين سيلولوز، نشاء الذرة، فوسفات الكالسيوم الشافي القاعدة، التالك، FD & C Blue #2 aluminium lake FD & C Red # 40 aluminium lake، كحول البولي فينيل، ثاني أكسيد التيتانيوم، صمغ الزر تان والليسيستين.

كيف تبدو اقراص أورادوس ومحتويات العلبة

هي أقراص زرقاء، مستديرة، مغلفة.

أورادوس متوفر بعلبة من ٣٠ قرص.

حامل الترخيص بالتسويق والمصنّع

فارمالين ش.م.ل - لبنان

صندوق البريد ٩٠٢٠١ جديدة المتن، لبنان

للاتصال:

رقم التسجيل بالنسبة إلى أورادوس: ١٠/١٦٧٠٩٠

إن هذا المنتج هو دواء

إن الدواء منتج يؤثر على صحتكم ويمكن أن يشكّل خطراً عليكم عند استعماله عكس التعليمات.

يجب اتباع وصفة الطبيب وتعليماته بشكل صارم ودقيق، وكذلك يجب اتباع طريقة الاستعمال

وتعليمات الصيدلاني الذي باعكم الدواء.

إن الأطباء والصيدالاء هم خبراء في الأدوية ومنافعها ومخاطرها.

لا توقف فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

لا تقم بتكرار الوصفة الطبية من دون استشارة الطبيب.

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدالاء العرب

تمت الموافقة على هذا الدليل لاستخدام الدواء في شهر أيلول من العام ٢٠١٣م

