

ثيرافلو^٢

قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية

مسحوق داخل أكياس لعمل محلول للشرب

باراسيتامول ٦٥٠ مجم +

فينيل إفرين هيدروكلوريد ١٠ مجم

اقرأ هذه النشرة بعناية لأنها تحتوي على معلومات تهمك.
هذا الدواء يمكن صرفه دون الحاجة إلى وصفة الطبيب.
مع ذلك، فإنه يتعين عليك تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية بعناية للحصول على أعلى فائدة ممكنة منه.
• احتفظ بهذه النشرة وربما تحتاج الرجوع إليها لاحقاً.
• استشر الصيدلي إذا كنت تحتاج إلى معلومات إضافية.
• استشر الطبيب إذا لم تشعر بتحسن أو ازدادت أعراضك سوءاً.
• أخبر الصيدلي أو الطبيب في حالة تطور أي من الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أي أعراض جانبية غير مذكورة في هذه النشرة.

محتويات النشرة:

١. ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية و دواعي الاستعمال
٢. احتياطات ما قبل تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية
٣. كيفية تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية
٤. الأعراض الجانبية المحتملة
٥. كيفية حفظ ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية
٦. معلومات إضافية

١. ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية و دواعي الاستعمال

ما هو ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية
ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية هو دواء يذاب في سائل ساخن و يحتوي على مسكن للألم و خافض للحرارة (باراسيتامول)، ومزيل للإحتقان (فينيل إفرين).

ما هي دواعي استعمال ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية
ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية يستخدم لعلاج أعراض البرد و الجيوب الأنفية مثل الارتفاع في درجة الحرارة، الصداع و انسداد الأنف (احتقان الأنف).

٢. احتياطات ما قبل تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية

لا تتناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية في الحالات الآتية:

- حساسية من الباراسيتامول، فينيل إفرين أو أي من مكونات الدواء (أنظر قائمة المكونات في نهاية النشرة، بند ٦)
- تناول أدوية الاكتئاب و التي تحتوي على مونو أمين أكسيداز خلال الأسبوعين السابقين.
- اسأل الطبيب أو الصيدلي إذا كانت الأدوية التي تتناولها تحتوي على مونو أمين أكسيداز.

اسأل الطبيب أو الصيدلي إذا كانت أي من هذه الحالات تنطبق عليك لأنه لا يجب تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية في هذه الحالات.

يجب أخذ احتياطات خاصة في حالة تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية.

اسأل الطبيب أو الصيدلي قبل العلاج بثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية إذا كنت تعاني من أي من الحالات الصحية الآتية:

- ضغط الدم العالي، أمراض القلب، مرض السكر، جلوكوما (ضغط العين المرتفع)، أمراض الكلى و الكبد، أمراض الغدة الدرقية، حساسية الصدر، أمراض الزرعة المزمنة و التسمم الكحولي المزمن أو صعوبة التبول نتيجة لتضخم البروستاتا.

لا يجب استخدام الدواء لمدة طويلة إلا بعد استشارة و تعليمات الطبيب. استشر الطبيب في الحالات الآتية:

- إذا استدعت الحالة استمرار العلاج لمدة تزيد على ٥ أيام (في حالة الألم)، ٣ أيام (في حالة ارتفاع درجة الحرارة) أو يومين (في حالة احتقان الحلق).
- في حالة الإصابة بكحة شديدة مستمرة لمدة تزيد على الأسبوع أو صاحبها بلغم.
- في حالة الإصابة بارتفاع في درجة الحرارة، طفح جلدي، صداع مستمر، غثيان أو قي.
- كذلك يجب عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة تناولك للمشروبات الكحولية.

في حالة تناول أدوية أخرى:

يجب مراجعة طبيبك أو الصيدلي قبل أخذ ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية، إذا كنت تتناول أو ستتناول أدوية أخرى بما فيها الأدوية التي تؤخذ بدون وصفة.
و خاصة إذا كنت تتناول الأدوية التي تحتوي على الباراسيتامول أو المسيلات.

الحمل و الرضاعة:

لا ينصح باستعمال ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية في حالة الحمل و الرضاعة. يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أي أدوية.

كبار السن:

يجب على كبار السن أخذ رأي الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية.

القيادة و استعمال الآلات:

ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية لا يتوقع أن يؤثر على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات.

٣. كيفية تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية

للبالغين و الأطفال (أكبر من ١٢ سنة)
يتم إذابة محتوى كيس واحد في حوالي ٢٠٠ مجم من الماء الساخن. يمكن تحلية المحلول في حالة الرغبة في ذلك.
يمكن تكرار الجرعة عند الضرورة كل ٤-٦ ساعات، على ألا تتجاوز ٤ جرعات خلال ٢٤ ساعة.

لا يجب تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية بصفة مستمرة لمدة تزيد على ٥ أيام لعلاج أعراض البرد. من الخطر تجاوز الحد الأقصى للجرعة إلا بأمر الطبيب.
إذا تجاوزت الجرعة المحددة من ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية، عليك الاتصال مباشرة بطبيبك حتى مع عدم ظهور أي أعراض.

٤. الأعراض الجانبية المحتملة

ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية دواء مثل كل الأدوية قد يسبب بعض الأعراض الجانبية لدى بعض الأشخاص.
إذا لاحظت أي من هذه الأعراض الجانبية توقف فوراً عن تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية و اخطر الطبيب أو الصيدلي

- حساسية الجلد مثل الطفح الجلدي أو الحكة
- دوار أو عصبية أو نعاس

يجب إخطار الطبيب أو الصيدلي إذا تطورت أي من الأعراض الجانبية المذكورة في هذه النشرة أو إذا لاحظت أي أعراض لم يتم ذكرها.

٥. كيفية حفظ ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية

يحفظ في مكان بعيد عن متناول و نظر الأطفال.
لا يتم تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الجيوب الأنفية بعد تاريخ الصلاحية المدون على العلبة.

٦. معلومات إضافية

المكونات الأخرى التي يحتوي عليها ثيرافلو:
سكروز، أسيسلفام البوتاسيوم، FD&C yellow #١٠، FD&C yellow #٦، مالتوديكتستين، سيليكون ديوكسيد، نكهات الليمون، حامض السيتريك، سترات الصوديوم، فوسفات الكالسيوم. يحتوي كل كيس على ٤٤ مجم من الصوديوم.

إنتاج/مصنع:

قامار أورلينز، فرنسا.
لصالح نوفاقرس للعناية بالصحة - نيون - سويسرا.

تمت الموافقة على هذه النشرة بتاريخ مارس 2011