

ثيرافلو

قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا

مسحوق داخل أكياس لعمل محلول للشرب

باراسيتامول ١٥٠ مجم + فينيرامين مالبيت ٢٠ مجم

+ فينيل إفرين هيدروكلوريد ١٠ مجم

اقرأ هذه النشرة بنناية لأنها تحتوي على معلومات تهمك.
هذا الدواء يمكن صرفه دون الحاجة إلى وصفة الطبيب.
مع ذلك، فإنه يتعين عليك تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا بعناية للحصول على أعلى فائدة ممكنة منه.
• احتفظ بهذه النشرة فرما تحتاج الرجوع إليها لاحقاً.
• استشر الصيدلي إذا كنت تحتاج إلى معلومات إضافية.
• استشر الطبيب إذا لم تشعر بتحسن أو ازدادت أعراضك سوءاً.
• أخبر الصيدلي أو الطبيب في حالة تطور أي من الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أي أعراض جانبية غير مذكورة في هذه النشرة.

محتويات النشرة:

1. ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا و دواعي الاستعمال
2. احتياطات ما قبل تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا
3. كيفية تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا
4. الأعراض الجانبية المحتملة
5. كيفية حفظ ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا
6. معلومات إضافية

١. ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا و دواعي الإستعمال

ما هو ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا
ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا هو دواء يذاب في سائل ساخن و يحتوي على مسكن للألم و خافض للحرارة (باراسيتامول)، ومزيل للاحتقان (فينيل إفرين) و مضاد للحساسية (فينيرامين).

ما هي دواعي استعمال ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا
ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا يستخدم لعلاج أعراض البرد و الأنفلونزا مثل الارتفاع في درجة الحرارة، آلام الجسم، الصداع، انسداد الأنف (احتقان الأنف)، العطس وسيلان الأنف.

٢. احتياطات ما قبل تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا

لا تتناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا في الحالات الآتية:
• حساسية من الباراسيتامول، فينيل إفرين أو فينيرامين أو أي من مكونات الدواء (انظر قائمة المكونات في نهاية النشرة، بند ٦)
• تناول أدوية الاكتئاب و التي تحتوي على مونو أمين أكسيداز خلال الأسبوعين السابقين.
اسأل الطبيب أو الصيدلي إذا كانت الأدوية التي تتناولها تحتوي على مونو أمين أكسيداز.
اسأل الطبيب أو الصيدلي إذا كانت أي من هذه الحالات تنطبق عليك لأنه لا يجب تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا في هذه الحالات.

يجب أخذ احتياطات خاصة في حالة تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا.

اسأل الطبيب أو الصيدلي قبل العلاج بثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا إذا كنت تعاني من أي من الحالات الصحية الآتية:
• ضغط الدم العالي، أمراض القلب، مرض السكر، جلوكوما (ضغط العين المرتفع)، أمراض الكلى و الكبد، أمراض الغدة الدرقية، حساسية الصدر، أمراض الرئة المزمنة و التسمم الكحولي المزمن أو صعوبة التبول نتيجة لتضخم البروستاتا.

لا يجب استخدام الدواء لمدة طويلة إلا بعد استشارة و تعليمات الطبيب. استشر الطبيب في الحالات الآتية:
• إذا استدعت الحالة استمرار العلاج لمدة تزيد على ٥ أيام (في حالة الألم)، ٣ أيام (في حالة ارتفاع درجة الحرارة) أو يومين (في حالة احتقان الحلق).
• في حالة الإصابة بكحة شديدة مستمرة لمدة تزيد على الأسبوع أو صاحبها بلغم.
• في حالة الإصابة بارتفاع في درجة الحرارة، طفح جلدي، صداع مستمر، غثيان أو قيء.
كذلك يجب عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة تناولك للمشروبات الكحولية.

في حالة تناول أدوية أخرى:

يجب مراجعة طبيبكي أو الصيدلي قبل أخذ ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا، إذا كنت تتناول أو ستتناول أدوية أخرى بما فيها الأدوية التي تؤخذ بدون وصفة.
و خاصة إذا كنت تتناول الأدوية التي تحتوي على الباراسيتامول أو الساليسيلات، المهدئات أو مضادات الاكتئاب.

الحمل و الرضاعة:

لا ينصح باستعمال ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا في حالة الحمل و الرضاعة. يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أي أدوية.

كبار السن:

يجب على كبار السن أخذ رأي الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا.

القيادة و استعمال الآلات:

ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا قد يسبب النعاس و لا يجب قيادة المركبات، أو تشغيل الماكينات الثقيلة أو الإنشغال بأعمال تستلزم اليقظة لتشغيلها أثناء تناول هذا الدواء.

٣. كيفية تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا

للبالغين و الأطفال (أكبر من ١٢ سنة)
يتم إذابة محتوى كيس واحد في حوالي ٢٠٠ مجم من الماء الساخن. يمكن تحلية المحلول في حالة الرغبة في ذلك.
يمكن تكرار الجرعة عند الضرورة كل ٤-٦ ساعات، على ألا تتجاوز الجرعة ٤ جرعات خلال ٢٤ ساعة.
لا يجب تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا بصفة مستمرة لمدة تزيد على ٥ أيام لعلاج أعراض البرد. من الخطر تجاوز الحد الأقصى للجرعة إلا بأمر الطبيب.
إذا تجاوزت الجرعة المحددة من ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا، عليك الإتصال مباشرة بطبيبك حتى مع عدم ظهور أي أعراض.

٤. الأعراض الجانبية المحتملة

ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا دواء مثل كل الأدوية قد يسبب بعض الأعراض الجانبية لدى بعض الأشخاص.

إذا لاحظت أي من هذه الأعراض الجانبية توقف فوراً عن تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا و اخطر الطبيب أو الصيدلي.

- حساسية الجلد مثل الطفح الجلدي أو الحكة
- دوار أو عصبية أو نعاس
- خمول
- هياج، خاصة في الأطفال

يجب إخطار الطبيب أو الصيدلي إذا تطورت أي من الأعراض الجانبية المذكورة في هذه النشرة أو إذا لاحظت أي أعراض لم يتم ذكرها.

٥. كيفية حفظ ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا

يحفظ في مكان بعيد عن متناول و نظر الأطفال.
لا يتم تناول ثيرافلو قوة إضافية للبرد و الأنفلونزا بعد تاريخ الصلاحية المدون على العبوة.

٦. معلومات إضافية

المكونات الأخرى التي يحتوي عليها ثيرافلو:
سكروز، أسيسلفام البوتاسيوم، FD&C yellow # ١٠، FD&C yellow # ٦، مالتونديكسترين، سيليكون ديوكسيد، نكهات الليمون، حامض السيتريك، سترات الصوديوم، فوسفات الكالسيوم. يحتوي كل كيس على ٥١ مجم من الصوديوم.

إنتاج مصنع:

فامار أورلينز، فرنسا.
لصالح نوفا ريس للعاية بالصحة - نيون - سويسرا.

تمت الموافقة على هذه النشرة بتاريخ مارس 2011