

ما هي مدة العلاج بي-بروفيرين إلى 100 ملغ أقراص متفرقة الإغلاق قابلة للفتح
في مثلج الأورال ثيم® بقعة برصعة العيب.

- الكبد:

- التآثرة الزائدة في التمرات الكبد. مرض من الكبد ارتفاع البيلوروبين.

- الكلى:

- غير المعروف عدد مزارع حصولة. فربما يوثق عدم مرض كلوي، مشاكل في الوظيفة الكلوية.

في حال حصول أي تأثير من التأثيرات أعلام أطم العيب.

في حال لاحظت أي تأثيرات جانبية غير معروفة في هذه الفقرة أو إذا تفاقم بعض التأثيرات الجانبية الرجاء أن نعلم طبيب
أو الصيداني.

إذا أخذت جرعة متفرقة من بي-بروفيرين إلى 100 ملغ أقراص متفرقة الإغلاق قابلة للفتح
في حال أخذ جرعة مفرقة أو في حال التسمم العرضي أرفع العلاج واكشتر العيب على الفور.

إذا أخذت سمك بي-بروفيرين إلى 100 ملغ أقراص متفرقة الإغلاق قابلة للفتح
لا تأخذ جرعة مضاعفة للتصحيح من الجرعة التي قمت أخذها.

4. التأثيرات الجانبية المحتملة

مثل الأدوية كلها، يمكن أن يسبب هذا الدواء تأثيرات جانبية لا تسبب المرضي كهم.
يمكن أن تزيد الأدوية مثل بي-بروفيرين إلى 100 ملغ أقراص متفرقة الإغلاق لمدة للفتح على الإصابة بتهبة قلبية ()
الخطي القلبي) أو بسكتة دماغية.

بصورة عامة يحدد عدد مزارع حصول التأثيرات الجانبية على النحو الآتي:

- الخاتمة جدًا (تصعب أكثر من مرض من أصل 10)
- الشائعة (تصعب أكثر من مرض من أصل 100 وأقل من مرض من أصل 10)
- غير الشائعة (تصعب أكثر من مرض من أصل 1000 وأقل من مرض من أصل 100)
- نادرة (تصعب أكثر من مرض من أصل 10000 وأقل من مرض من أصل 1000)
- النادرة جدًا (تصعب أقل من مرض من أصل 10000)
- غير المعروف عدد مزارع حدوثها (لا يمكن تحديدها استنادًا إلى المعلومات المتوفرة)
- يمكن حصول الارتكاسات التحسسية التالية:

- غير الشائعة: طفح جلدي
- غير المعروف عدد مزارع: شرى، تفاعلات شرى المزمع:

- الارتكاسات تحسسية:

- غير المعروف عدد مزارع حصولها: التهاب الأذن، صعوبة في التنفس، لا سيما لدى المرضي الحساسين بحساسية ضد الأسبيرين
أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

الارتكاسات عامة:

- غير معروف عدد مزارع حصولها: تورم مفاصل في الوجه والطاق (عوز) ومغلي) وحساسة لبريد

يمكن أيضًا حصول التأثيرات التالية:

- اضطرابات هضمية:
- غير المعروف عدد مزارع حصولها: نزف في القناة الهضمية، ثقب في الجهاز الهضمي (راجع صفة ومخاطر الاستخدام)
- تحصل هذه التأثيرات على إسهال جرعات عالية خلال مدة طفولة من الزمن.
- اضطرابات جلدية:
- غير المعروف عدد مزارع حصولها: ارتكاسات جلدية نتيجة التمرض للشمس أو لأشعة ما فوق البنفسجية (حساسات للشمس)،
تفلاخ جلدي قد ينتشر بسرعة ويظهر على الجسم كله (انتفاخ-ساقان-جوسون-وفاشار ليل).

في حال تعرضت لأحد هذه التأثيرات أوقف العلاج على الفور وأطم الطبيب.

- يمكن حصول التأثيرات التالية أيضًا في خلال فترة العلاج:
- اضطرابات هضمية:

- غير الشائعة: إسهال، إسهال، نغمة، التهاب المعدة.
- لنادرة: التهاب قائم، قرحة المعدة والأعضاء والأنسجة التهاب القولون.
- عدد المعروف عدد مزارع حصولها: التهاب حاد في الأمعاء، داء كرون.
- اضطرابات دماغية:

- التآثرة: أسهيس، والوزن وانخفاض.
- غير المعروف عدد مزارع حصولها: نوبات اضطرابات في المزاج، اضطرابات في الذاكرة.
- اضطرابات الأذن:
- التآثرة: سكين في الأذن.
- اضطرابات بصرية:
- التآثرة: اضطرابات بصرية (دم ودمع العين)
- اضطرابات قلبية:

- غير المعروف عدد مزارع حصولها: ارتفاع ضغط الدم، قصور قلبي، توسع الأوعية.
- اضطرابات جلدية:
- غير المعروف عدد مزارع حصولها: تضيق خسر الرئس أو الجسم.
- اضطرابات عامة:
- غير الشائعة: تنب.

التأثيرات من نتائج التحوصلات المخبرية:

- الدم:

- غير المعروف عدد مزارع حصولها: انخفاض كبير في عدد بعض كريات الدم البيضاء، يمكن أن يسبب حالة ضعف خطيرة
(نقص الصفيحات الد).
- واستفاد الصفيحات وتصور مع التظام.

إن هذا الدواء

- مستحضر يوتر على مستحضر استكلوك خلاصة التوتيات ويعرضه الحضر.
- التبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المتوصلة عليها وتعليمات الصيداني التي صرفها لك.
- الطبيب والصيداني هما الجبران في الدواء وفي نفعه و ضرره.
- لا تفتح مدة العلاج المحددة له من تلقاء نفسك.
- لا تكن صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تتركه الإبروية في مثلج الأورال.

مجلس وزراء الصحة العربي
والحداد الصيدالية العربي.