

بيبيراسيلين- تازوباكتام ساندوز® 4.5 غرام

بيبيراسيلين/ تازوباكتام

يُرجى قراءة هذه النشرة كاملة بعناية قبل أن تبدأ في استخدام هذا الدواء؛ لأنها تحتوي على معلومات هامة بالأسفئة لك.

- احتفظ بهذه النشرة؛ فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى
- إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى، فاسأل طبيبك، أو الصيدلي الخاص بك، أو الممرض(ة).
- إذا أصبت بآثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك، أو للممرض(ة)، ويشمل ذلك أية آثار جانبية مُحتملة؛ غير المدرجة في هذه النشرة. انظر قسم: 4.

محتويات هذه النشرة:

- ما هو عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز؟ وفيم يُستخدم؟
- ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل استخدام عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز؟
- كيفية استخدام عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز
- الآثار الجانبية المُحتملة
- كيفية تخزين عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز
- محتويات العبوة ومعلومات أخرى

1. ما هو عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز؟ وفيم يُستخدم؟

ينتمي عقار بيبيراسيلين إلى مجموعة من الأدوية تُعرف باسم "مُضادات البنسيلين الحيوية واسعة النطاق"، يمكنه قتل أي نوع من البكتيريا. بإمكان تازوباكتام منتج بعض البكتيريا المُقاومة من النجاة من تأثيرات عقار بيبيراسيلين. هذا يعني أنه عندما يتم إعطاء عقار بيبيراسيلين وتازوباكتام معًا، يتم قتل المزيد من أنواع البكتيريا.

يُستخدم عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز في البالغين والمراهقين لعلاج العدوى البكتيرية، مثل تلك التي تؤثر على الجهاز التنفسي السفلي (الرئتين)، الجهاز البولي (الكلى والمثانة)، البطن، الجلد أو الدم. قد يتم استخدام عقار بيبيراسيلين -تازوباكتام ساندوز لعلاج العدوى البكتيرية في المرضى الذين يعانون من انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (مقاومة منخفضة للعدوى).

يُستخدم عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز في الأطفال بعمر 2-12 عامًا لعلاج عدوى البطن مثل التهاب الزائدة الدودية، التهاب السُفّاق (عدوى بسوائل وبطانة أعضاء البطن)، وعدوى المرارة (الصفراوية)، قد يتم استخدام عقار بيبيراسيلين -تازوباكتام ساندوز لعلاج العدوى البكتيرية في المرضى الذين يعانون من انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (مقاومة منخفضة للعدوى).

في بعض حالات العدوى الخطيرة، قد يفكر طبيبك في استخدام عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز مصحاحية مضادات حيوية أخرى.

2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل استخدام عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز؟

لا تستخدم عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز في الحالات الآتية:

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه عقار بيبيراسيلين أو تازوباكتام أو تجاه أي مكون من المكونات الأخرى بهذا الدواء (المدرجة في قسم: 6)
- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه المضادات الحيوية المعروفة باسم التيسلينات أو السيفالوسبورينات أو غيرها من مشتقات إزيم بيتا لآكتاميز؛ حيث قد يكون لديك حساسية تجاه عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز.

تحذيرات واحتياطات

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك أو الممرض(ة) قبل استخدام عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز في الحالات الآتية:

- إذا كنت تُعاني من الحساسية: إذا كان لديك العديد من حالات الحساسية، فتأكد من إخبار طبيبك أو غيره من أخصائيي الرعاية الصحية قبل تلقي هذا المنتج.
- إذا كنت تعاني من الإسهال من قبل، أو إذا ظهر لديك إسهال أثناء أو بعد العلاج، في هذه الحالة، تأكد من إخبار طبيبك أو غيره من أخصائيي الرعاية الصحية فورًا. لا تتناول أي دواء لعلاج الإسهال دون مراجعة طبيبك أولاً.
- إذا كان لديك مستويات منخفضة من البوتاسيوم في الدم. قد يرغب طبيبك في فحص كيتيك قبل تناول هذا الدواء وقد يجري اختبارات دم منتظمة أثناء العلاج.
- إذا كان لديك مشاكل بالكلى أو الكبد، أو إذا كنت خضع للفحسيل الدموي. قد يرغب طبيبك في فحص كيتيك قبل تناول هذا الدواء وقد يجري اختبارات دم منتظمة أثناء العلاج.
- إذا كنت تتناول بعض الأدوية (تُسمى مضادات التخثر): لتجنب التضرر الزائد للدم (انظر أيضًا تناوُل الأدوية الأخرى مع عقار بيبيراسيلين -تازوباكتام ساندوز" في هذه النشرة) أو إذا حدث أي نزيف غير متوقع أثناء العلاج، في هذه الحالة، يجب عليك إبلاغ طبيبك أو غيره من أخصائيي الرعاية الصحية فورًا.
- إذا تعرضت للإصابة بتهنجات أثناء العلاج، في هذه الحالة، يجب عليك إعلام طبيبك أو غيره من أخصائيي الرعاية الصحية.
- إذا كنت تعتقد قد أصبت بعدوى جديدة أو متفادقة، في هذه الحالة، يجب عليك إعلام طبيبك أو غيره من أخصائيي الرعاية الصحية.

الأطفال ممن تبلغ أعمارهم أقل من عامين

لا يُوصى باستخدام عقار بيبيراسيلين/ تازوباكتام للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين بسبب عدم كفاية البيانات المتعلقة بالآمان والفعالية.

تناوُل أدوية أخرى مع عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز

يُرجى إبلاغ طبيبك أو أخصائيي رعاية آخر إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أية أدوية أخرى، بما في ذلك أية أدوية أخرى حصلت عليها دون وصفة طبية. قد تتداخل بعض الأدوية مع عقار بيبيراسيلين وتازوباكتام. تشمل هذه الأدوية:

- دواء لعلاج مرض النقرس (برونيبسيد)، من الممكن أن يزيد ذلك من الوقت الذي يستغرقه عقار بيبيراسيلين وتازوباكتام لمغادرة جسمك.
- أدوية إسالة الدم أو علاج الجلطات الدموية (على سبيل المثال هيبارين، وارفارين أو الأسبرين).
- الأدوية التي تُستخدم لإرخاء عضلاتك أثناء الجراحة. أخبر طبيبك إذا كنت يصدد الخضوع لجدر عام.
- ميثوتريكسات (دواء يُستخدم لعلاج مرض السرطان، التهاب المفاصل أو الصدفية).
- إمكان عقار بيبيراسيلين وتازوباكتام أن يزيدًا من الوقت الذي يستغرقه ميثوتريكسات لمغادرة جسمك.
- الأدوية التي تخفض من مستوى البوتاسيوم في الدم لديك (على سبيل المثال الأقراص التي تحفز التبول أو بعض أدوية علاج السرطان).
- الأدوية التي تحتوي على المضادات الحيوية الأخرى مثل توبراميسين، جنتاميسين أو فلوكونوميسين. أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل بالكلى.

التأثير على الاختبارات للمعملية:

أخبر الطبيب أو طاقم المختبر أنك تتناول عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز إذا كان عليك تقديم عينة دم أو بول.

الحمل والرضاعة الطبيعية

إذا كنت حاملًا أو ترضعين طبيعيًا أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملًا أو تخططين لذلك، فاسأل طبيبك أو أخصائي رعاية صحية آخر النصيحة قبل تلقي هذا الدواء. سيقرر طبيبك ما إذا كان عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوزمناسبًا لك أم لا.

إمكان عقار بيبيراسيلين وتازوباكتام المرور للطفل في الرُحم أو من خلال لبن الأم. إذا كنت مرضعًا، سيقرر طبيبك ما إذا كان عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوزمناسبًا لك أم لا.

القيادة واستخدام الآلات

من غير المرجح أن يؤثر عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز في القدرة على القيادة أو استخدام الآلات.

يحتوي قمار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز 4.5 جرام على 217 مجم من الصوديوم (المكون الرئيسي لملح الطعام/ الطبخ) في كل وحدة جرعة. يعادل ذلك 11% من الحد الأقصى الموصى به يوميًا من تناول الصوديوم بالنسبة للبالغين.

يجب أخذ ذلك في الاعتبار إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم.

3. كيفية استخدام عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز

سوف يعطيك طبيبك أو غيره من أخصائيي الرعاية الصحية هذا الدواء عن طريق التسريب (بالتنقيط لمدة 30 دقيقة) في أحد الأوردة لديك.

الجرعة

تعتمد جرعة الدواء التي تم إعطاؤها لك على المرض الذي يتم علاجه منه، وعمرك وما إذا كنت تعاني من مشاكل بالكلى أم لا.

البالغون والمراهقون البالغون من العمر فوق 12 عامًا

تبلغ الجرعة المعتادة 4 جرام/ 0.5 جرام من عقار بيبيراسيلين/ تازوباكتام يتم إعطاؤها كل 6-8 ساعات، والتي تُعطى في أحد الأوردة لديك (في مجرى الدم مباشرة).

الأطفال بأعمار 2 إلى 12 عامًا

تبلغ الجرعة المعتادة للأطفال الذين يعانون من عدوى بالبطن 100 مجم / 12.5 مجم/ كجم من وزن الجسم من عقار بيبيراسيلين/تازوباكتام يتم إعطاؤها كل 8 ساعات في أحد الأوردة لديك (في مجرى الدم مباشرة). تبلغ الجرعة المعتادة للأطفال الذين يعانون من انخفاض في تعداد خلايا الدم البيضاء 80 مجم / 10 مجم/ كجم من وزن الجسم من عقار بيبيراسيلين/تازوباكتام يتم إعطاؤها كل 6 ساعات في أحد الأوردة لديك (في مجرى الدم مباشرة)، سيقوم طبيبك بحساب الجرعة بناءً على وزن طفلك، ولكن لن تتجاوز كل جرعة فردية 4 جرام/ 0.5 جرام من عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز.

سيتم إعطاؤك عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوزحتى تُزول علامات العدوى تمامًا (14 يومًا).

المرضى الذين يعانون من مشاكل الكلى

قد يكون طبيبك بحاجة إلى خفض جرعة عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز أو من معدل تكرار إعطائها لك. قد يرغب طبيبك أيضًا في اختبار دمك؛ للتأكد من أن علاجه يعطى بالجرعة المناسبة. خاصة إذا كان عليك تناول هذا الدواء لفترة طويلة.

إذا تلقيت كمية أكثر مما يجب من عقار بيبيراسيلين -تازوباكتام ساندوز

نظرًا لأنك ستلتقي عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز من طبيب أو أخصائيي رعاية صحية آخر، فمن غير المرجح أن يتم إعطاؤك الجرعة الخاطئة مع ذلك، إذا كنت تعاني من آثار جانبية، مثل التشنجات، أو تعتقد أنه قد تم إعطاؤك كمية كبيرة جدًا، أخبر طبيبك فورًا.

إذا أغفلت جرعة من عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز

إذا كنت تعتقد أنه تم يتم إعطاؤك جرعة من عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز، أخبر طبيبك أو غيره من أخصائيي الرعاية الصحية فورًا.

إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية حول استخدام هذا الدواء، فاستشر طبيبك أو الممرض(ة) الخاص(ة) بك.

4. الآثار الجانبية المُحتملة

مثلته مثل كافة الأدوية. قد يُسبب هذا الدواء آثارًا جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

هم زيارة الطبيب فورًا إذا تعرضت للإصابة بأي من هذه الآثار الجانبية لعقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز التي يُحتمل أن تكون خطيرة:

الآثار الجانبية الخطيرة (معدل التكرار بين الأقواس) لعقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز هي كالآتي:

طفح جلدي خفيف (متلازمة ستيفنز جونسون، التهاب الجلد القفاعي (غير معروفة)، التهاب الجلد التشرشي (غير معروفة)، انحلال البشرة النشري التشمُّمي (نادر) يظهر في البداية على شكل بقع حمراء شبيهة بالهدف أو بقع دائرية مع حاتم مع ظهور بثور مركزية على الجذع. تشمل العلامات الإضافية القرح بالقم والمقلى والأنف والأطراف والأعضاء التناسلية و التهاب الملتحمة (عيون حمراء متورمة). قد يتطور الطفح الجلدي إلى ظهور بثور على نطاق واسع أو تقشر الجلد التي من المحتمل أنها قد تكون مهددة للحياة.

حالة حساسية شديدة يحتمل أن تؤدي إلى الوفاة (تفاعل دوائي مع كثرة خلايا اليوزينيات وأعراض جهازية) والتي يمكن أن تشمل الجلد والأهم من ذلك: الأعضاء الأخرى أسفل الجلد مثل الكلى والكبد (غير معروفة)

حالة جلدية (التهيار الطقيحي الحاد المُعتمَم) مصحوبة بحُمى، والتي تتكون من بثور صغيرة عديدة مملوءة بالسوائل توجد على مناطق كبيرة من الجلد المُلَوَّم والأحمر (غير معروفة)

وذم في الوجه أو الشفتين أو اللسان أو أجزاء أخرى من الجسم (غير معروفة) تورم في النفس أو أزيز الصدر أو صعوبة في التنفس (غير معروفة)

طفح جلدي أو شرى (إرتكاريا) شديدة (غير شائعة)، حكة أو طفح جلدي على الجلد (شائعة)

اضطراب العينين أو الجلد (غير معروفة)

تلف بخلايا الدم (تشمل العلامات ما يلي: انقطاع النَّفْس عندما لا تتوقع ذلك، يولًا أحمر أو بنيًا (غير معروفة)، نزيفًا من الأنف (نادر) وكدمات تكون بقعًا صغيرة (غير معروفة)، انخفاضًا شديدًا في خلايا الدم البيضاء (نادرة)

إسهال شديد أو مستمر مصحوب بحُمى أو ضعف (نادرة)

الآثار الجانبية الشائعة جدًا (قد تؤثر على أكثر من شخص واحد من بين كل 10 أشخاص):

SANDOZ A Novartis Division

مسحوق لمحلول مُعد للتسريب.

الآثار الجانبية الشائعة (قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل 10 أشخاص):

- عدوى فطرية
- انخفاض في الصفائح الدموية انخفاض خلايا الدم الحمراء أو صبغة الدم الهيموجلوبين، نتائج غير طبيعية للاختبارات المعملية (نتائج إيجابية مباشرة لاختبار كومبس)، إطالة زمن تخثر الدم (إطالة زمن الثرومبوبلاستين الجزئي المنفصل).
- انخفاض في البروتين بالدم.
- صداع، عدم القدرة على النوم (أرق).
- آلم بالبطن، قيء، غثيان، إسهال، اضطراب بالمعدة.
- ارتفاع بإزواجيات الكبد بالدم.
- نتائج غير طبيعية باختبارات الكلى بالدم.
- حُمى، تفاعل، ووضع الحقن.

الآثار الجانبية غير الشائعة (قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل 100 شخص):

- انخفاض في خلايا الدم البيضاء (قلة كُرَيَّات الدَّم البيضاء)، إطالة زمن تخثر الدم (إطالة زمن البروثرومين).
- انخفاض مستوى البوتاسيوم بالدم، انخفاض سكر الدم.
- انخفاض ضغط الدم، التهاب الأوردة (الشعور بألم عند الضغط
- أو احمرار) في المنطقة لمصابة)، احمرار البطن.
- زيادة المنتج الناتج عن تكسير صبغة الدم (البيليروبين).
- تفاعلات جلدية مع احمرار تكون إصابات بالجلد، طفح القُرص.
- آلم بالمفاصل والعضلات.
- قشعريرة.

الآثار الجانبية النادرة (قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من بين كل 1000 شخص):

- التهاب بطننة الأنغية المخاطية بالقم

الآثار الجانبية غير المعروفة (لا يمكن تقديرها من واقع البيانات المتاحة):

- انخفاض شديد في خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية (قلة الكريات الشبيهة بالدم)، انخفاض في خلايا الدم البيضاء (قلة خلايا الشَّذَلَات)، انخفاض خلايا الدم الحمراء التاجع عن التكسير أو التدهور المبكر، إطالة زمن النزف، زيادة الصفائح الدموية، زيادة نوع محدد من خلايا الدم البيضاء (كثرة خلايا اليوزينيات)
- تفاعل حساسية وتفاعل حساسية شديد.
- التهاب الكبد وضعف وظائف الكلى ومشاكل بالكلى.
- أحد أشكال مرض الرئة حيث تظهر الحُمضات (أحد أشكال خلايا الدم البيضاء) في الرئة بأعدادًا متزايدة.

كان العلاج بعقار بيبيراسيلين مصحوبًا بزيادة حدوث الحُمى والطفح الجلدي في مرضى التليف الكيسي.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا ظهرت لديك أية آثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك أو (الممرض(ة)). ويشمل ذلك أية آثار جانبية مُحتملة؛ غير المدرجة في هذه النشرة.

إبلاغك عن الآثار الجانبية. يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول أمان استخدام هذا الدواء.

5. كيفية تخزين عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز

يُحفظ هذا الدواء بعيدًا عن روية ومُتناوَل الأطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المُلَوَّن على العبوة الكرتونية وعلى الملصق بعد كلمة: EXP. يُشير تاريخ انتهاء الصِّلَاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

الزجاجات/ العبوات غير المُفتوحة:

لا يُخفَّن في درجة حرارة تتعدى 30 درجة مئوية.

الاطلاع على شروط تخزين المنتج الدوائي المُعد والمُخفف، انظر في نهاية نشرة العبوة "المعلومات الأتالية مُخصصة لمهنيين الطبيين أو أخصائيي الرعاية الصحية فقط".

للاستخدام مرة واحدة فقط. تُفكس من أي محلول لم يُستخدم.

لا تتخلص من الأدوية عن طريق إلقائها في مياه الشرف أو مع المخلفات المنزلية. اسأل الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تُقد تستخدمها. تُساعد هذه الإجراءات في الحفاظ على البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

أ. ما هي محتويات عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز؟

كل زجاجة أو عبوة تحتوي على 4 جرام من عقار بيبيراسيلين (في هيئة بيبيراسيلين الصوديوم) و0.5 جرام من تازوباكتام (في هيئة تازوباكتام الصوديوم).

- المكونات الأخرى:

لا يحتوي المنتج الدوائي على أي مكونات أخرى بخلاف المواد الفعالة.

ب. ما هو شكل عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز؟ وما هي محتويات العبوة؟

عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوز 4.5 غرام عبارة عن مسحوق أبيض إلى أبيض مائلًا للاصفر لإعدادات محلول للتسريب ويأتي معبأ في زجاجات أو عبوات. تكون الزجاجات أو العبوات معبأة في عبوات كرتونية.

أحجام العبوات 0.5، ١، ١٠، ١٢ و ٥٠ زجاجة/ عبوة. قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

مالك حق التسويق وجهة التصنيع

شركة ساندوز المحدودة

10 شارع بويشمي

6250 كوندل

الشمسا

تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في 2018/06.

إن ساندوز و **SANDOZ** هي علامات تجارية مسجلة لشركة نوفارتيس

هذا منتج دوائي
- الدواء مستحضر يُؤثر على صحتك واستهلاكه خلافًا للتعليمات يعرضك للخطر. - اتبع الوصفة الطبية بدقة وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي ياعك الدواء. - الطبيب والصيدلي هما خبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها. - لا توقف من تلقاء نفسك فترة العلاج التي تم وصفها لك. - لا تكرر نفس الوصفة الطبية دون استشارة الطبيب.
احتفظ بجمع الأدوية بعيدًا عن مُتناوَل الأطفال.
مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيدالة العرب

المعلومات التالية موجهة لأخصائيي الرعاية الصحية والطبية فقط: بعد الإعداد (والتحذيف):

انضح وجود ثبات كيميائي وفيزيائي أثناء الاستخدام لمدة تبلغ 24 ساعة في درجة حرارة تتراوح بين 25-20 درجة مئوية ولمدة 48 ساعة في درجة حرارة تتراوح بين 2-8 درجة مئوية.

من وجهة النظر الميكروبيولوجية، عند فتح هذا المنتج يجب استخدامه فورًا، إذا لم يُستخدم على الفور، تكون مدة التخزين أثناء الاستخدام وظروف التخزين قبل الاستخدام مسئولية المستخدم وعادةً لن تكون أطول من 24 ساعة عند 2 - 8 درجة مئوية ما لم يكن قد تم إجراء التحفيظ/ الإعداد في ظروف تعقيم مضطربة وتم التحقق منها.

تعليمات الاستخدام

سيتم إعطاء عقار بيبيراسيلين - تازوباكتام ساندوزعن طريق التسريب الوريدي (بالتنقيط لمدة 30 دقيقة).

الاستخدام الوريدي

قم بإعداد كل زجاجة/ عبوة زجاجية بإضافة حجم المذيب الموضح في الجدول أدناه باستخدام أحد المذيبات المتوافقة للإعداد. قم بالتقليب حتى الذوبان. عند التقليب باستمرار، يحدث الإعداد بشكل عام في غضون 3 دقائق (للحصول على تفاصيل حول المناولة، انظر (أدناه).

محتويات الزجاجة/ العبوة	حجم المذيب* الذي يجب إضافته إلى الزجاجة/ العبوة
4 جرام 0.5/ جرام 4 (جرام عقار بيبيراسيلين 20 ملي لتر و0.5 جرام تازوباكتام)	

*المذيبات المتوافقة للإعداد:

- ماء للحقن؛
- محلول كلوريد الصوديوم 9 مجم/ملي لتر (0.9%) في ماء للحقن؛
- محلول جلوكوز 30 مجم/ 30 ملي لتر (5%) في ماء للحقن؛
- محلول جلوكوز 9 مجم/ 30 ملي لتر (5%) في محلول كلوريد الصوديوم 9 مجم/ 30 ملي لتر (0.9%).

يجب سحب المحاليل المُعدة من الزجاجة عن طريق سرنجة. عند الإعداد بحسب التوجيهات، فستوفر محتويات الزجاجة التي يتم سحبها عن طريق السرنجة الكمية المرقومة من عقار بيبيراسيلين وتازوباكتام.

قد يتم تخفيف المحاليل المُعدة لاحقًا إلى الحجم المطلوب (على سبيل المثال، 50 ملي لتر إلى 150 ملي لتر) مع أحد المذيبات المتوافقة التالية:

- محلول كلوريد الصوديوم 9 مجم/ 30 ملي لتر (0.9%) في ماء للحقن؛
- محلول جلوكوز 30 مجم/ 30 ملي لتر (5%) في ماء للحقن؛
- محلول ديكستران (الدرجة 40) 60 مجم/ 30 ملي لتر (6%) في محلول كلوريد الصوديوم 9 مجم/ 30 ملي لتر (0.9%).

عدم التوافق

يجب عدم خلط هذا المنتج أو إعطائه بالتزامن مع أي أمينوجليكوزيد. من الممكن أن يؤدي غلط المضادات الحيوية من فئة بيتا لكتام مع أحد الأمينوجليكوزيدات في المختبر إلى تعطيل كير الأمينوجليكوزيد.

يجب عدم خلط عقار بيبيراسيلين / تازوباكتام بمواد أخرى في سرنجة أو زجاجة تسريب؛ نظرًا لعدم إثبات التوافق.

يجب إعطاء عقار بيبيراسيلين/ تازوباكتام عن طريق مجموعة تسريب منفصلة عن أي أدوية أخرى ما لم يتم إثبات التوافق.

نظرًا لعدم إثبات الكيميائي، يجب عدم استخدام عقار بيبيراسيلين / تازوباكتام مع المحاليل التي تحتوي فقط على ييكروبنات الصوديوم.

محلول لكتات رينجر (هارتمان) غير متوافق مع عقار بيبيراسيلين/ تازوباكتام. يجب عدم إضافة عقار بيبيراسيلين / تازوباكتام إلى منتجات الدم أو هيدرات الزلال.