

زايركسا فيلوتاب

زايركسا فيلوتاب ٥ ملغ أقراص سريعة الذوبان في الفم/ زايركسا فيلوتاب ١٠ ملغ أقراص سريعة الذوبان في الفم
زايركسا فيلوتاب ١٥ ملغ أقراص سريعة الذوبان في الفم/ زايركسا فيلوتاب ٢٠ ملغ أقراص سريعة الذوبان في الفم
أولانزابين

يجب عليك إعلام الطبيب إن كنت تأخذ الفلوفوكزامين (مضاد للاكتئاب) أو السيبروفلوكساسين (مضاد حيوي) لأنه قد يكون من الضروري تعديل جرعة زايركسا فيلوتاب التي تتناولها.
يجدر بك إعلام الطبيب في حال كنت تتناول أو تناولت مؤخراً دواء آخر حتى ولو حصلت على الدواء من دون وصفة طبية. وبشكل خاص أعلم طبيبك إذا كنت تتناول أدوية لداء باركنسون.

تناول زايركسا فيلوتاب مع الطعام والشراب

لا تشرب الكحول خلال العلاج بزايركسا فيلوتاب لأن ذلك قد يسبب النعاس.

الحمل و الإرضاع

إذا كنت حاملاً أو كنتِ تعتقدين أنك كذلك، يجدر بك إعلام طبيبك بأسرع وقت ممكن. لا يجدر بك تناول هذا الدواء إذا كنت حاملاً إلا إذا تحدّثت مع طبيبك حول هذا الأمر. يجب عدم وصف هذا الدواء لك إذا كنت مرضعة لأن كميات ضئيلة من زايركسا فيلوتاب يمكن أن تنتقل إلى حليب الثدي.

قيادة السيارات واستعمال الآلات

قد يسبب العلاج بزايركسا فيلوتاب النعاس. لذا في حال الشعور بالنعاس لا تقد سياراً ولا تشغل أي آلات أو أدوات. أعلم طبيبك.

معلومات مهمة متعلّقة ببعض مكُونات زايركسا فيلوتاب

يجب إعلام المرضى الذين لا يمكنهم تناول الفينيلالانين أن زايركسا فيلوتاب يحتوي على الأسبارتام الذي هو مصدر للفينيلالانين. من الممكن أن يكون زايركسا فيلوتاب ضاراً للمرضى الذين يعانون من بيلة الفينيل الكيتونية. كما يجب إعلام المرضى الذين لا يمكنهم تناول المانيتول أن زايركسا فيلوتاب يحتوي على المانيتول.

يحتوي زايركسا فيلوتاب على باراهيدروكسيبينزوات مغنيز الصوديوم وباراهيدروكسيبينزوات بروبيل الصوديوم اللذين يمكن أن يسببا حساسية لدى بعض الأشخاص. ويمكن التعرف على الحساسية كطفح جلدي أو حكة أو ضيق نفس. ويمكن أن تأتي الحساسية مباشرة بعد تناول زايركسا فيلوتاب أو بعد تناوله ببعض الوقت.

٣. ما هي طريقة تناول زايركسا فيلوتاب


تناول زايركسا فيلوتاب تماماً حسب وصفة الطبيب. يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي في حال الشك.
سوف يحدد طبيبك عدد أقراص زايركسا فيلوتاب التي عليك تناولها ومدّة تناولها. تتراوح الجرعة اليومية من زايركسا فيلوتاب بين ٥ و ٢٠ ملغ. استشر طبيبك في حال ظهرت عوارضك مجدداً ولكن لا تتوقف عن تناول زايركسا فيلوتاب إلا إذا أشار الطبيب بذلك.

يجب تناول زايركسا فيلوتاب مرّة في اليوم وفقاً لوصفة الطبيب. حاول تناول أقراصك في الساعة نفسها كل يوم. لا يهّم إذا تناولتها مع الطعام أو بدونه. إن أقراص زايركسا فيلوتاب السريعة الذوبان مُعدّة للتناول عبر الفم.

إن أقراص زايركسا فيلوتاب سهلة الكسر لذا يجب الإمساك بها بتأن. لا تمسك بالأقراص إذا كانت يدك رطبتين لأن الأقراص يمكن أن تتفتت.

١. أمسك بالصفحة المخومة حراًياً من طرفها وافصل خلية من الصفحة بتمزيقها بتأن على طول الثقوب حولها.
٢. فك السند بعناية.
٣. ادفع القرص بتمهل.

٤. ضع القرص في فمك حيث سيذوب مباشرة فيبلع بكل سهولة.
يمكنك أيضاً وضع القرص في كوب كبير من الماء أو عصير البرتقال أو التفاح أو الحليب أو القهوة وتحريكه. يمكن أن يتغير لون المزيج مع بعض المشروبات فيصبح عكراً. يجب شربه على الفور.



إذا تناولت كمية من زايركسا فيلوتاب أكبر من التي عليك تناولها تعرّض المرضى الذين تناولوا كمية من زايركسا أكبر من التي عليهم تناولها للعوارض التالية: تسارع دقات القلب، هياج/عدائية، مشاكل في النطق، حركات غير طبيعية (خاصة في الوجه أو اللسان) وانخفاض مستوى الوعي. ويمكن أن تكون العوارض الأخرى: تشوش ذهني حاد، نوبات صرع، سبات، حمى مع تسارع في التنفس وتعرّق وتيبس في العضلات ودوار أو نعاس، تباطؤ معدل التنفس، سفل النفس، ارتفاع في ضغط الدم أو إنخفاض في ضغط الدم، نظم قلبي غير طبيعي.

اتصل بطبيبك أو بالمستشفى على الفور وأره عليه الأقراص.

الرجاء قراءة كامل هذه النشرة بدقة قبل تناول هذا الدواء.

- يحتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إن كان لديك أسئلة أخرى، إسأل طبيبك أو الصيدلي.
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تعطه مطلقاً لأي شخص آخر حتى ولو كانت عوارضه شبيهة بعوارضك لأنه قد يضره.
- في حال تفاقم أحد التأثيرات الجانبية أو في حال لاحظت تأثيراً جانبياً غير مذكور في هذه النشرة، الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة:

١. ما هو زايركسا فيلوتاب وما هي دواعي استعماله
٢. قبل أن تتناول زايركسا فيلوتاب
٣. ما هي طريقة تناول زايركسا فيلوتاب
٤. العوارض الجانبية المحتملة
٥. ما هي طريقة حفظ زايركسا فيلوتاب
٦. معلومات إضافية

١. ما هو زايركسا فيلوتاب وما هي دواعي استعماله

ينتمي زايركسا فيلوتاب إلى فئة من الأدوية تدعى مضادات الدّهان. يُستعمل زايركسا فيلوتاب لعلاج مرض ترافقه عوارض مثل سماع أشياء غير موجودة أو رؤيتها أو الشعور بها والافتقار بمعتقدات خاطئة والشعور برغبة غير اعتيادية وبانعزال. كما يمكن أن يشعر الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض بالاكتئاب أو بالقلق أو بالتوتر.
كما يُستعمل زايركسا فيلوتاب لعلاج حالة ترافقها عوارض مثل شعور بالغبطة وبشباط وحيوية مفرطين وبانخفاض في الحاجة إلى النوم وبالتكلم بسرعة كبيرة مع تسارع في الأفكار وأحياناً بتأثرية حادة. وزايركسا فيلوتاب هو أيضاً ضابط للمزاج بقي من التعرّض الإضافي للشعور بالغبطة وبالاكتئاب اللذين يرافقان هذه الحالة.

٢. قبل أن تتناول زايركسا فيلوتاب

لا تتناول زايركسا فيلوتاب

- إذا كنت تعاني من فرط حساسية ضدّ الأولانزابين أو أحد مكُونات زايركسا فيلوتاب الأخرى، يمكن أن تتخذ الحساسية شكل طفح جلدي أو حكة أو تورم في الوجه أو الشفتين أو صعوبة في التنفس. في حال ظهرت لديك هذه العوارض يجدر بك إعلام الطبيب.
- إذا شخصت لديك سابقاً مشاكل بصرية مثل بعض أنواع الغلوكوما (زيادة الضغط داخل العين).

يعتمد عناية خاصة مع زايركسا فيلوتاب:

- إن الأدوية من هذا النوع يمكن أن تسبب حركات غير طبيعية في الوجه أو اللسان بصورة خاصة. يجب إعلام الطبيب في حال التعرّض لهذه العوارض بعد تناول زايركسا فيلوتاب.
- بصورة نادرة جداً يمكن أن تسبب أدوية من هذا النوع في الوقت ذاته حمى وتسارعاً في التنفس وتعرّقاً وتيبساً في العضلات ونعاساً ورغبة في النوم، في حال التعرّض لهذه العوارض، اتصل بطبيبك على الفور.
- لا يُنصح باستعمال زايركسا فيلوتاب لدى المرضى المسنّين الذين يعانون من العته لأنه قد يسبب عوارض جانبية خطيرة.
- في حال كنت تعاني من أحد الأمراض التالية، أعلم طبيبك في أسرع وقت ممكن:

- الداء السكري
- مرض قلبي
- مرض في الكبد أو الكليتين
- داء باركنسون

الصرع

- مشاكل في البروستات
- إمساك حاد (علوص ظليل)
- اضطرابات في الدم
- سكتة دماغية أو سكتة دماغية "بسيطة" (عوارض سكتة مؤقتة)

في حال كنت تعاني من العته وسبق أن تعرّضت لسكتة دماغية أو سكتة دماغية "بسيطة" يجدر بك أو بالأشخاص الذين يعتنون بك إعلام الطبيب. على سبيل الحيلة، في حال تخطيت الـ ٦٥ من العمر، يمكن أن يراقب طبيبك ضغطك الشرياني.

لا يوصف زايركسا للمرضى ما دون الثامنة عشرة من العمر.

تناول أدوية أخرى

خلال العلاج بزايركسا فيلوتاب لا يجدر بك تناول أدوية أخرى إلا إذا سمح الطبيب بذلك. ويمكن أن يسبب زايركسا فيلوتاب النعاس إذا تم تناوله مع مضادات الاكتئاب أو أدوية لمعالجة القلق أو الأرق (مهدئات).

إذا نسيت تناول زايبركسا فيلوتاب

تناول قرصك حالما تتذكر. لا تتناول جرعتين في يوم واحد.

إذا توقفت عن تناول زايبركسا فيلوتاب

لا تتوقف عن تناول أقراصك لأنك تشعر بتحسن بكل بساطة. من المهم أن تأخذ زايبركسا فيلوتاب طيلة المدة التي حددها الطبيب.

إذا توقفت فجأة عن تناول زايبركسا فيلوتاب، يمكن أن تُصاب بعوارض مثل التعرّق والأرق والرجفة والقلق والغثبان والتقيؤ. يمكن أن يطلب منك الطبيب تخفيف الجرعات تدريجياً قبل إيقاف العلاج.

إذا كان لديك أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. التأثيرات الجانبية المحتملة

مثل الأدوية كلّها، يمكن أن يسبب زايبركسا فيلوتاب تأثيرات جانبية لا تُصيب المرضى كلّهم.

التأثيرات الجانبية الشائعة جداً: تُصيب شخصاً من أصل ١٠ أشخاص

● زيادة الوزن.

● غثاس.

● زيادة معدل البرولاكتين في الدم.

التأثيرات الجانبية الشائعة: تُصيب من شخص إلى ١٠ أشخاص من أصل ١٠٠

● تغيير معدل بعض كريات الدم والمواد الشحمية الجارية.

● زيادة نسب السكر في الدم والبول.

● زيادة الشعور بالجوع.

● دوام.

● تملل.

● رجفة.

● تيبس أو تشنّج عضلي (يُصيب أيضاً حركات العينين).

● مشاكل في النطق.

● حركات غير طبيعية (بخاصة في الوجه واللسان).

● إمساك.

● جفاف في الفم.

● طفح جلدي.

● ضعف القوة.

● إرهاق.

● إحتباس ماء يؤدي إلى تورم اليدين أو الكاحلين أو القدمين.

● عند بداية العلاج، يمكن أن يشعر بعض المرضى بدوار أو أن يفقدوا الوعي (مع تباطؤ في سرعة القلب) بخاصة عند الوقوف بعد التمدد أو الجلوس.

● الخلل الوظيفي الجنسي مثل انخفاض الشبق لدى الرجال والنساء والخلل

الوظيفي في الانتصاب لدى الرجال.

التأثيرات الجانبية غير الشائعة: تُصيب من شخص إلى ١٠ أشخاص من أصل ١٠٠٠

● تباطؤ سرعة القلب.

● فرط حساسية تجاه الشمس.

● سلس بولي.

● تساقط الشعر.

● غياب أو قلة الدورة الشهرية.

● تغييرات في الثديين لدى الرجال والنساء مثل الإنتاج غير الطبيعي للحليب أو نموها غير الطبيعي.

تأثيرات جانبية أخرى مُحتملة: لا يمكن تقدير معدل حصولها وفقاً للمعطيات المتوافرة.

● إرتكاس تحسسي (مثلاً تورم الشفتين والحلق، حكة، طفح جلدي).

● ظهور الداء السكري أو تفاقمه. يمكن أن يترافق ذلك مع كثرة الكريات

الحمضية (خلونات في الدم والبول) أو سبات.

● إنخفاض حرارة الجسم العادية.

● إختلاجات عادة ما تكون مرتبطة باختلاجات سابقة (صرع).

● مجموعة تأثيرات تضم الحمى وتسارع التنفّس والتعرّق والتيبس العضلي أو دوام أو النعاس.

● تشنّج عضلة العين مما يسبب حركة دائرية للعين.

● عدم اتساق النظم القلبي.

● موت مفاجئ غير مبرر.

● خثارات دموية مثل الخثرات الوريدية العميقة في الساقين أو خثار في الرئة.

● التهاب في البنكرياس يسبب ألماً حادة في المعدة وحمي وتوعكاً عاماً.

● مرض في الكبد يظهر من خلال اصفرار البشرة والجزء الأبيض في مقلة العين.

● مرض عضلي يمكن أن تكون على شكل تيبس أو آلام غير مبررة.

● صعوبة في التبول.

● إنتصاب مطوّل و/أو مؤلم.

خلال تناول الأولانزين، يمكن أن يُصاب المرضى المسنّون الذين يعانون من الغته بسكتة دماغية أو بذات الرئة أو بسلس بولي أو بحوادث سقوط أو بإرهاق أو بهلوسات بصرية أو بزيادة حرارة الجسم أو باحمرار الجلد أو باضطرابات في السير.

لدى هذه الفئة الخاصة من المرضى، أفيد عن حالات وفاة.

لدى المرضى المصابين بداء باركنسون، يمكن أن يُفقم زايبركسا فيلوتاب العوارض.

في حالات نادرة، بعد الاستعمال الطويل الأمد لأدوية من هذا النوع، يمكن أن ترى النساء إفرازاً للحليب وتغييراً أو اختفاءً للعادة الشهرية. في حال استمرار هذه التأثيرات، يُرجى مراجعة الطبيب. في حالات نادرة جداً، أُصيب أطفال حديثو الولادة عولجت أمهاتهم بزايبركسا فيلوتاب في نهاية فترة الحمل (خلال الفصل الثالث) بحالات رجفة ونوم دائم ونعاس.

في حال تفاقم أحد التأثيرات الجانبية أو إذا لاحظت أي تأثيراً جانبياً غير مذكور في هذه النشرة، الرجاء إعلام الطبيب.

٥. ما هي طريقة حفظ زايبركسا فيلوتاب

يجب إبقاء الدواء بعيداً عن متناول الأطفال ونظرهم.

لا تستعمل زايبركسا فيلوتاب بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المدوّن على العبوة. يجب حفظ زايبركسا فيلوتاب في غلافه الخارجي الأصلي لحمايته من النور والرطوبة.

الرجاء إعادة الأقراص غير المستعملة إلى الصيدلي. يجب عدم التخلص من الأدوية في ماء المراض أو في النفايات المنزلية.

إسأل الصيدلي حول طريقة التخلص من الأدوية التي لم تعد تحتاج إليها. سوف تساعد هذه الاجراءات على حماية البيئة.

٦. معلومات اضافية

على ماذا يحتوي زايبركسا فيلوتاب

– المادة الفاعلة هي الأولانزين. يحتوي كل قرص زايبركسا فيلوتاب

السرّيع الذويان في الفم على ٥ ملغ، ١٠ ملغ، ١٥ ملغ أو ٢٠ ملغ من المادة

الفاعلة. إن الكمية الدقيقة مدوّنة على عبوة أقراص زايبركسا فيلوتاب .

– المكونات الأخرى هي: هلام، مانيتول (E421)، أسبارتام (E951)،

باراهيدروكسيبنزوات مثيل الصوديوم (E219)، باراهيدروكسيبنزوات

بروبيل الصوديوم (E217).

شكل أقراص زايبركسا فيلوتاب ومحتوى العبوة

أقراص زايبركسا فيلوتاب ٥ ملغ، ١٠ ملغ، ١٥ ملغ أو ٢٠ ملغ هي أقراص

صفراء سريعة الذويان في الفم.

القرص السريع الذويان في الفم هو المصطلح التقني للقرص الذي يذوب مباشرة في الفم مما يسهل ابتلاعه.

أقراص زايبركسا فيلوتاب ٥ ملغ، ١٠ ملغ، ١٥ ملغ أو ٢٠ ملغ متوافرة في عبب من ٢٨ و ٣٥ و ٥٦ و ٧٠ قرصاً. يمكن ألا تكون أحجام العبب أو التركيزات كلها مسوّقة.

المصنّع: ليلي ش.م. شارع لاندوستريا ٣٠، ٢٨١٠٨ الكوينداس، مدريد، إسبانيا

لأيّ معلومات إضافية متعلّقة بهذا الدواء، الرجاء الاتصال بالممثل المحلي لحامل رخصة التسويق.

التاريخ الأخير الذي تمّت فيه مراجعة هذه النشرة هو كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٩.

إن هذا الدواء
● الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلفاً للتعليمات يعرضك للخطر
● إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك
● فالتبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضره
● لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك
● لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية
● لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال
مجلس وزراء الصحة العرب اتحاد الصيدلة العرب