

## زيرتيك

## هيدروكلوريد سيتريرين

### الأشكال الصيدلانية وقوتها

صندوق يحتوي على ١٠ و ٢٠ حبة مغلفة من دايهيدروكلوريد سيتريرين ١٠ ملغم.

قنبنة تحتوي على نقط ١٠ و ٢٠ مل من دايهيدروكلوريد سيتريرين ١٠ ملغم / مل.

قنبنة تحتوي على محلول ٧٥ مل و ٢٠٠ مل من دايهيدروكلوريد سيتريرين - ١ ملغم / مل.

**طريقة الاستعمال :** يؤخذ عن طريق الفم.

### التركيب:

• حبوب مغلفة ١٠ ملغم دايهيدروكلوريد سيتريرين ١٠ ملغم - ميكروكريستالين سيليلوز - لكتوز مونوهيدرات - كوليديل أنهيدروس سيليكيا - مغنيسيوم سترات بما يكفي الحبة - أوبادري واي - ٧٠٠٠ (هيدروكسي بروبيل ميثيل سيليلوز - ثاني أكسيد تيتانيوم - ماركوجول ٤٠٠) للتغليف.

• نقط بالغم ١٠ ملغم/مل : (دايهيدروكلوريد سيتريرين ١٠ ملغم - حامض الأسيتك - جليسرول - ميثيل باراهيدروكسي بنزوات - أسيتات الصوديوم - صوديوم سكرينات - بروبيلين جليكول - ماء مصفى بكمية تكفي ١ مل (٢٠ نقطة).

• محلول يؤخذ بالغم ١ ملغم/مل : (دايهيدروكلوريد سيتريرين ١ ملغم - حامض أسيتك - جليسرول - ميثيل باراهيدروكسي بنزوات - يروبيل باراهيدروكسي بنزوات - أسيتات الصوديوم - سوريثول ٧٠ بالمائة (غير مخلوب) - نكهة موز صناعية (هيريوج ٤٢/١٠٧٦) - ماء مصفى بما يكفي ١ مل.

**المجموعة الدوائية :** مضاد للحساسية

### التحذيرات:

يؤسى بي إس إيه ، ٦٠ الي دي لاريشوش ، ١٠٧٠ بروكسل بلجيكا

**المصنع** نقط ومحلول عن طريق الفم

أقراص - يوسبي بي فارشم إس إيه يوسبي بي فارما إس . بي إيه

بول - سويسرا

### الإستعمالات :

لللباطين والأطفال من سن سنتين فما فوق :

لعلاج أعراض التهاب الأنف الموسمي وأعراض الملتهمة والتهاب الأنف التحسسي الدائم.

وأيضاً لعلاج الحكة والارتيكاريا الناشئة من الحساسية.

### موانع الاستعمال :

فرط الحساسية لمكونات الدواء.

### التفاعلات :

ليست هناك تفاعلات معروفة حتى اليوم مع الأدوية الأخرى.

وعلى أي حال يوصى بالحذر إذا كان يتم أخذ المهدئات.

### التحذيرات الخاصة :

لم يظهر سيتريرين من خلال الجرعات العلاجية أنه يزيد تأثيرات الكحول (لستوى الكحول في الدم بنسبة ٠,٨ غم/ل).

وعلى أي حال يوصى بالحذر.

### الحمل والرضاعة :

لم تظهر دراسات السمخ في الحيوانات أية آثار عكسية.

وكإجراء احتياطي على أي حال يجب عدم إعطاء سيتريرين للحوامل خلال الفترة أشهر الأولى من الحمل كما ينبغي ألا تتناول

الرضعات الدواء.

### قيادة السيارات وتشغيل الآلات:

لم تظهر الدراسات التي أجريت على متطوعين أصحاء بإعطائهم ٢٠ إلى ٢٥ ملغم . يوم آثاراً على اليقظة وزمن الاستجابة ويجب أن ينصح المريض على أي حال بالحذر بعدم تجاوز الجرعة الموصى بها.

### تعليمات الإستعمال:

#### لللباطين والأطفال من سن ٦ سنوات فما فوق:

في معظم الحالات تكون الجرعة الموصى بها جرعة فردية ١٠ ملغم في اليوم.

من المستحسن أخذ الدواء مع قليل من السوائل أثناء وجبة المساء حيث أن أعراض المرض تظهر خلال الليل.

وبالنسبة للمرضى الذين يصابون بآثار جانبية يمكن أخذ الجرعة بمقدار ٥ ملغم في الصباح و ٥ ملغم في المساء.

#### الأطفال من سن سنتين الي ٦ سنوات:

الجرعة التي يوصى بتناولها هي ٥ ملغم دفعة واحدة أو ٢,٥ ملغم في الصباح وفي المساء.

**الحبوب:** حبة واحدة ١٠ ملغم - ١/٢ حبة - ٥ ملغم.

**النقط:** ٢٠ نقطة (= ١ مل) = ١٠ ملغم ١٠ نقط (= ٠,٥ مل) - ٥ نقط (= ٠,٢٥ مل) - ٢,٥ ملغم.

**المحلول:** ١٠ مل محلول = ١٠ ملغم = ٥ مل محلول = ٥ ملغم - ٢,٥ مل محلول = ٢,٥ ملغم.

#### فرط الجرعة :

يمكن أن ينتج النعاس عن فرط الجرعة إذا تم تناول ٥٠ ملغم في جرعة واحدة.

ولا يوجد حتى اليوم بواء سمى لذلك وفي حالة فرط الجرعة بشكل كبير يجب إجراء غسيل للمعدة في أقرب وقت ممكن.

وقضلاً عن الإجراءات المساندة المعتادة فيجب مراقبة جميع الأعضاء الحيوية في الجسم بشكل منتظم.

#### الأثار غير المرغوبة:

وردت تقارير عن آثار جانبية خفيفة وعابرة مثل الصداع والدوار والنعاس والتهيج وجفاف الفم والإضطرابات المعدية المعوية.

وفي الاختبارات الموضوعية التي أجريت على وظيفة الحركة النفسية فقد كانت التهذبة بواسطة سيتريرين مماثلة لتأثير بلاسيبو.

ونادراً ما أبلغ عن أعراض التحسس.

#### تاريخ انتهاء الصلاحية :

يجب ملاحظة تاريخ انتهاء الصلاحية ، وهو مبين على الغلاف بعد كلمة «تاريخ انتهاء الصلاحية».

#### التخزين :

يحفظ في درجة حرارة الغرفة (١٥ إلى ٢٥°م).

#### تاريخ آخر تعديل: تشرين أول (أكتوبر) ٢٠٠٤

إذا كانت هناك أي شكوى يرجى ذكر رقم مراقبة الدفعة المبين على الغلاف.

يؤسى بي إس إيه قسم الصيدلة

برلين ليويد بلجيكا

#### إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤخذ على صحتك واستهلاكه خلافًا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة الطبيب.

#### لاترتك الدواء في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب  
 واتحاد الصيدلانية العرب

