

قم قراءة هذه النشرة جيداً قبل استعمال أو تناول هذا الدواء

□ احتفظ بهذه النشرة لأنك قد تحتاج إلى لاحقاً.

□ في حال كانت لديك أي سلطة تتعلق بهذا المستحضر قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

□ إن هذا الدواء قد صرخه خصيصاً لك بناء على وصفة طيبة،

ولهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن عاني منها.

□ قم بالاتصال بطبيبك المعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة.

تتحقق هذه النشرة على:

١. ماهو بكتول وما هي دواعي استعماله

٢. قبل القيام بتناول أو استعمال بكتول

٣. طرقة استخدام بكتول

٤. الأعراض الجانبية المحتملة

٥. ظروف تخزين بكتول

٦. معلومات إضافية

١. ماهو بكتول وما هي دواعي استعماله

بكتول يحتوي على المادة الفعالة سيبروفلوكوكساسيين.

سيبروفلوكوكساسيين هو مضاد حيوي يتميّز إلى مجموعة الفلوروكوبينولون. يعمل سيبروفلوكوكساسيين عن طريق قتل البكتيريا

البacteriابعد العدوى، وهو يعمل على سلالات معينة من البكتيريا.

يسخدم بكتول في البالغين لعلاج العدوى البكتيرية التالية:

□ عدوى الجهاز التنفسى

□ عدوى الأذن أو الجيوب الأنفية طويلة الأمد و المتركرة

□ عدوى الجهاز البولى

□ عدوى الجهاز التناسلي عند الرجال و النساء

□ عدوى الجهاز المخاطي والمعدوى داخل البطن

□ عدوى الجلد والأنسجة الرخوة

□ عدوى العظام والمفاصل

□ لمنع العدوى نتيجة بكتيريا التسربة السحلية

□ استنشاق الجمرة الخبيثة

من الممكن استخدام سيبروفلوكوكساسيين في معالجة المرضى الذين

يعانون من انخفاض عدد كريات الدم البيضاء (قلة العدالة) و

لديهم حمى والتي من المتوقع أن تكون بسبب عدوى بكتيرية.

إذا كنت تعاني من عدوى وخيمة أو من عدوى تسبّبها أكثر من

نوع واحد من البكتيريا، فقد تتعطى مضاد حيوي آخر بالإضافة

إلى بكتول.

الأطفال والمرأهقين:

يستخدم بكتول عند الأطفال و المرأةهقين تحت إشراف طبى

متخصص لعلاج عدوى البكتيريا التالية:

□ عدوى الرئة والقصبات عند الأطفال و المرأةهقين الذين يعانون

من التأثير الكيسى

□ عدوى المussels البولية المصحوب بمضاعفات، والتي تشمل

العدوى التي تصل إلى الكلية (التهاب الحويضة والكلية)

□ استنشاق الجمرة الخبيثة

□ قبيل القيام بتناول أو استعمال بكتول:

إذا كنت تعاني من حساسية مفرطة لل المادة الفعالة، أو لأي دواء

آخر من مجموعة الكوبينولون أو لأي من المكونات الأخرى لهذا

الدواء (انظر إلى القسم ٦).

إذا كنت تتناول تيزايندين (انظر إلى القسم ٢: تناول أدوية أخرى

مع بكتول).

لعلاج الإنفلاتات التي قد تتحسن بدون علاج أو تكون غير

شديدة (مثل التهابات الحق).

□ لعلاج الإنفلاتات غير البكتيرية، مثل التهاب البروستات غير

البكتيرى (المزمن).

□ لمنع الإصابة بالإيساب عند البول التي لا تتجاوز المثانة).

□ لعلاج الإنفلاتات غير البكتيرية الطفيف أو المتوسطة ما لم تكن

الأدوية المضادة للبكتيريا الأخرى الموصى بها عادة لهذه التهابات

لا يمكن استخدامها.

□ الأهم من ذلك، يجب تجنب استخدام بكتول عموماً عند المرضى

من مجموعة الفلوروكوبينولون أو الكوبينولون. وينبغي استخدامها

بحذر خاص في كبار السن، والمرضى الذين يعانون من أمراض

الكتي وأولئك الذي خضعوا لزراعة الأعضاء لأن هؤلاء المرضى

هم أكثر عرضة لاصابة الورم. وبينما ان استخدام الكورتيكosteroid مع الفلوروكوبينولون يزيد أيضاً من الخطير، فإنه ينبغي تجنب

استخدام الكورتيكosteroid مع هذه الأدوية.

قبل تناول بكتول:

يجب لا تتناول الأدوية المضادة للبكتيريا الفلوروكوبينولون/

الكوبينولون، بما في ذلك بكتول، إذا كنت قد واجهت أي تناول

الفلوروكوبينولون. في هذه الحال، يجب عليك إبلاغ طبيبك في

أقرب وقت ممكن.

الاحتياطات عند استعمال بكتول:

إذا كنت طبيبك قبل أن تتناول بكتول:

إذا كنت في أي وقت مضى من مشاكل بالكتي لأن العلاج قد

يحتاج إلى تعديل.

□ إذا كنت تعاني من صرخة أو أي مرض عصبي آخر.

□ إذا عانيت من مشاكل في الأوتار العضلية خلال فترة علاج سابقة

استخدام مضادات بيوهيدرو مثلك بكتول.

□ إذا كنت مصاباً بمرض السكر لأنك قد تواجه خطر نقص سكر

الدم مع سيبروفلوكوكساسيين.

□ إذا كنت تعاني من عضلي وبيهيل (نوع من ضعف

العضلات) لأن الأعراض من الممكن أن تتفاقم.

□ إذا كنت قد تمت شخيصك بتضخم أو "تفاقح" أحد الأوعية الدموية

الكبيرة.

□ إذا كنت قد شهدت نوبة سابقة من تسلخ الأبهير (تمزق في جدار

الشريان الأبهير).

□ إذا تم تشخصك بشرب صمامات القلب (ارتفاع صمام القلب).

□ إذا كان لديك تاريخ عائلي من الإصابة بتمدد الأبهير أو شلخ

أو الحالات المؤهبة (مثل اضطرابات الصمام مثل متلازمة

مارفان أو متلازمة إهارز دانلوكس، متلازمة تيور، متلازمة

سجورجن [أمراض العانة الذاتية الانهائية]، أو اضطرابات

الأوعية الدموية مثل التهاب الشريان تاكايسو، والتهاب الشريان

ذي الخلايا العضلية، ومرض بجهت، وارتفاع ضغط الدم، أو

تصليب الشريان المعرّوف، والتهاب المussels الروماتويدي [مرض

المماض] أو انتهاك التغافل [عدوى القلب].

□ إذا كان لديك سجل طبي غير ضروري، لأنك قد تواجه خطر تمزق

القلب أو إذا كنت تعاني من صرخة أو أي مرض عصبي آخر.

□ إذا عانيت من مشاكل في الأوتار العضلية خلال فترة علاج سابقة

استخدام مضادات بيوهيدرو مثل بكتول.

□ إذا كنت مصاباً بمرض السكر لأنك قد تواجه خطر نقص سكر

الدم مع سيبروفلوكوكساسيين.

□ إذا كنت تعاني من عضلي وبيهيل (نوع من ضعف

العضلات) لأن الأعراض من الممكن أن تتفاقم.

□ إذا كنت قد تمت شخيصك بتضخم أو "تفاقح" أحد الأوعية الدموية

الكبيرة.

□ إذا كنت قد شهدت نوبة سابقة من تسلخ الأبهير (تمزق في جدار

الشريان الأبهير).

□ إذا تم تشخصك بشرب صمامات القلب (ارتفاع صمام القلب).

□ إذا كان لديك تاريخ عائلي من الإصابة بتمدد الأبهير أو شلخ

أو الحالات المؤهبة (مثل اضطرابات الصمام مثل متلازمة

مارفان أو متلازمة إهارز دانلوكس، متلازمة تيور، متلازمة

سجورجن [أمراض العانة الذاتية الانهائية]، أو اضطرابات

الأوعية الدموية مثل التهاب الشريان تاكايسو، والتهاب الشريان

ذي الخلايا العضلية، ومرض بجهت، وارتفاع ضغط الدم، أو

تصليب الشريان المعرّوف، والتهاب المussels الروماتويدي [مرض

المماض] أو انتهاك التغافل [عدوى القلب].

□ إذا كان لديك سجل طبي غير ضروري، لأنك قد تواجه خطر تمزق

القلب أو إذا كنت تعاني من صرخة أو أي مرض عصبي آخر.

□ إذا عانيت من مشاكل في الأوتار العضلية خلال فترة علاج سابقة

استخدام مضادات بيوهيدرو مثل بكتول.

□ إذا كنت مصاباً بمرض السكر لأنك قد تواجه خطر نقص سكر

الدم مع سيبروفلوكوكساسيين.

□ إذا كنت تعاني من عضلي وبيهيل (نوع من ضعف

العضلات) لأن الأعراض من الممكن أن تتفاقم.

□ إذا كنت قد تمت شخيصك بتضخم أو "تفاقح" أحد الأوعية الدموية

الكبيرة.

□ إذا كنت قد شهدت نوبة سابقة من تسلخ الأبهير (تمزق في جدار

الشريان الأبهير).

□ إذا تم تشخصك بشرب صمامات القلب (ارتفاع صمام القلب).

□ إذا كان لديك تاريخ عائلي من الإصابة بتمدد الأبهير أو شلخ

أو الحالات المؤهبة (مثل اضطرابات الصمام مثل متلازمة

مارفان أو متلازمة إهارز دانلوكس، متلازمة تيور، متلازمة

سجورجن [أمراض العانة الذاتية الانهائية]، أو اضطرابات

الأوعية الدموية مثل التهاب الشريان تاكايسو، والتهاب الشريان

ذي الخلايا العضلية، ومرض بجهت، وارتفاع ضغط الدم، أو

تصليب الشريان المعرّوف، والتهاب المussels الروماتويدي [مرض

المماض] أو انتهاك التغافل [عدوى القلب].

□ إذا كان لديك سجل طبي غير ضروري، لأنك قد تواجه خطر تمزق

القلب أو إذا كنت تعاني من صرخة أو أي مرض عصبي آخر.

□ إذا عانيت من مشاكل في الأوتار العضلية خلال فترة علاج سابقة

استخدام مضادات بيوهيدرو مثل بكتول.

□ إذا كنت مصاباً بمرض السكر لأنك قد تواجه خطر نقص سكر

الدم مع سيبروفلوكوكساسيين.

□ إذا كنت تعاني من عضلي وبيهيل (نوع من ضعف

العضلات) لأن الأعراض من الممكن أن تتفاقم.

□ إذا كنت قد تمت شخيصك بتضخم أو "تفاقح" أحد الأوعية الدموية

الكبيرة.

□ إذا كنت قد شهدت نوبة سابقة من تسلخ الأبهير (تمزق في جدار

الشريان الأبهير).

□ إذا تم تشخصك بشرب صمامات القلب (ارتفاع صمام القلب).

□ إذا كان لديك تاريخ عائلي من الإصابة بتمدد الأبهير أو شلخ

أو الحالات المؤهبة (مثل اضطرابات الصمام مثل متلازمة

مارفان أو متلازمة إهارز دانلوكس، متلازمة تيور، متلازمة

سجورجن [أمراض العانة الذاتية الانهائية]، أو اضطرابات

الأوعية الدموية مثل التهاب الشريان تاكايسو، والتهاب الشريان

ذي الخلايا العضلية، ومرض بجهت، وارتفاع ضغط الدم، أو

تصليب الشريان المعرّوف، والتهاب المussels الروماتويدي [مرض

المماض] أو انتهاك التغافل [عدوى القلب].

□ إذا كان لديك سجل طبي غير ضروري، لأنك قد تواجه خطر تمزق

القلب أو إذا كنت تعاني من صرخة أو أي مرض عصبي آخر.

□ إذا عانيت من مشاكل في الأوتار العضلية خلال فترة علاج سابقة

استخدام مضادات بيوهيدرو مثل بكتول.