

معلومات لمستخدم الدواء

النشرة الداخلية للمستحضر الصيدلاني
كبسولات جاباتن الصلبة ٣٠٠، ١٠٠، ملغ ٤

جاباتن

قم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل استعمال أو تناول هذا الدواء

احفظ بهذه النشرة، لأنك قد تحتاج إليها لاحقاً.

في حال كانت لديك أي أسئلة تتعلق بهذا المستحضر فم

باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

إن هذا الدواء قد صرفة حصرياً لك بناء على وصفة

طبية، وهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص حتى وإن

كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي سبق وأن

عانت منها.

قم بالاتصال بطبيك المعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة

الأعراض الجانبية أو الإصابة بعرض جانبي لم يتم ذكره في

هذه النشرة.

تحتوي هذه النشرة على:

١. ما هو جاباتن وما هي دواعي استعماله

٢. قبل القيام بتناول أو استعمال جاباتن

٣. طريقة استخدام جاباتن

٤. الأعراض الجانبية

٥. طرفة تخزين جاباتن

٦. معلومات إضافية

١. ما هو جاباتن وما هي دواعي استعماله

يتنبئ جاباتن إلى مجموعة من الأدوية التي تستعمل لعلاج

الصرع وألم الاعتلال العصبي الطرفي (الم طولية للأمد

ناجمة عن تلف الأعصاب).

المادة الفعالة الموجودة في جاباتن هي جاباتن.

يسخدم جاباتن لمعالجة:

الصرع: يوصف جاباتن كعلاج مساعد في علاج نوبات

الصرع الجزئية مع دون تعليم ثانوي في البالغين والأطفال

الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ سنوات وما فوق.

يوصف جاباتن كعلاج لوحده في علاج نوبات الصرع

الجزئية مع ويدون تعليم ثانوي في البالغين والراهقين الذين

تتراوح أعمارهم بين ١٢ سنة وما فوق.

علاج الم الأعصاب الطرفية: يوصف جاباتن لعلاج

الم الأعصاب الطرفية مثل اعتلال الأعصاب السكري المؤلم

والالم العصبي بعد إصابة بالهربس عند البالغين.

٢. قبل القيام بتناول أو استعمال جاباتن

موضع استعمال جاباتن:

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى، فقد يصف لك طبيك

جدول جرارات مختلف.

كنت تقوم بغسل الكلى (إزالة الفضلات المنتجة بسب

فشل الكلى) عليك إخبار طبيك إذا حدث لك ألم / أو ضعف

في العضلات.

حدث لك اعراض مثل ألم مستمر في الجهاز التفصي.

بالمرض أو أن تكون مريضاً، فإن عليك الاتصال بطبيك

بماشة، لأنها قد تكون أعراض لانهاب حاد في البكيريا.

كان لديك اصوات ابرات في الجهاز العصبي، اضطرابات في

الجهاز التفصي، أو إذا كان عمرك أكثر من ٦٥ عاماً، فقد

يصف لك طبيك نظاماً مختلفاً للجرارات.

يرتبط جاباتن مباشرة إذا حدث لك ألم في الرأس دون

أن يصاحب ذلك استخدام المواد الأفيونية.

وقد ارتبط جاباتن مع الشلل الشديد في الجهاز التفصي.

المرضى الذين يعانون من فشل في ظائف التنس، مرض

العصبي أو عصبي، القصور الكلوي، و يصاحب ذلك استخدام

مثبتات الجهاز العصبي ويكون كبار السن الأكثر عرضة

لهذه الآثار الجانبية الشديدة. قد يكون من الضروري تعديل

الجرعة لمؤلفه المرضى.

تم الإبلاغ عن حالات سوء الاستخدام والاعتماد على

الجاباتن من مرحلة ما بعد التسويق. تحدث إلى طبيك إذا

كان لديك سوابق سوء الاستخدام أو الإعتماد.

معلومات مامة حول تفاعلات الماء:

الجاتناتيات راودتهم أفكار عن إياده انفسهم أو قتل نفسهم.

عدد قليل من الأشخاص الذين يتناولون جاباتن قد يحدث لهم

تفاعل تحسسي أو تفاعلات جدية محتمل الخطورة، والذي قد

يؤدي إلى مشاكل وخيمة إذا لم يتم معالجه. يجب عليك

التعرف على هذه الأعراض للانتهاء لها أثناء تناولك جاباتن.

اقرأ وصف هذه الأعراض الموجودة في قسم ٤ داخل النشرة

تحت عنوان "اتصل بطبيك مباشرة إذا حدث لك أي من هذه

الأعراض الجانبية بعد تناول هذا الدواء لأن هذه الأعراض قد

تكون خطيرة".

عدد قليل من الأشخاص الذين عولجوا بمضادات الصرع مثل

الجاباتن راودتهم أفكار عن إياده انفسهم أو قتل نفسهم.

أرادونك هذه الأعراض الموجدة في قسم ٤ داخل النشرة

ضفت في العضلات، تيبيس أو ألم وخاصة إذا شعرت في

الوقت نفسه بتوعك أو قيلت ذلك تحطم عصلي غير طبيعى يمكن

أن يهدد الحياة و يؤدي إلى مشاكل في الكلى، قد تواجه أيضاً

تغير لون البول وتغير في تناول اختيار الم (ارتفاع درجة

الكرياتينين فوسفوكينيز في الدم بشكل ملحوظ). إذا وجهت أي

من هذه العلامات أو الأعراض، يرجى الاتصال بطبيك على

الغور.

قد تحدث صعوبات ت نفس خطيرة في المرضى الذين

يستخدمن جاباتن أو جاباتن أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت

يرجي أخبار طبيك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت

مؤخرأً أي أدوية أخرى. على وجه الخصوص، أخبر طبيك

(أو الصيدلي) إذا كنت تتناول أو كنت تتناول مؤخرأً أي أدوية

للتشتفات، اضطرابات النوم، الاكتئاب، القلق أو أي مشاكل

عصبية أو نفسية أخرى.

إذا كنت تتناول أو تناولت على مواد الأفيونية مثل مورفين

المورفين، يرجى أن تخبر طبيك أو الصيدلي حيث أن المواد

الأفيونية قد تزيد من تأثير جاباتن. بالإضافة أنه قد يسبب

مزاج في جاباتن مع المواد الأفيونية أعراض مثل العصعص و/

أو انخفاض في التنس.

مضادات الحموضة لمعالجة عسر الهضم

إذا تم تناول جاباتن أو مغزيريون في نفس الوقت، فإن امتصاص جاباتن بعد

المعدة قد ينخفض. لذلك فإنه ينصح بتناول مضادات الحموضة.

٣. تناول جاباتن مع الطعام:

يمكن تناول جاباتن مع الطعام أو بدونه.

الحمل، الرضاعة والخصوبة:

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين أنك حامل أو تخططن

لإنجاب طفل، اسأل طبيك أو الصيدلي أو المستشفى قبل

تناول جاباتن.

٤. تناول جاباتن مع الطعام:

يمكن تناول جاباتن مع الطعام أو بدونه.

الحمل، الرضاعة والخصوبة:

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين أنك حامل أو تخططن

لإنجاب طفل، فيرجى الاتصال بطبيك أو الصيدلي أو المستشفى

بالأدوية التي تتناولها.

تناول جاباتن مع الطعام:

قد ينبع تناول جاباتن على الماء من ارتفاع درجة

الحرار، فقد يكون سبب ذلك تحطم عصلي غير طبيعى يمكن

أن يهدد الحياة و يؤدي إلى مشاكل في الكلى، قد تواجه أيضاً

تضفت في العضلات، تيبيس أو ألم وخاصة إذا شعرت في

الوقت نفسه بتوعك أو قيلت ذلك تحطم عصلي غير طبيعى يمكن

أن يهدد الحياة و يؤدي إلى مشاكل في الكلى، قد تواجه أيضاً

تضفت في العضلات، تيبيس أو ألم وخاصة إذا شعرت في

الوقت نفسه بتوعك أو قيلت ذلك تحطم عصلي غير طبيعى يمكن

أن يهدد الحياة و يؤدي إلى مشاكل في الكلى، قد تواجه أيضاً

تضفت في العضلات، تيبيس أو ألم وخاصة إذا شعرت في

الوقت نفسه بتوعك أو قيلت ذلك تحطم عصلي غير طبيعى يمكن

أن يهدد الحياة و يؤدي إلى مشاكل في الكلى، قد تواجه أيضاً

تضفت في العضلات، تيبيس أو ألم وخاصة إذا شعرت في

الوقت نفسه بتوعك أو قيلت ذلك تحطم عصلي غير طبيعى يمكن

أن يهدد الحياة و يؤدي إلى مشاكل في الكلى، قد تواجه أيضاً

تضفت في العضلات، تيبيس أو ألم وخاصة إذا شعرت في

الوقت نفسه بتوعك أو قيلت ذلك تحطم عصلي غير طبيعى يمكن

أن يهدد الحياة و يؤدي إلى مشاكل في الكلى، قد تواجه أيضاً

تضفت في العضلات، تيبيس أو ألم وخاصة إذا شعرت في

الوقت نفسه بتوعك أو قيلت ذلك تحطم عصلي غير طبيعى يمكن

أن يهدد الحياة و يؤدي إلى مشاكل في الكلى، قد تواجه أيضاً

تضفت في العضلات، تيبيس أو ألم وخاصة إذا شعرت في

الوقت نفسه بتوعك أو قيلت ذلك تحطم عصلي غير طبيعى يمكن

أن يهدد الحياة و يؤدي إلى مشاكل في الكلى، قد تواجه أيضاً

تضفت في العضلات، تيبيس أو ألم وخاصة إذا شعرت في

الوقت نفسه بتوعك أو قيلت ذلك تحطم عصلي غير طبيعى يمكن

أن يهدد الحياة و يؤدي إلى مشاكل في الكلى، قد تواجه أيضاً

تضفت في العضلات، تيبيس أو ألم وخاصة إذا شعرت في

الوقت نفسه بتوعك أو قيلت ذلك تحطم عصلي غير طبيعى يمكن

أن يهدد الحياة و يؤدي إلى مشاكل في الكلى، قد تواجه أيضاً

تضفت في العضلات، تيبيس أو ألم وخاصة إذا شعرت في

الوقت نفسه بتوعك أو قيلت ذلك تحطم عصلي غير طبيعى يمكن

أن يهدد الحياة و يؤدي إلى مشاكل في الكلى، قد تواجه أيضاً

تضفت في العضلات، تيبيس أو ألم وخاصة إذا شعرت في

الوقت نفسه بتوعك أو قيلت ذلك تحطم عصلي غير طبيعى يمكن

أن يهدد الحياة و يؤدي إلى مشاكل في الكلى، قد تواجه أيضاً

تضفت في العضلات، تيبيس أو ألم وخاصة إذا شعرت في

الوقت نفسه بتوعك أو قيلت ذلك تحطم عصلي غير طبيعى يمكن

أن يهدد الحياة و يؤدي إلى مشاكل في الكلى، قد تواجه أيضاً

تضفت في العضلات، تيبيس أو ألم وخاصة إذا شعرت في

الوقت نفسه بتوعك أو قيلت ذلك تحطم عصلي غير طبيعى يمكن

أن يهدد الحياة و يؤدي إلى مشاكل في الكلى، قد تواجه أيضاً

تضفت في العضلات، تيبيس أو ألم وخاصة إذا شعرت في

الوقت نفسه بتوعك أو قيلت ذلك تحطم عصلي غير طبيعى يمكن

أن يهد