

انتيروجيرمينا® 2 ملليار/5 مل،

معلق للشرب

يزيد العصبية المغلقة (Bacillus clausii) معددة المقاومة للمضادات الحيوية

أفرو جيداً هذه النشرة يأكلها قبل استعمال هذا الدواء.

هذا الداء هو مخصوص للتطبيب الذاتي، يمكن استعماله لمعالجة اضطرابات خفيفة وعابرة يسهل التعرف عليها ويمكن معالجتها دون الجوء إلى طبيب.

يمكن الحصول عليه من دون وصفة طبية ولكن يجب استعماله بشكل صحيح لضمان فعاليته

وتحقيق التأثيرات غير المرغوب فيها.

في حال تناول الأعراض بعد فترة قصيرة من العلاج، استش طبياً.

في هذه النشرة:

1. ما هو انتيروجيرمينا وفي أي حالة يستعمل

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول انتيروجيرمينا

3. كيف يعطي انتيروجيرمينا

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها

5. كيف يحظى انتيروجيرمينا

6. معلومات إضافية

1. ما هو انتيروجيرمينا وفي أي حالة يستعمل

انتيروجيرمينا هو بروبروتين معوي، إنه يحتوي على كائنات مجهرية حية مضادة للإسهال

تساعد على علاج احتلال توازن الزمرة الجرثومية المعاوية والوقاية منه.

يمكن أن يعيّد توازن الزمرة الجرثومية الذي يدخل خلال المعالجة بواسطة المضادات الحيوية

أو المعالجة الكيميائية، وبالتالي يؤدي إلى تحسين التقصّص في الفيتامينات الناتجة عن ذلك

(أي خلل انتاج ونفث الفيتامينات).

يمكن استعمال انتيروجيرمينا كأصل الربيع على شكل معلق للشرب لمعالجة اضطرابات

العصبية المعاوية والفرمدة الناشطة إما من تسمم أو من عدم توازن الزمرة الجرثومية المعاوية

المصووبة بحسب الحاجة في إنتاج ونفث الفيتامينات.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول انتيروجيرمينا

إن الوجود المختلط لحيتان، أي جزيئات غقرة جداً، ظاهرة في قارورات انتيروجيرمينا هو

نتيجة تكسس بزيارات العصبية المغلقة (Bacillus clausii) وليس إشارة تدل على تلف

المختضر.

تنقّل صحي

الزمرة الجرثومية المعاوية تمثل حاجزاً دفاعياً حقيقياً ضد الكثيريا الضارة، توازنها يمكن أن يصاب

بخلل بسبب إدخال معيون، تسمى اضطرابات غذائية، تغيرات في النظام الغذائي واستعمال المضادات

الحيوية، يتظاهر هذا الحال على شكل إسهال، أو جائع في البطن أو تبول البطن.

لا تتناول أبداً انتيروجيرمينا.

إذا كان لديك حساسية (حساسية مفرطة) للمادة الفعالة أو لإحدى المكونات الأخرى.

تناول أدوية أخرى

في حال استعمال أثناء المعالجة بمضاد حيوى، ينصح بتناول انتيروجيرمينا بين جرعتين

متتاليتين من المضاد الحيوي، ليس هناك دواء أو غذاء معروف يمكن أن يؤثر على فعالية

انتيروجيرمينا، إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً دواء آخر، بما في ذلك دواء حصلت عليه من

دون وصفة طبية، يجب أن تطلع طبيبك أو الصيدلاني عن ذلك.

الحمل والإرضاع

يمكن استعمال انتيروجيرمينا خلال فترة الحمل والإرضاع.

3. كيف يعطي انتيروجيرمينا

المقادير

البالغون: قارورتين إلى 3 قارورات في اليوم.

الأطفال: قارورة إلى قارورتين في اليوم.

الرض: قارورة إلى قارورتين في اليوم.

انتبه: يجب عدم تجاوز المقادير الموصوفة من دون استشارة الطبيب.

طريقة الاستعمال

هذا الدواء مخصوص للاستعمال عن طريق الفم، يجب عدم حقنه وعدم إعطائه بطريق آخر.

رج القارورة قبل الاستعمال لفتحها، أler الجرة العلوى وانزعه، تناول محتوى القارورة كما هو

أو قففه بالماه أو شربه آخر (ملاك حلبي، شاي، عصير برتقال).

لتتجنب أي ظوث المطلع، يجب تناول الدواء بأسرع ما يمكن بعد فتح القارورة.

وتبريره

يج تناول انتيروجيرمينا بأوقات منتظمة خلال النهار.

استشر الطبيب في حال استمرار الأضطرابات أو إذا لاحظت تغيراً حديثاً في ظواهرها.

مدة العلاجية

انتبه: استعمل انتيروجيرمينا فقط للحالات قصيرة الأمد.

إن تناول أكثر مما يجب من انتيروجيرمينا
مستحسن التقديم بالمقابر الموصوفة

إذا نسيت تناول انتيروجيرمينا
لا يؤدي ذلك إلى مشكلة خاصة، إلا أنه يجب التذكير بأن تناول الجرعة الصحيحة والاستعمال
الدقائق الدوائية ساهم في غافلاته.

إذا توقف عن تناول انتيروجيرمينا
لم يبلغ عن أي تأثير خاص، باستثناء عياب التأثير العلاجي، إن كان لديك أسلطة أخرى عن
استعمال هذا الدواء، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلاني.

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها
مثل جميع الأدوية، يمكن لانتيروجيرمينا أن يسبب تأثيرات غير مرغوبية، إلا ذلك لا ينطبق

على الجميع، من تسويف هذا الدواء، ثم التأني عن تفاعلات تحسسية من ضمنها لفخ جدي وشري، التقديم بالتعليمات الموجودة في الشرة يختلف من مخاطر التأثيرات الجانبية.
في حال تفاقم إحدى التأثيرات أو في حال لاحظت تأثيراً غير مرغوب لم يتم ذكره في هذه

الشرة، أعلم طبيبك أو الصيدلاني بذلك.

5. كيف يحظى انتيروجيرمينا

يحظى بجرأة لا تزيد عن درجة متوية.

تاريج انتهاء الصلاحية: راجع التاريج الأقصى للاستعمال المدون على العلبة.

انتبه: يجب عدم تناول الدواء بعد تاريج انتهاء الصلاحية المدون على العلبة.
تاريج انتهاء الصلاحية: إذا لا يكون صالحًا إلا كان الدواء محفوظ بشكل صحيح في غلافه
الصليل، الحفظ الأصلي يعني بيعيه بعده تناول أي أسلطة أخرى وعن بصرهم.
يجب عدم رمي الأدوية بغير التوصيات أو مع الفضائل المتزنة: أسلال الصيدلاني عن كيفية
متناوله المعلومات المتعلقة بالدواء؛ لذلك يجب حفظ العلبة والنشرة.

6. معلومات إضافية

ماذا يحتوي انتيروجيرمينا؟

المادة الفعالة: هو بروبروتين معوي، إنه يحتوي على كائنات مجهرية حية مضادة للإسهال
العصبية المعاوية والفرمدة الناشطة إما من تسمم أو من عدم توازن الزمرة الجرثومية المعاوية.
Bacillus clausii معددة المقاومة للمضادات الحيوية.

المكونات الأخرى هي: ماء نقي.
معددة المقاومة للمضادات الحيوية: يعني مقاومة لعدد معين من المضادات الحيوية، لها ميزة
في غالبية الأدوية لانتيروجيرمينا تسمح بتناول الدواء بما يساوي حتى خلاف فتره العلاجية بالمضاد
الحيوي، أجل تقادري اختلال توازن الزمرة الجرثومية العلوية الذي تسببه المضادات الحيوية
نفسها (تيتسيلين، سيفاكسيسوربات، تيتراسكيل، موكولين، أفيتوز، نوكويوسين،
كلورامفينيكول، تاميغيفينيكول، لاتكموسين، إيزونيازيد، سكلورين، ريفامبيسين، حمض
تايديليكيس وحمض بيبسيديك).

محض العلاج الأخارجي

على مدة من 10 إلى 20 قارورة سعة 5 مل.

يمكن أن تكون بعض العبوات غير مسوقة.

حامل رخصة التسويق:

sanofi-aventis S.p.A.

Viale L. Bodio, 37/B - IT-20158 Milan (Italie)

المصنع:

sanofi-aventis S.p.A.

Viale Europa, 11 - Origgio (VA) - Italia

التاريخ الأخير الذي تم فيه التصديق على هذه الشرة هو شباط 2010.

عبر الفم
عدم الحقن



ان هذا الدواء

مستحضر يوثر على صحته واستلهامه خلافاً للتسلبيات يعركه للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتليمي الصيدلاني صرفها لك.

■ الطبيب والصيدلاني هما الخبريان في الدواء وفي تغذية وشرب.

■ لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من ثقاء نفسك.

■ لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.

■ لا ترك الأدوية في تناول الآفال.

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب