

## فليكسوتايد ديسكوس

### پروبيونات الفلوتيكارazon

التركيب الكيكي والمكمي

فليكسوتايد ديسكوس هو عبارة عن جهاز بلاستيكي مصبوغ بداخله شريط معدني يحتوي على ٦٠ فقاة على مسافات منتظمة كل منها يحتوي على حلقة من بروبيونات الفلوتيكارazon المتناهية في الدقة ٥٠٠ ميكروجرام، ١٠٠٠ ميكروجرام، ٢٠٠٠ ميكروجرام، أو ٤٠٠٠ ميكروجرام) وجزيئات أكبر حجم من الالكترون.

الشكل الصدلياني

جهاز لاستنشاق جرعات متعددة من مسحوق جاف.

التفاصيل الاكيلينيكية

الاستعمال العلاجي

بروبيونات الفلوتيكارazon عند اعطائه بالاستنشاق يوفر علاجاً قاتلًا للربو عند اعطاءه بالجرعات الموصى بها، له ينفعه جلوكوكورتيكودي قوي مضاد للالتهاب داخل الرئتين، مع حدوث تأثيرات غير مستحبة أقل تكراراً وشدة من التي تلاحظ عند اعطاء الكورتيكوسيروريدات جهازها.

التكبر: التعامل الوقائي في الحالات النادرة:

الريبو الشديد: المرضى الذين يحتاجون إلى دواء للربو مسحوق للشعب، عرضي ومنقطع، على أساس يومي منتظم.

الريبو الشديد: المرضى المصابون بربو غير ثابت أو متغير بالرغم على علاج وقائي أو مسحوق الشعب بقدرة.

كاف، عند بداية استعمال بروبيونات الفلوتيكارazon المستنشق، قد يتمكن العديد من هؤلاء المرضى من تقليل أو الاستغناء عن الحاجة لكورتيكوسيروريدات قوية، وذلك إلى حد ملحوظ.

الأطفال: أي طفل في حاجة إلى دواء وقائي، بما في ذلك المرضى الذين لا يتم التحكم لديهم بواسطة الأدوية الوقائية المتوفرة حالياً.

المعايير وطريقه الاعطاء

فليكسوتايد ديسكوس معد للاستنشاق عن طريق الفم فقط فليكسوتايد ديسكوس مناسب للعديد من المرضى، بما فيهما الذين يجدون صعوبة في استخدام منفذة ذات جرعات محددة لقبار.

يجب توعية المرضى بالطبيعة الوقائية للعلاج بفليكسوتايد ديسكوس، وبخضوره تناوله بانتظام حتى وإن ظهرت أعراض بيدها النادر الوقائي بكمال قوتها خلال ٤ إلى ٧ أيام.

على الأطباء الذين تزيد عن هذا الداء أن يكونوا على علم بأن بروبيونات الفلوتيكارazon له نفس فعالية المستوريدات المستنشقة الأخرى بغض جرعة الميكروجرام اليومية على وجه التقدير، مثلًا مقدار ٢٠٠٠ ميكروجرام من بروبيونات الفلوتيكارazon تعادل جرعة مقارنها ٢٠٠٠ ميكروجرام من داي بروبيونات البيكلوبينازون (تحتوي على CFC أو بروبيوسنان).

نظراً لخطورة تأثيراتها على الجسم، لا يجوز وصف جرعات تزيد عن ٥٠٠٠ ميكروجرام مرتين يومياً.

التكبر والأطفال الذين تزيد عن ١٦ سنة ١٠٠٠ ميكروجرام مرتين يومياً.

على الأطباء الذين ينصحون بهذا الداء أن يتوقفوا على علاجهم بالفوريوكروبيونات الفلوتيكارazon له نفس فعالية المستوريدات المستنشقة الأخرى بغض جرعة الميكروجرام اليومية على وجه التقدير، مثلًا مقدار ١٠٠٠ ميكروجرام من بروبيونات الفلوتيكارazon تعادل جرعة مقارنها ١٠٠٠ ميكروجرام من داي بروبيونات البيكلوبينازون (تحتوي على CFC أو بروبيوسنان).

المرضي المصابون بربو شديد، فالجرعا الأولية الشمونوجبة هي ١٠٠٠ ميكروجرام مرتين يومياً.

شدة: قد تتعذر الصورة على جرعات أولية تدارج من ٢٥٠ إلى ١٠٠٠ ميكروجرام مرتين يومياً، إذا كان يتوقف فانداة اكتينيكية.

اضافية، يجب استعمال جرعات تصل إلى ١٠٠٠ ميكروجرام مرتين يومياً، هذه الجرعات العالية لا يجوز مباشرتها إلا من قبل أخصائي في التعامل مع الريبو (كمبيت استشاري أو طبيب عام من ذوى الخبرة المناسبة).

يجب اعطاء المرضى جرعة أولية من بروبيونات الفلوتيكارazon المستنشق تناص شدة مرضهم.

الجرعات الأولية الشمونوجبة للأطفال الذين تزيد عن ٨ سنوات:

الريبو لدى العديد من الأطفال سيمكن التحكم به باستعمال نظام الـ ٥٠٠ ميكروجرام مرتين يومياً، بالنسبة للمرضى الذين لم يتم التحكم بالريبو لديه بشكل كافي، يجب تحفيظ فانداة اضافية زيادة جرعة إلى ٢٠٠٠ ميكروجرام مرتين يومياً.

الجرعة الأولية تدارج من ٢٥٠ إلى ١٠٠٠ ميكروجرام مرتين يومياً.

يجب معايرة الجرعة إلى أذى جرعة يمكن عندها الحفاظ على تحكم فعال بالريبو.

الجرعات الخاصة من المرضى:

لا يلزم تعديل الجرعة للمرضى المستنين أو المصابين بضعف وظيفة الكبد أو الكلى.

نواهي الاستعمال

شدّة السمية لأي من مكونات المستحضر.

تحذيرات وأحتياطيات

الريبو الشديد يطلب تقديراً طيباً بانتظام، بما في ذلك اختبار وظيفة الرئتين، نظراً لأن المرضي تهددهم نوبات شديدة و حتى الوفاة.

التدور المزاجي، والمستمر في التحكم بالريبو قد يهدى حياة المريض وفي هذا الوضع يجب تجنب النظر في زجاجة جرعة الكورتيكوسيروريد، كثأن المستحضرات المستنشقة الأخرى، قد تحدث تشنج شعبي مخالف للمتألف من ريزادة ضرورة في الصفير بعد تناول الجرعة.

يجب تجنب شرب سريع في مقدار الجرعة.

بروبيونات الفلوتيكارazon غير معد للاستعمال في ثوابت الريبو الحادة، ولكن التحكم مع المرض في الأجل الروتيني الطويل.

سيحتاج المرضي إلى تدوير التأثيرات جاهزية تناولها فوراً، وتقدير المحفول لتخفيض أعراض الريبو الحادة.

جهاري أو ماء ماء حذوي إذا كان هناك عدو.

الجرعة الأولى تدارج من ٢٥٠ إلى ١٠٠٠ ميكروجرام مرتين يومياً.

يجب تجنب تناوله في الأذى جرعة يمكن عندها الحفاظ على تحكم فعال بالريبو.

الفئات الخاصة من المرضى:

لا يلزم تعديل الجرعة للمرضى المستنين أو المصابين بضعف وظيفة الكبد أو الكلى.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.

المرضي الذي يجد صعوبة في احتفاظه بفمها، لا يجوز أن يأخذ جرعة يومياً.