

# Naftilux® 200 mg

## gélules

CODE 25528 - ALTAIR/ALTAIR



B/5700900

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

### COMPOSITION QUALITATIVE

naftidrofuryl oxalate

amidon de maïs, gomme laque, polyvidone, macrogol 4000, saccharose, talc ; enveloppe de la gélule : gélatine, érythrosine (E127).

### COMPOSITION QUANTITATIVE

naftidrofuryl oxalate..... 200 mg pour une gélule

### FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU EN UNITES DE PRISE

Gélule - Boîte de 20.

### CLASSE PHARMACO - THERAPEUTIQUE

VASODILATATEUR PERIPHERIQUE

Exploitant :

THERABEL LUCIEN PHARMA

19, rue Alphonse De Neuville

75017 PARIS

FRANCE

Fabricant :

THERABEL INDUSTRIES

ZE Les Playes - Jean Monnet

274 avenue de Bruxelles

83500 LA SEYNE SUR MER - FRANCE

### → DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

#### (INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Ce médicament est indiqué dans :

- les manifestations douloureuses de l'artérite (maladie des artères des Jambes entraînant des crampes douloureuses à la marche),
- les troubles neurologiques mineurs liés au vieillissement,
- le syndrome de Raynaud (trouble circulatoire des extrémités).

### → ATTENTION !

#### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

#### (CONTRE - INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- antécédents d'allergie au naftidrofuryl ou à l'un des composants du médicament,
- augmentation connue de la présence de certains cristaux (oxalate) dans les urines,
- antécédents de calcul rénal récidivant (calcium).

**EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN**

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

La prise du médicament sans boisson au moment du coucher peut entraîner une lésion de l'oesophage. Il est donc indispensable d'avaler toujours la gélule avec un grand verre d'eau.

Ce médicament contient 38 mg d'oxalate par gélule dosée à 200 mg, ce qui peut favoriser chez certaines personnes la survenue d'un calcul rénal. Il est donc recommandé de boire abondamment de l'eau pendant la durée du traitement.

**EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.**

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## GROSSESSE - ALLAITEMENT

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

## → COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

### POSOLOGIE

A titre indicatif, la posologie est de :

- 1 gélule, 3 fois par jour dans les manifestations douloureuses de l'artérite.
- 1 gélule, 2 fois par jour dans les troubles neurologiques mineurs liés au vieillissement, le syndrome de Raynaud.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE OU PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE :

- IL NE PEUT PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE

### MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale. Ainsi, la gélule est avalée avec un grand verre d'eau.

Avaler la gélule sans la croquer ni l'ouvrir, toujours avec un grand verre d'eau.

FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE

Les prises sont réparties au cours des repas.

### DUREE DU TRAITEMENT

SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

### CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Prévenir immédiatement un médecin.

### CONDUITE A TENIR AU CAS OU L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ETE OMISE

Prenez la dose suivante à l'heure habituelle ; ne doublez pas la dose.

## → EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

### (EFFETS INDESIRABLES)

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- troubles digestifs (diarrhée, nausées, vomissements, maux d'estomac),
- éruption cutanée
- exceptionnellement, quelques cas d'atteinte biologique du foie ont été signalés,
- chez quelques patients ayant pris le médicament sans boisson au moment du coucher, l'arrêt du transit de la gélule a provoqué une inflammation locale de l'oesophage,
- exceptionnellement calcul rénal (oxalate de calcium).

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

## → CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

SIGNEZ A VOTRE PHARMACIEN TOUT SIGNE VISIBLE DE DETERIORATION.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE : Mai 2005.

## CONSEIL A L'ATTENTION DES PATIENTS

Si vous souffrez du syndrome de Raynaud, il est recommandé : de protéger vos doigts du froid et de l'humidité (portez des gants), d'éviter les écarts de température importants et de bien couvrir votre corps.

Si vous souffrez de manifestations douloureuses de l'artérite, il est recommandé :

- d'arrêter de fumer ;
- d'apporter une attention particulière à vos pieds (hygiène et soins, port de chaussures adaptées) ;
- de marcher quotidiennement à condition que vous n'ayez pas de douleurs des membres inférieurs la nuit ou au repos, ni de plaie au niveau des pieds.



Les Laboratoires THERABEL LUCIEN PHARMA participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments vendus en France métropolitaine. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

B/5700900