



# Fongamil

NITRATE D'OMOCONAZOLE 1%

Crème, solution, poudre pour application locale

## Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que **Fongamil** et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **Fongamil** ?
3. Comment utiliser **Fongamil** ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **Fongamil** ?
6. Informations supplémentaires.

## 1 QU'EST-CE QUE FONGAMIL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient un antifongique (actif contre les champignons) et un antibiotique de la famille des imidazolés.

**Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines affections cutanées ou muqueuses dues à des champignons (mycoses).**  
C'est un traitement local.

## 2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER FONGAMIL ?

**N'utilisez jamais Fongamil si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants** (voir 6: « Informations supplémentaires »).

En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## Faites attention avec Fongamil :

### Précautions d'emploi

- S'il apparaît des réactions suggérant une sensibilisation ou de l'irritation, interrompez le traitement.
- Evitez les traitements sur une grande surface, sous pansements ou couches hermétiques surtout pour les nourrissons et les jeunes enfants.
- Évitez le contact avec les yeux.
- Il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (le pH acide favorise la multiplication de candida).
- En raison de la présence d'acide benzoïque, ce médicament peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des muqueuses.

**EN CAS DE DOUBTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Grossesse et allaitement :

Ce médicament, par voie cutanée, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## Informations importantes concernant certains composants de Fongamil :

**Fongamil Crème** contient de l'acide benzoïque et peut provoquer des irritations de la peau, des yeux et des muqueuses.

**Fongamil Solution** contient du propyléneglycol et peut provoquer des irritations de la peau.

## 3 COMMENT UTILISER FONGAMIL ?

**Fongamil** est à usage local : il s'applique directement sur la peau.

• **Fongamil Crème** : Appliquez 1 fois par jour avec massage régulier jusqu'à pénétration du produit. La durée du traitement varie selon la mycose : de 2 à 6 semaines.

• **Fongamil Solution** : Faites une application 2 fois par jour. Pulvérisez après agitation du flacon à plus de 10 cm des lésions en balayant toute la zone atteinte avec massage régulier.

La durée du traitement est d'environ 3 semaines.

• **Fongamil Poudre** : Poudrez les lésions en balayant toute la zone atteinte. Appliquez 2 fois par jour.

La durée du traitement est d'au moins 1 à 2 semaines.

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

**Si vous avez utilisé plus de Fongamil que vous n'auriez dû :** Une utilisation excessive pourra aggraver les effets indésirables tels que les rougeurs et l'érythème.

Contactez votre médecin ou votre pharmacien notamment si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice.

## 4 QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, **Fongamil** peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Ces effets peuvent être des manifestations d'intolérance locale :

- Démangeaisons,
- Irritations de la peau,
- Sensations de brûlure,
- Rougeurs.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veulez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5 COMMENT CONSERVER FONGAMIL ?

### Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser **Fongamil** après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Précautions particulières pour la **solution** :

- Récipient sous pression.
- Ne pas percer.
- Ne pas exposer à une chaleur excessive.
- Ne pas jeter au feu, même vide.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettent de protéger l'environnement.

## 6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

### Que contient ce médicament ?

La substance active est : Nitrate d'omoconazole ..... 1 g

Pour 100 g de produit.

Les autres composants sont :

Présentations	Autres composants
Crème	Paraffine liquide légère, Macrogolglycérides linoléiques, Polysorbate 40, Carbomère (carbopol 974 P), Hydroxyde de sodium, Acide benzoïque, Eau purifiée
Poudre	Silice colloïdale anhydre, talc
Solution pour application locale	Ethanol à 96% (v/v), Propyléneglycol Gaz propulseur : Azote

### Comment se présente Fongamil ?

**Fongamil** peut se présenter sous forme de **Crème** (tube de 15 g), de **Solution** pour application locale (flacon pressurisé de 30 g) ou de **Poudre** pour application locale (flacon de 30 g).

### Titulaire / Exploitant :

LABORATOIRES BAILLEUL - 8 rue Lavigier - 75017 Paris

**Fabricant Fongamil Crème et Fongamil Solution :** LABORATOIRES CHEMINEAU - 93 Route de Monnoie 37210 Vouvray

### Fabricant Fongamil Poudre :

THEPENIER PHARMA INDUSTRIE - Route d'Alençon 61400 Saint Léger Les Mortagne

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est juin 2011.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France) : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)