

نشرة العبوة: معلومات للمستهلك

لاميكيتال

٥ ملجم، ٢٥ ملجم، ٥٠ ملجم، ١٠٠ ملجم، ٢٠٠ ملجم ليكويتاب

لاميكيتال

٢٥ ملجم، ٥٠ ملجم، ١٠٠ ملجم أقراص

لاموتريجين

يرجى قراءة هذه النشرة بالكامل بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء؛ لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

احتفظ بهذه النشرة - فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

تم وصف هذا الدواء لك فقط، لا تعطي هذا الدواء لأي شخص آخرين. فقد يسبب ضررًا لهم، حتى لو كانت لديهم نفس علامات المرض الموجودة عنك.

إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي، وهذا يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. انظر القسم ٤.

محتويات هذه النشرة

- ما هو لاميكيتال وما هي دواعي استعماله**
- ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول لاميكيتال**
- كيفية تناول لاميكيتال**
- الآثار الجانبية المحتملة**
- كيفية تخزين لاميكيتال**
- محتويات العبوة ومعلومات أخرى**

١ ما هو لاميكيتال وما هي دواعي استعماله

ينتمي لاميكيتال إلى مجموعة من الأدوية تسمى مضادات الصرع. يستخدم لعلاج حالتين مرضيتين - **الصرع** و**الاضطراب ثنائي القطب**.

يعالج لاميكيتال الصرع عن طريق حصر الإشارات في الدماغ التي تؤدي إلى نوبات الصرع (النوبات).

- للبالين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٣ عامًا وما فوق، يمكن استخدام لاميكيتال بمفرده أو مع أدوية أخرى، لعلاج النوبات التي تحدث مع حالة تسمى متلازمة لينوكس - غاستو.

- للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و ١٢ سنة، يمكن استخدام لاميكيتال مع أدوية أخرى، لعلاج هذه الحالات. ويمكن استخدامه بمفرده لعلاج نوع من الصرع يسمى نوبات الغيبة التوحدية.

يعالج لاميكيتال أيضًا الاضطراب ثنائي القطب

بعض الأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب (يطلق عليه أحيانًا **الكتئاب الهوسي**) من تقلبات مزاجية شديدة، مع فترات من الهوس (الإثارة أو النشوة) بالتناوب مع فترات من الاكتئاب (حزن عميق أو يأس).

للبالين الذين تبلغ أعمارهم ١٨ عامًا وما فوق، يمكن استخدام لاميكيتال بمفرده أو مع أدوية أخرى، لمنع فترات الاكتئاب التي تحدث في حالات الاضطراب ثنائي القطب. ليس من المعروف حتى الآن كيف يعمل لاميكيتال في الدماغ ليعطي هذا المنعول.

٢ ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول لاميكيتال

لا تتناول لاميكيتال:

- إذا كنت تعاني من **الحساسية** (فرط الحساسية) من لاموتريجين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المدرجة في القسم ٦).

إذا كان هذا ينطبق عليك:

❖ **أخير طبيبك،** ولا تتناول لاميكيتال.

التحذيرات والاحتياطات

يجب توخي الحذر الشديد مع **لاميكيتال**.

تحدث مع طبيبك أو الصيدلي **قبل تناول لاميكيتال**:

- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى
- إذا أصبت سابقًا بطفح جلدي بعد تناول لاموتريجين أو أدوية أخرى لعلاج الاضطراب ثنائي القطب أو الصرع
- إذا كنت تعاني من طفح جلدي أو حرقى **الشمس** بعد تناول **لاموتريجين** و**التعرض لأشعة الشمس** أو **الضوء الاصطناعي (مثل التفرقة الشمسية)**. سيتوقف طبيبك من علاجك وقد ينصحك بتجنب ضوء الشمس أو حماية نفسك من أشعة الشمس (مثل: استخدام واقي من الشمس و / أو ارتداء ملابس واقية)
- إذا أصبت سابقًا بالتهاب السحايا بعد تناول **لاموتريجين (أقر** وصف هذه الأعراض في القسم ٤ من هذه النشرة: ***الآثار الجانبية الشائعة***)
- إذا كنت تتناول بالفعل دواء يحتوي على **لاموتريجين**.
- إذا كنت تعاني من حالة تسمى **متلازمة بروغاد**، أو **مشاكل قلبية أخرى**. متلازمة بروغاد هي مرض وراثي ينتج عنه نشاط كهربائي غير طبيعي داخل القلب. يمكن أن يتسبب لاموتريجين في حدوث تشوهات في تخطيط القلب، والتي قد تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب (ضربات القلب الغير طبيعية).

إذا كان أي مما سبق ينطبق عليك:

❖ **أخير طبيبك،** فيمكن أن يقرر نادر ولكنه خطير للغاية ليجاز المناعة لدى المرضى الذين يتناولون لاموتريجين.

معلومات هامة حول ردود الفعل التحسسية التي قد تهدد الحياة

يمكن أن يحدث لدى بعض الأشخاص الذين يتناولون لاميكيتال من تفاعلات جلدية من المحتمل أن تهدد الحياة، والتي قد تتطور إلى مشاكل أكثر خطورة إذا لم يتم علاجهم. يمكن أن تشمل هذه متلازمة ستيفنز جونسون (SJS)، وتشنج البشرة الدسمى (TEN) وتفاعل دوائي مع فرط الحساسية وأعراض جهازية (DRESS). تحتاج إلى معرفة الأعراض لنتنبه إليها أثناء تناول لاميكيتال.

أقرأ وصف هذه الأعراض في القسم ٤ من هذه النشرة تحت عنوان **ردود الفعل التحسسية التي قد تهدد الحياة**: *احصل على مساعدة الطبيب على الفور.*

كثرة البيلة الصفراوية (HLH)

تستخدم الأدوية المضادة للصرع لعلاج العديد من الحالات، تشمل الصرع والاضطراب ثنائي القطب. يمكن للأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب أحيانًا التفكير في إيذاء أنفسهم أو الإقدام على الانتحار. إذا كنت تعاني من اضطراب ثنائي القطب، فمن المرجح أن تفكر على هذا النحو:

- عندما تبدأ العلاج لأول مرة.
- إذا كان لديك في السابق أفكار حول إيذاء نفسك أو الانتحار.
- إذا كان صررك أقل من ٢٥ عامًا.

إذا كنت لديك أفكار أو تجارب مسببة للاكتئاب، أو إذا لاحظت أنك في حالة أسوأ أو ظهرت عليك أعراض جديدة أثناء تناول لاميكيتال:
❖ **بزيارة الطبيب المعالج في أسرع وقت ممكن،** أو توجه إلى أقرب مستشفى **تطلب المساعدة**.
❖ **تجنب** أن تكون أحد أفراد الأسرة أو مقدم الرعاية أو صديق مقرب أنك يمكن أن تصاب **بالكتئاب أو يكون لديك تغيرات كبيرة في الحالة المزاجية، وأطلب منهم قراءة هذه النشرة**. **قد تتطلب منهم أن يخبروك** ما إذا كانوا قلقين بشأن حالة **الاكتئاب** لديك أو أي **تغيرات أخرى في سلوكك**.
❖ **لا تترك تناول لاميكيتال للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا** لعلاج **الاضطراب ثنائي القطب**. يمكن للأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب أحيانًا التفكير في إيذاء أنفسهم أو الإقدام على الانتحار. إذا كنت تعاني من اضطراب ثنائي القطب، فمن المرجح أن تفكر على هذا النحو:

- عندما تبدأ العلاج لأول مرة.
- إذا كان لديك في السابق أفكار حول إيذاء نفسك أو الانتحار.

إذا كنت لديك أفكار أو تجارب مسببة للاكتئاب، أو إذا لاحظت أنك في حالة أسوأ أو ظهرت عليك أعراض جديدة أثناء تناول لاميكيتال:
❖ **بزيارة الطبيب المعالج في أسرع وقت ممكن،** أو توجه إلى أقرب مستشفى **تطلب المساعدة**.
❖ **تجنب** أن تكون أحد أفراد الأسرة أو مقدم الرعاية أو صديق مقرب أنك يمكن أن تصاب **بالكتئاب أو يكون لديك تغيرات كبيرة في الحالة المزاجية، وأطلب منهم قراءة هذه النشرة**. **قد تتطلب منهم أن يخبروك** ما إذا كانوا قلقين بشأن حالة **الاكتئاب** لديك أو أي **تغيرات أخرى في سلوكك**.
❖ **لا تترك تناول لاميكيتال للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا** لعلاج **الاضطراب ثنائي القطب**. يمكن للأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب أحيانًا التفكير في إيذاء أنفسهم أو الإقدام على الانتحار. إذا كنت تعاني من اضطراب ثنائي القطب، فمن المرجح أن تفكر على هذا النحو:

❖ لم زيارة الطبيب المعالج في أسرع وقت ممكن.

لا يجب إعطاء لاميكيتال للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا لعلاج **الاضطراب ثنائي القطب**. يمكن للأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب أحيانًا التفكير في إيذاء أنفسهم أو الإقدام على الانتحار. إذا كنت تعاني من اضطراب ثنائي القطب، فمن المرجح أن تفكر على هذا النحو:

- عندما تبدأ العلاج لأول مرة.
- إذا كان لديك في السابق أفكار حول إيذاء نفسك أو الانتحار.

أخير طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية العشبية أو الأدوية الأخرى التي تم شراؤها بدون وصفة طبية.

يحتاج الطبيب المعالج إلى معرفة ما إذا كنت تتناول أدوية أخرى لعلاج الصرع أو مشاكل الصحة العقلية.

هذا التاكيد من تناول الجرعة الصحيحة من لاميكيتال. تشمل هذه الأدوية:

- أوكسكاربازابين، فلينامت، جابانتين، ليفيتيراسيتام، بريجابالين، توبراميت أو زونيساميد، وتستخدم لعلاج الصرع
- الليثيوم، أوتازابين أو أريبيزولام، وتستخدم لعلاج مشاكل الصحة العقلية
- بوبروبيون، الذي يستخدم لعلاج مشاكل الصحة العقلية أو لعلاج عن التدخين
- براسيتامول، يستخدم لعلاج الآلام والحمى
- أخير طبيبك** إذا كنت تتناول أي من هذه الأدوية.
- تتفاعل بعض الأدوية مع لاميكيتال أو تزيد من احتمالية حدوث آثار جانبية لدى الأشخاص. وتشمل:
- فالبروات، يستخدم لعلاج الصرع ومشاكل الصحة العقلية
- كاربامازيبين، يستخدم لعلاج الصرع ومشاكل الصحة العقلية
- فينيتوين، بريميون أو فينوباربيتون، وتستخدم لعلاج الصرع
- ريسبريريون، يستخدم لعلاج مشاكل الصحة العقلية
- ريفايسيمين، وهو مضاد حيوي
- الأدوية المستخدمة لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) (مزيج من لوبينافير وريتونايفير أو أتازانافير وريتونايفير)
- موانع الحمل الهرمونية، مثل حبوب منع الحمل (انظر في الأسفل).

❖ **أخير طبيبك** إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأدوية أو إذا بدأت أو توقفت عن تناول أي منها.

يمكن أن تؤثر موانع الحمل الهرمونية (مثل حبوب منع الحمل) على طريقة عمل لاميكيتال

قد يوصي الطبيب المعالج باستخدام نوع معين من موانع الحمل الهرمونية أو طريقة أخرى لمنع الحمل، مما يقلل من خطر الحمل غير المرغوب فيه. إذا كنت تستخدمين وسيلة منع حمل هرمونية مثل حبل مريم مع الحمل، فقد يأخذ الطبيب المعالج عينات من دمك للتحقق من مستوى لاميكيتال. إذا كنت تستخدمين وسيلة منع حمل هرمونية أو إذا كنت تخططين للبدء في استخدامها:

❖ تحدثي مع طبيبك، الذي سيتناقش معك الوسائل المناسبة لمنع الحمل.

يمكن أن يؤثر لاميكيتال أيضًا على طريقة عمل موانع الحمل الهرمونية، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تجعلها أقل فعالية. إذا كنت تستخدمين وسائل منع الحمل الهرمونية ولاحظت أي تغيرات في نمط الدورة الشهرية، مثل تأخر مفاجئ أو نزول دم بين فترات الدورة الشهرية.

❖ **أخبري طبيبك.** يمكن أن تكون هذه علامات على أن لاميكيتال يؤثر على طريقة عمل موانع الحمل.

الحمل والرضاعة الطبيعية

❖ **إذا كنت حاملاً، أو تعتقدن أنك قد تكونين حامل أو تخططين لإنجاب طفل، اسألني طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة الطبية قبل تناول هذا الدواء.**

يجب عدم التوقف عن العلاج بدون مناقشة ذلك مع طبيبك. لأنه مهم بشكل خاص إذا كنت تعالين من الصرع.

❖ قد يعوق الحمل من فعالية لاميكيتال، لذلك قد تحتاجين إلى فحوصات دم ويمكن أن يتم تعديل جرعتك من لاميكيتال.

❖ قد يكون هناك خطر ضئيل مزاي لإصابة بعبور خلية، تشمل الشفة المشقوق، إذا تم تناول لاميكيتال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

❖ قد ينصحك طبيبك بتناول المزيد من حمض الفوليك إذا كنت تخططين للحمل وأثناء الحمل.

❖ **إذا كنت تعومين بالرضاعة الطبيعية أو تخططين لذلك، اسألني طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة الطبية قبل تناول هذا الدواء.** حيث تمر المادة الفعالة من لاميكيتال إلى حليب الثدي ويمكن أن تؤثر على طفلك. سيتناقش طبيبك مخاطر وفوائد الرضاعة الطبيعية أثناء تناو لك لاميكيتال، وسيقرر بفحص طفلك من وقت لآخر، سواء حدث نعاس أو طفح جلدي أو ضعف في زيادة الوزن، إذا قررت القيام بالرضاعة الطبيعية. أخبرني طبيبك إذا لاحظت أن من هذه الأعراض على طفلك.

القيادة واستعمال الآلات

❖ يمكن أن يسبب لاميكيتال الدوخة وازدواج الرؤية.

❖ لا يجوز قيادة السيارة أو استخدام الآلات إلا إذا كنت متأكدًا من عدم تأثرك بالدواء.

❖ إذا كنت مصابًا بالصرع، فشدّث إلى طبيبك بشأن القيادة واستخدام الآلات.

معلومات هامة عن بعض مكونات لاميكيتال ٢٥ ملجم، ٥٠ ملجم، ١٠٠ ملجم أقراص

تحتوي أقراص لاميكيتال على كميات صغيرة من السكر يسمى اللاكتوز. إذا أخبرك طبيبك أن لديك عدم تحمل تجاه بعض السكريات، فتصل طبيبك قبل تناول هذا المنتج الطبي.

يحتوي لاميكيتال ليكويتاب ولاميكيتال أقراص على أقل من ١ ملي مول من الصوديوم (٢٣ ملجم) لكل قرص، وهذا يعني بشكل أساسي أنها "خالية من الصوديوم".

٣ كيفية تناول لاميكيتال

احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تمامًا كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي. يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

ما هي الجرعة التي تحتاج إلى تناولها من لاميكيتال

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحديد الجرعة المناسبة لك من لاميكيتال. تعتمد الجرعة التي تتناولها على:

- صرع
- إذا كنت تتناول لاميكيتال مع أدوية أخرى
- إذا كنت تعاني من أي مشاكل في الكلى أو الكبد.

سيصف لك طبيبك جرعة منخفضة للبدء في العلاج، مع زيادة الجرعة تدريجيًا على مدى بضعة أسابيع حتى تصل إلى الجرعة المناسبة لك (تسمى الجرعة الفعالة). **لا يجب أبدًا تناول لاميكيتال بجرعة أكبر مما يخبرك طبيبك به.**

تتراوح الجرعة الفعالة المعتادة من لاميكيتال للبالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٣ عامًا و أكثر بين ١٠٠ ملجم و ٤٠٠ ملجم يوميًا.

بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٢ إلى ١٢ عامًا، تعدد الجرعة الفعالة على وزن الجسم -عادة ما تكون بين ١ ملجم و ١٥ ملجم لكل كيلوجرام من وزن الطفل، بعد أقصى جرعة مداومة ٢٠٠ ملجم يوميًا.

لا ينصح باستخدام لاميكيتال للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.

كيف تتناول جرعتك من لاميكيتال

تناول جرعتك من لاميكيتال بمعدل مرة أو مرتين يوميًا، كما ينصح طبيبك. ويمكن أن تؤخذ مع الطعام أو بدونه.

- يجب تناول الجرعة الكاملة دائمًا** التي وصفها طبيبك. لا يجب أن تتناول جزء من القرص من قطع.

يمكن أن ينصحك طبيبك أحيانًا بما يجب أن تتوقف عن تناول أدوية أخرى، اعتمادًا على حالتك التي تعالج منها وكيفية استجابتك للعلاج.

لاميكيتال ٢٥ ملجم، ٥٠ ملجم، ١٠٠ ملجم أقراص

يجب بلع القرص بأكمله، لا تكسر أو تمضغ أو تحطم القرص.

لاميكيتال ٥ ملجم، ٥٠ ملجم، ١٠٠ ملجم، ٢٠٠ ملجم ليكويتاب

يمكن ابتلاع أقراص لاميكيتال ليكويتاب إما كاملة مع الفيل من الماء، أو مضغها أو خلطها بالماء لتحسين ذواء سائل. لا يجب أن تتناول جزء من السائل فقط.

لمضغ القرص:

❖ تحتاج إلى شرب الفيل من الماء في نفس الوقت لمساعدة القرص على الذوبان في الفم. ثم اشرب المزيد من الماء للتأكد من ابتلاع كل الدواء.

لتحسين ذواء سائل:

- ضع القرص في كوب به ماء كافٍ على الأقل لغطية القرص بالكامل.
- حرك القرص برفيف أو انتظر حتى يذوب القرص بالكامل.
- اشرب كل السائل.
- أضف الفيل من الماء إلى الكوب والشربة، للتأكد من عدم ترك أي دواء في الكوب.

❖ إذا تناولت لاميكيتال أكثر مما يجب

❖ **اتصل بالطبيب المعالج أو أقرب قسم طوارئ في المستشفى على الفور.** إذا أمكن، أظهر لهم عبوة لاميكيتال.

❖ إذا تناولت لاميكيتال كمية كبيرة، **فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بآثار جانبية خطيرة، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.**

❖ قد يعاني الشخص الذي تناول كمية كبيرة من لاميكيتال إذا من الأعراض التالية:

- سرعة حركات العين التي لا يمكن السيطرة عليها (رأفة)
- فقدان التسيق والترويح، مما يؤثر على التوازن (ترنح)
- تغيرات في ضربات القلب (تم التكثف عندما تبدأ في تخطيط القلب)
- فقدان الوعي، نوبات (تشنجات) أو غيبوبة.

❖ إذا نسيبت تناول جرعة واحدة من لاميكيتال

❖ **لا تتناول أقراص إضافية لتعويض الجرعة الفائتة، فقط خذ جرعتك التالية في الوقت المعتاد.**

في حالة نسيان تناول جرعات متعددة من لاميكيتال

❖ **اسأل طبيبك للحصول على المشورة الطبية حول كيفية البدء في تناولها مرة أخرى.** من المهم أن تفعل هذا.

لا تتوقف عن تناول لاميكيتال بدون نصيحة طبية

يجب أن يؤخذ لاميكيتال لمدة التي أوصى بها طبيبك. لا تتوقف عن تناول الدواء إلا إذا نصحك طبيبك بذلك.

التوقف عن تناول لاميكيتال، من المهم أن يتم **تقليل الجرعة تدريجيًا**، على مدار أسبوعين تقريبًا. إذا توقفت فجأة عن تناول لاميكيتال، فقد يعود الصرع لديك أو تتفاقم الحالة.

❖ **إذا كنت تتناول لاميكيتال لعلاج الاضطراب ثنائي القطب**
يمكن أن يستغرق لاميكيتال بعض الوقت للعمل، لذلك من غير المحتمل أن تشعر بتحسن على الفور. إذا توقفت عن تناول لاميكيتال، فلن تحتاج إلى تخفيض جرعتك تدريجيًا. لكن لا يزال ينبغي عليك التحدث مع طبيبك أولاً، إذا كنت تريد التوقف عن تناول لاميكيتال.

٤ الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية، ولكن لا تحدث للجميع.

ردود الفعل التحسسية التي قد تهدد الحياة:احصل على مساعدة الطبيب على الفور

بعضًا من الأشخاص الذين يتناولون لاميكيتال من تفاعلات الحساسية أو تفاعلات جلدية من المحتمل أن تهدد الحياة، والتي قد تتطور إلى مشاكل أكثر خطورة إذا لم يتم علاجها.

من المرجح أن تحدث هذه الأعراض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العلاج باستخدام لاميكيتال، خاصة إذا كانت الجرعة عالية جدًا في البداية، أو إذا تمت زيادة الجرعة بسرعة كبيرة، أو إذا تم تناول لاميكيتال مع دواء آخر يسمى فالبريرات. تكون بعض الأعراض أكثر شيوعًا عند الأطفال، لذلك يجب على الآباء توخي الحذر الشديد عند مراقبتهم.

تشمل أعراض هذه التفاعلات:

- طفح جلدي أو احمرار،** والذي قد يتطور إلى تفاعلات جلدية مهددة للحياة وتشمل الطفح الجلدي المنتشر مع ظهور بثور وتقرحات شديدة، خاصة التي تحدث حول الفم والأفب والمينين والأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنز جونسون)، تقرش الجلد الشديد (أكثر من ٣٠٪ من سطح الجسم - تقرح البشرة الدسمى) أو الطفح الجلدي الممتد مع إصابة الكبد والمعدة وأعضاء الجسم الأخرى (تفاعل دوائي مع فرط الحساسية وأعراض جهازية التي تعرف أحيانًا باسم متلازمة فرط الحساسية DRESS)
- تقرحات في الفم أو الحلق أو الأنف أو الأعضاء التناسلية**
- التهاب الفم أو احمرار أو تورم اللعنين (التهاب اللثام)**
- ارتفاع في درجة الحرارة (حمى)** أو أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، أو الحمول
- انتفاخ حول وجهك أو تورم الغدد في رفتك أو الإبط أو الفخذ**
- نزيف أو كدمات غير متوقعة،** أو تحول الإصبع إلى اللون الأزرق

- التهاب الحلق أو التهابات** (مثل نزلات البرد) أكثر من المعتاد
- زيادة مستويات إيزيمات الكبد التي تظهر في فحوصات الدم
- زيادة في نوع من خلايا الدم البيضاء (الحمضات)
- تضخم الغدد الليمفاوية
- إصابة أعضاء الجسم تشمل الكبد والكلى.

في كثير من الحالات، ستكون هذه الأعراض علامات على آثار جانبية أقل خطورة **ولكن يجب أن تترك أنها من المحتمل أن تكون مهددة للحياة ويمكن أن تتطور إلى مشاكل أكثر خطورة**، مثل فشل الأعضاء، إذا لم يتم علاجها. إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض:

❖ **اتصل بالطبيب المعالج فورًا.** يمكن أن يقرر طبيبك إجراء فحوصات على الكبد أو الكلى أو الدم، ويمكن أن يخبرك بالتوقف عن تناول لاميكيتال. في حالة إصابتك بمتلازمة ستيفنز جونسون أو تنخر البشرة الدسمى، سيخبرك طبيبك أنه لا يجب عليك استخدام لاموتريجين مرة أخرى.

كثرة البيلة الصفراوية (HLH) (انظر القسم ٢: ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول لاميكيتال)

قد تصيب **أكثر من شخص واحد من كل ١٠ أشخاص:**

- صداع الرأس
- الطفح الجلدي.

الآثار الجانبية الشائعة

قد تصيب **حتى شخص واحد من كل ١٠ أشخاص:**

- العنائية أو الانتفاخ
- الشعور بالغثاس أو الخمول
- الشعور بالدوار
- الاهتزاز أو الرعاش
- صعوبة النوم (الأرق)
- الشعور بالهباج

- إسهال
- جفاف الفم

- الغثيان أو القيء
- الشعور بالغثب

الم، في طهرك أو مفاصلك، أو في أي مكان آخر.

الآثار الجانبية غير الشائعة

قد تصيب **شخص واحد من كل ١٠٠ شخص:**

- فقدان التسيق والترويح (ترنح)
- ازدواج الرؤية أو عدم وضوح الرؤية
- تساقط الشعر غير الطبيعي أو ترققه (الثعلبية)
- طفح جلدي أو حرق الشمس بعد التعرض لأشعة الشمس أو الضوء الاصطناعي (الحساسية للضوء)

قد تصيب **شخص واحد من كل ١٠٠٠ شخص:**

- تفاعل جلدي مهدد للحياة (متلازمة ستيفنز جونسون): (انظر أيضًا المعلومات الواردة في بداية القسم ٤)
- مجموعة من الأعراض معًا تشمل: الحمى والغثيان والقيء والصداع وتيبس الرقبة والحساسية الشديدة للضوء الساطع. قد يحدث هذا بسبب التهاب الأغشية التي تغطي الدماغ والجلل الشوكي (التهاب السحايا). عادة ما تختفي هذه الأعراض بمجرد توقف العلاج، ولكن إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، **اتصل بطبيبك**.
- سرعة حركات العين، التي لا يمكن السيطرة عليها (رأفة)
- حكة بالعين مع إفرازات وفورور في الجفون (التهاب المتحممة).

الآثار الجانبية النادرة جدًا

قد تصيب **حتى شخص واحد من كل ١٠٠٠٠ شخص:**

تفاعلات جلدية مهدد للحياة (تقرح البشرة الدسمى): (انظر أيضًا المعلومات الواردة في بداية القسم ٤)

تفاعل دوائي مع فرط الحساسية وأعراض جهازية (DRESS): (انظر أيضًا المعلومات الواردة في بداية القسم ٤)

ارتفاع في درجة الحرارة (حمى): (انظر أيضًا المعلومات الواردة في بداية القسم ٤)

تورم حول الوجه (وذمة) أو تورم الغدد في الرقبة أو الإبط أو الفخذ (تضخم الغدد اللمفية): (انظر أيضًا المعلومات الواردة في بداية القسم ٤)

التغيرات في وظائف الكبد، والتي ستظهر في اختبارات الدم أو فشل الكبد: (انظر أيضًا المعلومات الواردة في بداية القسم ٤)

اضطراب خطير في فخذ الفم، والذي يمكن أن يسبب نزيفًا أو كدمات غير متوقعة (التقرح المنتشر داخل الأوعية): (انظر أيضًا المعلومات الواردة في بداية القسم ٤)

كثرة البيلة الصفراوية (HLH) (انظر القسم ٢: ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول لاميكيتال)

التغيرات التي قد تظهر في اختبارات الدم تشمل انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء، قلة الخلايا المحيية)، قلة عدد الصفائح الدموية (قلة الصفائح الدموية)، انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات الشاملة) واضطراب في نخاع العظام يسمى فقر الدم اللتسجمي

- الهولمة (رؤية أو سماع أشياء ليست موجودة بالفعل)
- ارتباك
- الشعور ب"التأرجح" أو عدم الاتزان عند الحركة
- حركات الجسم التي لا يمكن السيطرة عليها (التشنجات اللاإرادية)، تقلصت العضلات التي لا يمكن السيطرة عليها والتي تؤثر على العينين والرأس والذراع (كتع ركعسي) أو غيرها من حركات الجسم غير الطبيعية
- مثل الارتعاش أو الاهتزاز أو التشنج

- تحدث النوبات بشكل أكثر من المعتاد لدى الأشخاص الذين يعانون من الصرع بالفعل
- في الأشخاص المصابين بالاضطراب ثنائي القطب بمرض باركنسون؛ تتفاقم الأعراض.
- رد فعل يبيء بمرض الشلل (قد تشمل الأعراض: آلام الظهر أو المفاصل في اليدين أو القدمين)
- آثار جانبية أخرى**

ظهرت آثار جانبية أخرى لدى عدد قليل من الأشخاص ولكن تكرارها النقيض غير معروف:

- كانت هناك تقارير عن اضطرابات عظام، تشمل قلة العظام وهشاشة العظام (ترقق العظام) والكسور.
- بعضًاشة العظام أو تتناول الستيرويد.
- التهاب الكلى (التهاب الكلية النسيبي الخألي)، أو التهاب كل من الكلى والعين (التهاب الكلية النسيبي الخلالي ومتلازمة التهاب العينية).
- الكوابيس.

ضعف المناعة: بسبب انخفاض مستويات الأجسام المضادة التي تسمى الجلوبولين المناعي في الدم، والتي تساعد في الحماية من العدوى.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا تعرضت لأي آثار جانبية. ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير واردة في هذه النشرة.

من أجل تمثيل شكوي المرضى الدواء أو أعراض جانبية مرتبطه باستخدام دواء شركة GSK برجاء التواصل عبر **gulf.safety@gsk.com**

في خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

٥ كيفية تخزين لاميكيتال

يحفظ هذا الدواء بعيدًا عن نظر ومتناول أيدي الأطفال.

لا يجوز استعمال هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الشرط أو العبوة الترتونية أو الزجاجة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.