

قد يحدث انخفاض لمستويات الصوديوم أثناء العلاج ببريستيك. قد يكون انخفاض مستويات الصوديوم في دمك خطيرًا وقد يسبب الوفاة. قد تتضمن علامات وأعراض انخفاض مستويات الصوديوم في دمك التالي:	<ul style="list-style-type: none"> • الصداع • صعوبة التركيز • تغيرات في الذاكرة • التشنج • الشعور بالضعف وعدم الاستقرار في قدميك وهو ما قد يؤدي إلى السقوط
في الحالات الشديدة أو الأكثر فجأة، تتضمن العلامات والأعراض ما يلي:	<ul style="list-style-type: none"> • الهلوسة (رؤية أو سماع أشياء غير حقيقية) • الإغماء • النوبات • الغيبوبة
مشكلات بالرئة. أصيب بعض الأشخاص الذين تناولوا دواء فينلافاكسين، وهو نفس نوع الدواء الموجود في بريستيك، بمشكلات في الرئة. تتضمن أعراض مشكلات الرئة صعوبة التنفس، أو السعال، أو ضيق الصدر. أبلغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا أصبت بأي من هذه الأعراض.	
تتضمن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لبريستيك:	<ul style="list-style-type: none"> • الغثيان • الدوار • مشكلات في النوم • العرق • الإمساك • الشعور بالغثاس • انخفاض الشهية • القلق • مشكلات بالوظيفة الجنسية
هذه ليست كل الآثار الجانبية المحتملة لبريستيك.	
اتصل بطبيبك لتلقي المشورة الطبية حول الآثار الجانبية.	
كيف ينبغي علي تخزين بريستيك؟	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتخزين بريستيك في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية • احفظ بريستيك وجميع الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.
معلومات عامة حول الاستخدام الآمن والفعال لبريستيك	
في بعض الأحيان توصف الأدوية لأغراض غير تلك الواردة بدليل الدواء. لا تتناول بريستيك لحالة لم يوصف لها. لا تعط بريستيك لأشخاص آخرين، حتى إذا كانوا يعانون من نفس الأعراض التي تعاني منها، فقد يسبب لهم ضررًا. يمكنك أن تطلب من الصيدلي الذي تتعامل معه أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك تزويدك بالمعلومات الموجهة لمختصصي الرعاية الصحية حول بريستيك.	
ما هي مكونات بريستيك؟	
المكون الفعال: ديسفينلافاكسين	
المكونات غير الفعالة:	<ul style="list-style-type: none"> • أقراص الـ 50 ملجم: هيبروميلوز، وسليولوز بلوري مكروي، وتلك، وستيرات المغنيسيوم، والغشاء الرقيق الذي يتكون من كحول البولي فينيل، وجليكول البولي إيثيلين، وتلك، وثنائي أكسيد التيتانيوم، وأكسيد الحديد. • لأقراص الـ 100 ملجم: هيبروميلوز وسليولوز بلوري مكروي وتلك وستيرات المغنيسيوم وغشاء رقيق مكون من كحول البولي فينيل وجليكول البولي إيثيلين وتلك وثنائي أكسيد التيتانيوم وأكسيدات الحديد و FD&C الأصفر رقم 6.
مالك تصريح التسويق:	
Wyeth Pharmaceuticals Inc., Philadelphia, USA	
الجهة المصنعة:	
Pfizer Ireland Pharmaceuticals , little Connell , enew bridge CO, Kildare, Ireland	
تمت تعبئته وتوزيعه بواسطة:	
Pfizer Pharmaceutical LLC, 689 Road 1.9 LCC Puerto Rico Vega Baja	
تمت المراجعة الأخيرة لهذه النشرة في فبراير/شباط 2018.	
Distributed by	
 Wyeth Pharmaceuticals Inc	
A subsidiary of Pfizer Inc, Philadelphia, PA 19101	
إن هذا دواء	
- الدواء منتج يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافًا للتعليمات يعرضك للخطر.	
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي قام بصرف الدواء.	
- الطبيب والصيدلي خبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها. لا تقطع مدة العلاج الموصوفة لك من تلقاء نفسك.	
- لا تكرر صرف نفس الوصفة الطبية دون استشارة طبيبك. احتفظ بجميع الأدوية بعيدًا عن متناول ومرأى الأطفال	
مجلس وزراء الصحة العرب	
اتحاد الصيدالة العرب	

دليل استخدام الدواء

بريستيك®

(ديسفينلافاكسين)

أقرص ممتدة المفعول

ما هي المعلومات الأكثر أهمية التي ينبغي أن أعرفها عن بريستيك؟

قد يسبب بريستيك آثاراً جانبية خطيرة، بما في ذلك:

• زيادة خطر الأفكار أو التصرفات الانتحارية لدى بعض الأطفال والشباب خلال الأشهر القليلة الأولى من العلاج. بريستيك غير مصمم للاستخدام مع الأطفال.

• بعد الاكتئاب أو الأمراض العقلية الخطيرة الأخرى أهم أسباب الأفكار أو التصرفات الانتحارية.

كيف يمكنني الانتباه للأفكار والتصرفات الانتحارية ومحاولة منع حدوثها؟

○ انتبه جيداً لأي تغيرات، خاصة التغيرات المفاجئة، التي تطرأ على الحالة المزاجية، أو السلوكيات، أو الأفكار، أو المشاعر. ويكون ذلك مهماً للغاية عند بدء العلاج بدواء مضاد للاكتئاب أو عند تغيير الجرعة.

○ اتصل بمقدم الرعاية الصحية على الفور للإبلاغ عن التغيرات الجديدة أو المفاجئة في الحالة المزاجية، أو السلوكيات، أو الأفكار، أو المشاعر.

○ التزم بحضور جميع زيارات المتابعة مع مقدم الرعاية الصحية في المواعيد المقررة لها. واتصل بمقدم الرعاية الصحية بين الزيارات حسب الحاجة، خاصة إذا كانت لديك مخاوف بشأن الأعراض.

اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا عانيت من أي من الأعراض التالية، خاصة إذا كانت هذه الأعراض حديثة الظهور أو متفاضة أو مثيرة للقلق بالنسبة لك:

○ الأفكار المتعلقة بالانتحار أو الموت

○ صعوبة النوم (الأرق)

○ محاولات الانتحار

○ سرعة الانفعال سواء كان حديث الظهور أو متقافماً

○ الاكتئاب سواء كان حديث الظهور أو متقافماً

○ التصرف بعذوبة، أو بغضب، أو بعنف

○ القلق سواء كان حديث الظهور أو متقافماً

○ التصرف وفقاً لدوافع خطيرة

○ الشعور بالتهيج أو التملل الشديد

○ الزيادة المفردة في النشاط والكلام (الهوس)

○ نوبات الهلع

○ التغيرات الأخرى غير المعتادة في السلوك أو الحالة المزاجية

ما هو بريستيك؟

بريستيك هو دواء يُصرف بوصفة طبية يُستخدم في علاج البالغين المصابين بنوع معين من الاكتئاب يُسمى الاضطراب الاكتئابي الكبير (MDD). ينتمي بريستيك لفئة من الأدوية تُدعى مثبطات استرداد السيروتونين والنورإبينفرين (SNRI).

لا تتناول بريستيك إذا كنت:

• تعاني من الحساسية تجاه سكسينات ديسفينلافاكسين أو هيدروكلوريد فينلافاكسين أو أي من مكونات بريستيك. انظر الجزء الأخير من دليل استخدام الدواء هذا للاطلاع على قائمة كاملة بجميع مكونات بريستيك.

• تتناول أحد مثبطات أكسيداز أحادي الأمين (MAOI)

• قد توقفت عن تناول أحد مثبطات أكسيداز أحادي الأمين خلال الـ 14 يوماً الأخيرة، فإسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً من تناولك لأحد مثبطات أكسيداز أحادي الأمين أم لا.

• تخضع للعلاج بالمضاد الحيوي لينيزوليدين أو مركب أزرق الميثيلين الذي يؤخذ عن طريق الوريد

لا تبدأ في تناول أحد مثبطات أكسيداز أحادي الأمين لمدة 7 أيام على الأقل بعد توقفك عن العلاج ببريستيك.

أطلع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على جميع الحالات الطبية التي تعاني منها، قبل تناول بريستيك، بما في ذلك إذا:

• كنت تعاني من ضغط الدم المرتفع

• كنت تعاني من مشكلات قلبية

• كنت تعاني من مشكلات وعائية دماغية أو أصبت بسكتة دماغية

• كنت تعاني، أو سبق أن عانيت، من مشكلات النزيف

• كنت تعاني من اضطراب ثنائي القطب أو الهوس أو الهوس الخفيف أو لديك تاريخ عائلي من الإصابة بهذه الحالات

• كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول أو ثلاثيات الجليسريد

• كنت تعاني، أو سبق أن عانيت، من الإصابة بالاكتئاب أو بأفكار أو سلوكيات انتحارية

• كنت تعاني من مشكلات بالكلية أو الكبد

• كنت تعاني، أو سبق أن عانيت، من الإصابة بنوبات أو تشنجات

• كنت تعاني من انخفاض مستويات الصوديوم في دمك

• كنت حاملاً أو تخططين للحمل. تحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن الخطر على جنينك إذا كنت تتناولين بريستيك أثناء حملك.

○ أخبري مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا أصبحت حاملاً أو تخطنين بأنك حامل أثناء العلاج ببريستيك.

○ إذا أصبحت حاملاً أثناء العلاج ببريستيك، فتحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن التسجيل لدى سجل الحمل القومي لمضادات الاكتئاب.

• كنتِ ترضعين رضاعة طبيعية أو تخططين لذلك. يمكن أن يمر بريستيك إلى لبن الثدي الخاص بك. تحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن أفضل الطرق لإطعام طفلك أثناء العلاج ببريستيك.

• أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بجميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية والفيتامينات والمكملات العشبية، سواء التي تُصرف بوصفة طبية أو التي تُصرف بدون وصفة طبية.

• قد يؤثر بريستيك وغيره من الأدوية على بعضهما البعض مما يؤدي إلى حدوث آثار جانبية خطيرة محتملة. قد يؤثر بريستيك على طريقة عمل الأدوية الأخرى كما قد تؤثر الأدوية الأخرى على طريقة عمل بريستيك.

أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك خاصة إذا كنت تتناول:

• مثبطات أكسيداز أحادي الأمين أخرى

• أدوية لعلاج الصداع النصفي تُعرف باسم التريبتانات

• مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات

• فينتانيل

• ليتيوم

• ترامادول

• تريبتوفان

• بوسبيرون

• أمفيتامينات

• نيتة سانت جونز

• أدوية أخرى تحتوي على ديسفينلافاكسين أو فينلافاكسين

• الأدوية التي قد تؤثر على تجلط الدم مثل الأسبرين، أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAID)، أو وارفارين

• الأدوية المستخدمة لعلاج اضطرابات الحالة المزاجية، أو القلق، أو الاضطرابات الذهانية، أو اضطرابات التفكير، بما في ذلك مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRI) أو مثبطات استرداد السيروتونين والنورإبينفرين (SNRI)

إسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا لم تكن واثقاً من تناولك لأي من هذه الأدوية أم لا. يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إخبارك إذا كان من الآمن تناول بريستيك مع أدوية الأخرى أم لا. لا تبدأ في تناول أي أدوية أخرى أو توقفها أثناء العلاج ببريستيك دون التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أولاً. قد يتسبب إيقافك المفاجئ لبريستيك في إصابتك بآثار جانبية خطيرة. انظر قسم "ما هي الآثار الجانبية المحتملة لبريستيك؟"

تعرف على الأدوية التي تتناولها. واحفظ بقائمة تضمها لثريها لمقدمي الرعاية الصحية الخاصين بك عند تلقيك دواءً جديداً.

كيف ينبغي أن أتناول بريستيك؟

• تناول بريستيك تماماً تماماً ممتداً م