

STIMOL[®]

MALATE DE CITRULLINE

Poudre effervescente

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

STIMOL 1 g, poudre effervescente pour solution buvable en sachet-dose
Malate de citrulline

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement et votre maladie.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que STIMOL 1 g, poudre effervescente pour solution buvable en sachet-dose et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre STIMOL 1 g, poudre effervescente pour solution buvable en sachet-dose ?
3. Comment prendre STIMOL 1 g, poudre effervescente pour solution buvable en sachet-dose ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver STIMOL 1 g, poudre effervescente pour solution buvable en sachet-dose ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE STIMOL 1 g, poudre effervescente pour solution buvable en sachet-dose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Médicament à visée antiasthénique.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans les états de fatigue passagers, chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STIMOL 1 g, poudre effervescente pour solution buvable en sachet-dose ?

Contre-indications

N'utilisez jamais STIMOL 1 g, poudre effervescente pour solution buvable en sachet-dose :

- En cas d'allergie connue à l'un de ses constituants.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mises en garde :

En cas de régime hyposodé, tenir compte dans la ration journalière de la présence de 100 mg de sodium par sachet. En raison du pH acide, les sachets doivent être dilués dans un verre d'eau.

Précautions d'emploi :

En cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Prise d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement:

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT PRENDRE STIMOL 1 g, poudre effervescente pour solution buvable en sachet-dose ?

Posologie :

Réserve à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

Adulte : 3 sachets par jour, en les répartissant au cours de la journée.

Enfant de plus de 6 ans : 2 sachets par jour, en les répartissant au cours de la journée.

Mode d'administration :

Voie orale.

Diluer les sachets dans un verre d'eau.

Durée du traitement :

Ne pas utiliser plus de 4 semaines.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, STIMOL 1 g, poudre effervescente pour solution buvable en sachet-dose est susceptible d'avoir des effets indésirables bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

* Rarement, légères brûlures d'estomac en début de traitement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER STIMOL 1 g, poudre effervescente pour solution buvable en sachet-dose ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser STIMOL 1 g, poudre effervescente pour solution buvable après la date de péremption mentionnée sur la boîte et sur les sachets.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient STIMOL 1 g, poudre effervescente pour solution buvable en sachet-dose ?

La substance active est :

Malate de citrulline* 1 g

* formé *in situ* à partir de 566,44 mg de L-citrulline et de 433,56 mg d'acide DL-malique.

Pour un sachet-dose

Les autres composants sont :

Povidone, bicarbonate de sodium, maltodextrine, saccharine sodique, arôme fraise (substances aromatisantes, gomme arabique, maltodextrine).

Qu'est ce que STIMOL 1 g, poudre effervescente pour solution buvable en sachet-dose et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de poudre effervescente en sachet-dose ; boîte de 18 ou 36 sachets.

TITULAIRE/EXPLOITANT

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly - France

FABRICANT

BIOCODEX

1 avenue Blaise Pascal

60006 Beauvais - France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 21/01/2008.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de [biossaps](http://www.biossaps.fr) (France).