

**COMPRIMES
A SUCER**

CARBONATE DE CALCIUM Orocal[®] 500 MG

COMPOSITION :

Carbonate de calcium 1250,00 mg

Quantité correspondant à 500,00 mg de calcium élément

Aspartam 1,00 mg

Excipient (sorbitol, polyvidone, sucres hydrogénés, stéarate de magnésium, mono-, di- et tri-glycérides, huiles essentielles d'orange) q.s.p. un comprimé à sucer.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament apporte du calcium. Il est préconisé dans les manques de calcium en période de croissance, de grossesse, d'allaitement et comme apport de calcium dans les ostéoporoses.

CONTRE-INDICATIONS :

- hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang)
- hypercalciurie (élimination exagérée de calcium dans les urines)
- lithiase calcique (calculs rénaux), calcifications tissulaires
- immobilisations prolongées s'accompagnant d'hypercalciurie et/ou d'hypercalcémie.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- En cas de traitement prolongé, il est nécessaire de faire contrôler régulièrement le taux de calcium dans les urines (calciurie).
- En cas d'association avec la vitamine D, les dosages du calcium dans le sang et les urines doivent être pratiqués régulièrement.
- En cas de traitement à base de fluorure de sodium : il est conseillé de décaler la prise de calcium.
- En cas de traitement par les digitaliques : l'administration de calcium (surtout si elle est associée à la vitamine D) nécessite une surveillance régulière.
- En cas de traitement par les tétracyclines (qui sont une classe d'antibiotiques) par voie orale, il est recommandé de décaler d'au moins 3 heures la prise de ce médicament.
- En raison de la présence d'aspartam : l'administration de ce produit doit être évitée en cas de phénylcétonurie.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

POSOLOGIE - MODE D'ADMINISTRATION :

Voie orale - Les comprimés sont à sucer, à distance des repas.

- Adultes : carences calciques en général et ostéoporoses : 2 à 3 comprimés par jour.

- Enfants : carences calciques en période de croissance : 1 à 2 comprimés par jour en fonction du poids et de la taille.

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE :

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir immédiatement votre médecin.

EFFETS INDESIRABLES :

Bouche sèche au moment de la prise.

CONSERVATION :

Ce médicament doit être conservé à une température ne dépassant pas 25° C

FABRICANT ET TITULAIRE :

NYCOMED PHARMA AS, Drammensveien 852, P.O. Box 205, N-1372 Asker, NORVEGE

Bien refermer le flacon après usage.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur