NOVARTIS

فولتفاست®

الشكل المستحلب وكمية المادة الفعالة ٥٠ مليغرام

التركيب

المادة الفعالة: ديكلوفينك بوتاسيوم (متشكل حمض فينيل خليك)

المواضع الاستعمال

• وجع حساسية مطرفية تجاه المادة الفعالة أو في من المواد المذكورة تحت بند **التركيب**.
• وجود تاريخ من تضخم نخمي، شرى، التهاب انفي حاد، وتأييدات الفيتو أو أعراض شبيهة بالأربعة بعد تناول المادة الفعالة أو مواد أخرى مشابهة لها في الدواء الوحيد المسبب للأزمة.
• الثلث الثالث من الحمل (انظر **الحمل والإرضاع**).
• الفترة المتبقية بالنسبة لعملية الجراحة القلبية الوعائية.
• مرض أنتهابي بالأمعاء (مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي).
• وجود قرحة هضمية أو جراحة سابقة مرتبطة بالقرحة (اثنتان أو أكثر من الأحداث المتميزة).
• الحدث الكلوي الشديد (تصفية الكريياتينين < ٣٠ مليلتر/ دقيقة).
• الخلل الكلوي الشديد (SYMPTOMATIC RENAL FAILURE).
• الخلل الشديد في وظيفة الكبد (تصفية الألبومين < ٣٠ غرام/ لتر، أو استخدام الفا الفيتو - الأنتيتريبسين < ٥٠ بالمئة).
• الخلل نخمي ٢ (انظر **الحمل والإرضاع**).

التحذيرات والاحتياطات

الاستخدام الأولي الأقصى الجرعة اليومية المسموحة للمادة الفعالة للأنتهاب

لقد تحدثت دراسات أولية عن وجود خطر متزايد لحدوث أحداث قلبية وعائية خطيرة (مثل احتشاء عضلة القلب، السكتة الدماغية) عند استخدام مثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) وحصار مستقبلات التوتر الوعائي (ARB) لفترات طويلة. وتشير الدراسات الوبائية المتوفرة إلى أن الأخطار الناجمة عن الأحداث القلبية الوعائية الخطيرة (MACE) المرتبطة بالأدوية الأولية تبدو بسيطة، وتعتمد على الجرعة اليومية. وتشير الدراسات الوبائية إلى أن الأخطار الناجمة عن الأحداث القلبية الوعائية الخطيرة (MACE) تزداد بشكل ملحوظ عند استخدام مثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) أو حصار مستقبلات التوتر الوعائي (ARB) لفترات طويلة