

لمست هناك أية عملية على حدوث اختلالات جنينية أو تشوهات خلقية لأجنة ترضى لسفوروكسيم أكستيل ولكن كما هو الحال مع كل العقاقير، يجب إظهارها بحرص في التثوير الأولى من الحمل.

يفرز سفوروكسيم أكستيل فيليب، لذا يجب ترحي المخز في حالات إعطائه للمرضعات.

التفاعلات الدوائية

الإعطاء المتزامن للبرونيدس مع السفوروكسيم أكستيل يزيد من متوسط التركيز في المصل مقابلًا لمنحى الوقت بنسبة 50%.

تكون قوة تركيز السفوروكسيم في المصل بعد إعطاء 1.5 غ منه كجرعة واحدة أعلى عندما يعطى مع إغم من البرونيدس (متوسط 14.8 ميكروغرام/مل من إعطائه من غير البرونيدس (متوسط 12.2 ميكروغرام/مل).

فرط الجرعة

قد تسبب زيادة الجرعة من السيفلوسبورينات إلى إثارة الردى الخدي إلى نجاتجب تم تخفيض تركيز السفوروكسيم في المصل بنسبة البريتون أو بزيادة الجرعة.

الجرعة وطريقة الاستعمال

للحبار:

- في الحالات الخفيفة إلى المعتدلة من التهابات الجهاز التنفسي السفلي تسحب الالتهابات إلى 250 ملغم مرتين يوميًا في حالات الالتهابات الشديدة مثل التهاب الرئة) يمكن زيادة الجرعة إلى 500 ملغم مرتين يوميًا.
- في حالات مرض السيلان غير المحصور بمناعتات، يجب إعطاء 1 غم كجرعة مرة واحدة.
- في حالات التهابات الجيوب الأنفية، يجب إعطاء 125 ملغم مرتين يوميًا، و التهابات الأنف وحوضها تكون الجرعة الموصى بها 250 ملغم مرتين يوميًا.
- في حالات التهابات الجلد والأمسجة التناسقة، تكون الجرعة الموصى بها 250 ملغم مرتين يوميًا ويمكن زيادتها إلى 500 ملغم مرتين يوميًا.

الجرعة الاعتيادية في 125 ملغم مرتين يوميًا للأطفال المصابين بالتهاب الأنف الوسطى، الجرعة الاعتيادية في 250 ملغم مرتين يوميًا للأطفال الذين تقل عمرهم عن سنتين، 250 ملغم مرتين يوميًا للأطفال الذين يزيد عمرهم عن سنتين. لا يوجد دواء كافية لاستخدامه للأطفال تحت عمر 3 أشهر.

لا يلزم اتخاذ أي احتياطات للمرضى الذين يشكون من ضعف في وظائف الكلىتين أو الذين يجري علاجهم بالهذيان، أو اللذين قد اعطاهم جرعات تصل إلى الحد الأقصى الطبيعي وهو 1 غم في اليوم.

يجب تناول سفوروكسيم أكستيل بعد تناول الطعام وذلك لتحقيق الامتصاص الأمثل.

الأشكال الصيدلانية

- سيفوروكسيم 125[®] أقراص، كل قرص ملين شفافياً يحتوي على 125 ملغم سفوروكسيم أكستيل ف. ر. م. في عبوة مكونة من 10 أقراص.
- سيفوروكسيم 250[®] أقراص، كل قرص ملين شفافياً يحتوي على 250 ملغم سفوروكسيم أكستيل ف. ر. م. في عبوة مكونة من 10 أقراص.
- سيفوروكسيم 500[®] أقراص، كل قرص ملين شفافياً يحتوي على 500 ملغم سفوروكسيم أكستيل ف. ر. م. في عبوة مكونة من 10 أقراص.
- سيفوروكسيم 125[®] مغلق، كل 5 مل (بد التحضير) تحتوي على 125 ملغم سفوروكسيم أكستيل ف. ر. م. في قارورة 50 مل كمسوق جاهز للتشخيص.
- سيفوروكسيم 250[®] مغلق، كل 5 مل (بد التحضير) تحتوي على 250 ملغم سفوروكسيم أكستيل ف. ر. م. في قارورة 50 مل كمسوق جاهز للتشخيص.
- عبوات الاستشفائية مفرقة.
- المواد غير الفعالة في مستحضر سيفوروكسيم[®] أقراص هي: ميكروكريستالين سيلولوز، كروز كلومولوز سدوديوم، كراوليد سولونك داي أوكسيد، سدوديوم أوريل سفاليت، سدوديوم ستراشيت جلابلوكيت، بودرة ماسيديوم سيبريت، سيباميت، 752[®] أبيض.
- المواد غير الفعالة في مستحضر سيفوروكسيم[®] بودرة للتحليل المعلق هي: ميتولوز، سدوديوم أوريل سفاليت، سكرز، صلبان، ميثيل براين سدوديوم، بريك براين سدوديوم، سدوديوم سكارين، حمض سيتريك، كراوليد سولونك داي أوكسيد، نكهة الفراولة، نكهة الكوز، تيتانيوم داي أوكسيد.

ظروف التخزين

سيفوروكسيم[®] أقراص: يجب أن يخزن بحجرة جافة دون 30[°] م. يجب أن يخزن بدرجة حرارة دون 30[°] م. بد التحضير يجب أن يخزن بالثلاجة (2[°] م - 8[°] م) و سيفوروكسيم[®] مغلق يجب أن يخزن بدرجة حرارة دون 30[°] م. بد التحضير يجب أن يخزن بالثلاجة (2[°] م - 8[°] م) و يتم التخلص من الكمية غير المستخدمة بعد 14 أيام من تحضيره.

الخصائص الدوائية

سيفوروكسيم[®] (سيفوروكسيم أكستيل) هو مشتق حوي من الجيل الثاني للسيفلوسبورينات، وله تأثير واسع النطاق قاتل للبكتيريا عن طريق منع تخليق جدار الخلية.

سيفوروكسيم أكستيل هو مضاد البكتيريا المتعددة الالتهابات التي تتناول كثير من البكتيريا الموجبة والسالبة الجرام (بما في ذلك معظم البكتيريا الأوبسكيلوس).

يتمتع سيفوروكسيم أكستيل بتوافره عن طريق الفم من الفعالية الضمنية وتبادل بسرعة في الشفاء المخاطي للأعضاء وتمكين الفرجح المضاد للبكتيريا في البوزة الدموية، ويتم التوافره بعد تناولها مع الطعام، وتصل قوة تأثير سيفوروكسيم في المصل بعد تناوله عن طريق الفم بنسبة أفضاها من 2 - 3 ساعات. ونصف العمر له في المصل حوالي 1 - 2 ساعة - و حوالي 50 % من سيفوروكسيم المصل متحد مع البروتين. سيفوروكسيم لا يتم استقلابه، ويتم طرحه عن طريق الترويض الجزيئي وروبو و الإفراز الأوبسي.

سيفوروكسيم أكستيل يركز فعلاً في المنسفر عند المرض المتعدد الحوائج التالية:

- التهوية، مسالفة الجرام، هيوفيسا الفانازا (وتشمل السوائل المقاومة للاسطين)، هيوفيسا الفانازا، ماركسياكانتالايوس، ليفيبريوكا كوني، كليبولا، برونوس مارييل، برونوس انكرستاتز، بروفيديانسا رجوي ونيديسا غونوري (وتشمل السوائل المتعددة غير الفماتية للبكتيريا).
- تظهرت الاختلافات المعلمة أن بعض منجروليا مورجاني، صفال التيروتروكتر وسيتروكتر تقادم الالتهوية، موجبة الجرام، المكورات العنقودية أوريوس (وتشمل السوائل المتعددة للبكتيريا ولكن تستثنى السوائل المقاومة للبكتيريا)، المكورات العنقودية المناهضة للبشرة، المكورات السحيجة يويوفيا (و مجموع أخرى من المكورات السحيجة مثل الحطلة الدم)، المكورات السحيجة مجموع ب (المكورات السحيجة اجالاتيا) وفسال برونيسيون بكتيريوم، بعض صفال التيروكتر، مفرقة مثل المكورات السحيجة البرازية.
- التهوية، موجبة الجرام مسالفة الجرام المكونية (وتشمل السوائل المتعددة البكتيريا)، مفرقة (بما في ذلك المكورات السحيجة البرازية).
- الجرام السحيجة (وتشمل صفال كلوستريديا) ومسالفة الجرام السحيجة (ر تشمل صفال بكتيريوس وفرايزيتريديا).
- صفال صفال بكتيريوس فراجيليس مفرقة.
- صفال سدوميوس، صفال كاهيليوكتر، صفال كلوستريديا، صفال ستيكس، ومعظم صفال سيرايا و برونوس فراغريس وكلوستريديا ديفيسيل مقاومة لكثير من السيفلوسبورينات بما فيها سفوروكسيم أكستيل.

الاستطبابات

سيفوروكسيم[®] بوصف علاج كثر من الالتهابات منها:

- التهابات الجهاز التنفسي السفلي: مثل التهابات الشعب الحاد والزمن و التهاب الروني.
- التهابات الجهاز التنفسي العلوي: التهابات الأنف والأذن والحنجرة مثل التهابات الأنف الوسطى، التهابات الجيوب الأنفية و التهابات الزوايين بالدموع.
- التهابات المعصاة البولية و التناسلية: مثل التهاب الكلىة وحوضها الحاد والزمن، التهاب المثانة و التهاب مجرى البول.
- التهابات الجلد و الأمسجة التناسقة: مثل العملق، تجلخ الجلد و القرواح.
- التهابات العظام السيلاني الحاد و الخفاني من العضلات الجعري البول و عرق الرحم.

الأعراض الجانبية

- الأعراض الجانبية لسفوروكسيم أكستيل قليلة الحدوث و عادة تكون خفيفة وموقفة في طبيعتها وتشمل الأثر التالية:
- الاضطراب البطني من النوع، القيء، الإسهال و الألم.
- كما هو الحال مع كل المضادات الحيوية الواسعة الطيف الأخرى، سجلت التقارير بشكل نادر حدوث التهاب القولون العفالي من الخفيف مع العلاج بالسيفوروكسيم أكستيل.
- سجلت حدوث حالات صداع.
- هناك تقارير نادرة عن حدوث تفاعلات مرضية واسعة النطاق الجلدي.
- تم ملاحظة حدوث زيادة في عدد الإريثروسيات وموقفة في تسبب بعض الحالات الكبد (ALT (SGPT، AST (SGOT).
- تم تسجيل نتائج إيجابية غير صحيحة لفحص كومب داي بعض المرضى خلال العلاج بالسيفوروكسيم أكستيل.

موانع الاستعمال

يجب استعمال سيفوروكسيم أكستيل للمرضى المعروفين بحدوث حالات فرط حساسية عند تناول السيفلوسبورينات.

محاذير الاستعمال

على الرغم من تسبب حدوث تفاعلات مشتركة بين السيلينات والسيفلوسبورينات، ولكن كما هو الحال مع كل السيفلوسبورينات الأخرى، فإنه يجب إعطاء سيفوروكسيم أكستيل بأمان للمرضى ذوي الحساسية المفرطة للسيلينات، ويلزم اتخاذ احتياطات خاصة للمرضى الذين سبق و تعرضوا لتأثيرات استهفانية من السيلين.

كما هو الحال مع الاستعمال المضاد للبكتيريا الأخرى، فإن استعمال سيفوروكسيم أكستيل لمدة طويلة قد يؤدي إلى تكاثر البكتيريا غير الحساسة (مثل كلستيديا التيروكسي وكلوستريديا ديفيسيل) كما قد يلزم إيقاف العلاج.

تم تسجيل حالات التهابات القولون العفالي الخفيف مع كل من المضاد الحيوية الواسعة الطيف، لذلك، من المهم اتخاذ تلك الاحتياطات عند إعطاء عدد حدوث التهابات القولون و الحاد للمرضى أثناء أو بعد استعمال المضاد الحيوي.

يجب عدم سحق أقراص سفوروكسيم أكستيل، ولذلك يجب أن يتم منسابة للأطفاًل تحت سن 5 سنوات.

يتمتع سيفوروكسيم أكستيل بالامتصاص الجيد، ولذلك يجب اختيار الجرعة في الحالات المرضية الذين يتناولون نتائج إيجابية غير صحيحة عند اختبار الجرعة أو اختبار الجرعة أو اختبار الجرعة بطريقة البكتيريا القوية.

و كذلك عند استخدام الممرقة المعددة عند اختبار الجرعة أو اختبار الجرعة أو اختبار الجرعة، الذين يتناولون سيفوروكسيم أكستيل الحقة باستخدام الطريقة المنبئية على الإزيمات لإجراء هذا الفحص.

إن هذا دواء

- الدواء ممنوعه يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- أدوية وصفة الطبيب ومفرقة الاستعمال المنصوص عليها.
- وتعليمات الصيدلاني التي مرفقة مع هذا الدواء.
- لا تطيب والصيدلاني لها الجيوبان بالذواء ويضعفه وضرو.
- لا تطبق علاج الحاد الحدوث كل ما تم ناقده تفصلاً.
- لا تكون صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

إنتاج شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية -ميدفاarma- الأردن