

فابيسيل

بخاخ للأفم محدد الجرعة



الحمل والإرضاع بالثدي؛ لا تتوفر دراسات في الحوامل أو المرضعات أو الحيوان. لذلك ينصح الإستعمال قابسيل إلا إذا كانت النساء المرضعات تبرر المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الجنين.

الأثار الجانبية غير المرغوبية قد يلاحظ في حالات نادرة إصابة مرضي موقف سلسه أو جفاف في الأنف.
التفاعلات مع الأدوية الأخرى: كما هو الحال في جميع العناصر الفائضة للأوعية، يمنع استعمال القليل لغيرهن في المرضى الذين يعالجون بمعبيطات أكسيدار أحادي الأمين أو الذين كانوا يعالجون بها في الأسابيع السابقات.
ويتوجب الخزن عند تخزينه مضادات الاتكاب الثالثية الحلقات أو مضادات ارتقان ضغط الدم، من قبل أخصار آمن.


فرط الحرارة: لم يتم تعيين فابيسيل بشكل عارض بواسطة صغار الأطفال عن أي آثار جانبية خطيرة مطلقاً.
وكذلك غالبية الحالات بدون أعراض، غير أنه سجلت أحياناً حالات إصابة بالتعب، أو لم بالعافية، أو تسرع ضيق في ضربات القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، أو تهيج، أو أرق، أو شدوم.

ولا يوجد تزريق محدد في حالة زراعة الجرعة في حالة استعمال مضادات المستامين مع عقار فوتالجروجيك ولا تختفي الأمر غسل الملعة عادة، حتى بعد إبعاد محتويات فالورة كاملاً (١٥ مل).
ويمكن وصف إعطاء فحم منشط ورم عصار ملين في حالة زيادة الحرارة لدى صغار الأطفال، أما في حالة الأطفال الأكبر سناً (أفق ٦ سنوات) والبالغين فإنه يمكنه عادة شرب كمية كبيرة من الماء.

التحذير: يحظى بعيداً عن تأثير الحرارة (يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية).

لا يستخدم الدواء بعد اقضائه فترة صلاحيته (EXP) المبينة على العلبة.
التعينة: بخاخ سعة ١٥ مل.

- إدخال الرشاش في أحد المنخرتين واضغط عليه مع استنشاق الدواء داخل الأنف في الوقت نفسه. تكرر هذه العملية في المنخر الآخر.
- أخذ وضع غطاء الرشاش.



استخدام الرشاش
أضغط مع الاستنشاق في الوقت نفسه.

قوية الاستعمال:
نواهي الاستعمال: فرط الحساسية لأي من المكونات. لا يستعمل القليل لغيرهن، شأنه شأن المواد الأخرى الفائضة للأوعية، في حالات القلب الأنف المضمربي البيسيط والقباب الأنف المضمربي المصبوغ ببارازات كربونيك الرايحة (أفق الفم الكربونيك)، وفي المرضى الذين يتلقونهم بمعبيطات أكسيدار أحادي الأمين أو الذين كانوا يتلقون هذه العناصر في الأسابيع السابقات.

إحتياطات: لا يستعمل قابسيل بصورة متواصلة لمدة تزيد على أسبوعين، أما إذا استمرت الأعراض، فعليه زيارة طبيب آخر، ينصح بانتظار الطبيب، وقد يؤدي الاستعمال الطويل أو الزائد إلى تسرع المعاذاة أو احتقان ارتكادي أو التهاب الأنف مستحب بالدواء.
وكما هو الحال في جميع العناصر المرضعية الفائضة للأوعية، لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها، ولا يتطلب بالأساسية إلى الرضق وضغط الأنف والسبعين؛ إذ يسود الإفراط في الاستعمال إلى ظهور عيوب ههاريزية وخاصة بالنسبة إلى سغار الأطفال والمسنين.
ويجب كذلك تجنب استعمال جرعات زائدة في حالات ارتفاع ضغط الدم أو الأمراض القلبية الوعائية الأخرى، أو فرط الدقيقة أو التهاب العروق (أفق الضفبة الأذوية).
وكما هو الحال في جميع المنتجات المرضعية الفائضة للأوعية، يتبع الحذر في استعمال قابسيل في حالات التفاعلات المرغطة للبيهارات السمباتي، التي تظهر في دشك أو دوخة.

التركيب: كل ١ مل من قابسيل يحتوي على:
ماليت لوبيتين ٢٥ ملغم
فينيل إفرين ٥ ملغم
بنزوكربونيك كربونيك حافظة ١٠ ملغم
السراغات، ثباتي، فوسفات الصوديوم، كلوريد الصوديوم، أمادي فوسفات الصوديوم، كلوريد الصوديوم، توين ٨٠، ميه عاليه الفردية.

الغواص والغطاسين: قابسيل يحتوي الأنف ويحجب الإفراطات مع المحافظة على أيام الأداب تأثيره الرياحاني في سماته المخالفة في الأنف، والتقليل إفرين مركب مائي بهيبي بالمستويات، وبفضل الأنف المضمربي، فهو قادر على تذكره بطيءاً يجيء القراءات الأنفية بسرعة ولهمة طيبة.
أما ماليت لوبيتين في قوي مركب مضاد للحساسين يؤثر في مستويات H٤ ودرجة تحمل جديدة، حراسة الدواء: هذا الدواء يؤثر تأثيراً مرضحياً ولا يرتبط شفاهة بتراكيز مكتنلة الفعالة في الدم.

دواعي الاستعمال والاستخدام العلاجي: نزلات البرد، التهابات الأنف العادة والزمزنة، التهاب الأنف المويسي، (حس الكل) والتهاب الأنف غير المويسي الناتج عن الحساسية، التهاب الجيوب الأنفية العادة والزمزنة، الرغبة قبل العمليات الجراحية وبعدها، علاج سعال في حالات التهاب الأنف الوسطي.

الجرعة والتوقيتات الاستعمال:
الاطفال فوق ٦ سنوات وآباء الرشاث: رشة أو رشاش في كل منخر ٣-٤ مرات في اليوم (يعطى الرشة الواحدة ١٤٠ ملغم في المتوسط).

تتبع الخطوات التالية:
١- اخذ غطاء الرشاش
٢- إزاع غطاء الرشاش
قبل الاستعمال الأول: شغل مكبس الرشاش عددة مرات لتحضير الرذاذ، وبعدما يصبح الرشاش جاهزاً لا يستعمل مباشرة.

