

نشرة العبوة: معلومات للمريض

عقار زوكور 10، 20، 40 ملغم أقراص مغلفة سيمفاستاتين

يرجى قراءة هذه النشرة كاملة بحماية قبل أن تبدأ بتناول هذا الدواء؛ لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

- احتفظ بهذه النشرة؛ فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة إضافية، فاستشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.
- تم وصف هذا الدواء لك وحكك، لا تحمله لأخرين؛ فقد يضر بهم، حتى إذا كانوا يُعالَون من نفس علامات المرض التي تعاني منها.
- إذا ظهرت لديك أية أعراض جانبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك. ويشمل ذلك أية أعراض جانبية مُحتمَلة، غير المدرجة في هذه النشرة. انظر إلى القسم 4.

ما هي محتويات هذه النشرة؟

- ما هو عقار زوكور؟ وكيف يُستخدم؟
- ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار زوكور؟
- كيفية تناول عقار زوكور.
- الأعراض الجانبية المحتملة.
- كيفية تخزين عقار زوكور.
- محتويات العبوة ومعلومات أخرى.

1. ما هو عقار زوكور؟ وكيف يُستخدم؟

يحتوي عقار زوكور على المادة الفعالة سيمفاستاتين. زوكور هو دواء يُستخدم لخفض مستويات الكوليسترول الكلي، والكوليسترول "الضار" (الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة "LDL")، والمواد الدهنية التي تُعرف بـ "الدهون الثلاثية" الموجودة في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يزيد عقار زوكور من مستويات الكوليسترول "المفيد" (كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة "HDL"). ينتمي عقار زوكور إلى فئة من الأدوية تُعرف بـ "الستاتينات".

الكوليسترول هو واحد من العديد من المواد الدهنية الموجودة في مجرى الدم. يتكون الكوليسترول الكلي أساسًا من الكوليسترول منخفض الكثافة والكوليسترول عالي الكثافة.

على ما يُسمى الكوليسترول منخفض الكثافة بالكوليسترول "الضار" ؛ لأنه يمكن أن يتراكم على جدران الشرايين مشكلة لويحة. وفي النهاية يُمكن أن يؤدي تراكم المواد الدهنية هذه إلى تضيق الشرايين. هذا التضيق يُمكن أن يبطئ أو يمنع تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية مثل القلب والمخ. يمكن أن يؤدي منع تدفق الدم هذا إلى حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

عادةً ما يُسمى الكوليسترول عالي الكثافة بالكوليسترول "المفيد"؛ لأنه يُساعد على إبعاد الكوليسترول الضار عن الشرايين ويقي من أمراض القلب.

تُعد الدهون الثلاثية شكلاً آخر من الدهون الموجودة بالدم، فهي قد تزيد من مخاطر حدوث مرض بالقلب.

يجب عليك اتباع نظام غذائي خافضٍ للكوليسترول أثناء تناول هذا الدواء.

يُستخدم عقار زوكور إلى جانب النظام الغذائي الخافض للكوليسترول إذا كنت تعاني من الآتي:

- ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم (ارتفاع كوليسترول الدم الأولي)، أو ارتفاع مستويات الدهون في الدم (فرط دهون الدم من النوع المختلط).
- مرض وراثي (فرط كوليسترول الدم العائلي متجانس الجينات) يزيد من مستوى الكوليسترول في الدم. قد تتناول أيضًا علاجات أخرى.
- أمراض القلب التاجية "CHD" أو كانت لديك مخاطر مرتفعة للإصابة بأمراض القلب التاجية (لأنك تعاني من مرض السكري، أو لأن لديك تاريخًا مرضيًا للإصابة بالسكري الدماغي، أو غيرهما من أمراض الأوعية الدموية). قد يبطئ عقار زوكور من مركب من خلال الحد من خطر التعرض لمشاكل أمراض القلب، بغض النظر عن كمية الكوليسترول الموجودة في الدم.

في معظم الأشخاص، لا تظهر أي أعراض فورية نتيجة لارتفاع الكوليسترول في الدم. يمكن لطبيبك قياس نسبة الكوليسترول لديك عن طريق فحص دم بسيط. قد يزيارة طبيبك بانتظام، ومراقبة الكوليسترول لديك، ومناقشة أهدافك العلاجية مع طبيبك.

2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول عقار زوكور؟

لا تتناول عقار زوكور في الحالات الآتية:

- إذا كنت تعاني من حساسية من سيمفاستاتين أو أيٍّ من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المدرجة بقسم 6: محتويات العبوة ومعلومات أخرى).
- إذا كنت تعاني حاليًا من مشاكل في الكبد.
- إذا كنت حاملًا أو مرضعًا.
- إذا كنت تتناول دواءً (أدوية) يحتوي (تحتوي) على واحدة أو أكثر من المواد الفعالة التالية:
 - إتراكونازول أو كيتوكونازول أو فلوكونازول (يُستخدم لعلاج العدوى الفطرية)
 - إريثروميسين أو كلاريثروميسين أو تيليثروميسين (يُستخدم لعلاج العدوى)
 - مضطبات إيزيم البروتينات الخاص بغيروس نقص المناعة البشري مثل إيندينافير، نلفينايفير، وريتونايفير، وساكوينافير (تُستخدم مضطبات إيزيم البروتينات الخاص بغيروس نقص المناعة البشري لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشري).
 - بوسيسينيفير أو تيلابريفير (يُستخدم لعلاج عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي من النوع "سي")
 - نيفازودون (يُستخدم في علاج الاكتئاب)
 - كوبيسيسينات
 - جيمفيروزيل (يُستخدم لخفض نسبة الكوليسترول)
 - سيكلوسبورين (يُستخدم في المرضى الخاضعين لعمليات زرع أعضاء)
 - دافازول (هرمون من صنع الإنسان يُستخدم لعلاج انتفاخ بطنانة الرحم، وهي حالة تنمو فيها بطنانة الرحم خارج الرحم).
- إذا كنت تتلقى أو قد تلقيت خلال الأيام السبعة الأخيرة دواءً يُدعى حمض الفوسيدنيك (دواء يُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية) عن طريق الفم أو الحقن. قد يسبب تلقي حمض الفوسيدنيك بمصاحبة عقار زوكور مشاكل عضلية خطيرة (انحلال البريدات). لا تتناول أكثر من 40 ملغم من عقار زوكور إذا كنت تتناول لوميتابايد (يُستخدم لعلاج الحالات الخطيرة والنادرة للكوليسترول الوراثي).

استشر طبيبك إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان دواوك قد ورد بقائمة الأدوية المذكورة أعلاه.

تحذيرات واحتياطات

أخير طبيبك:

- عن كل الحالات الطبية التي تعاني منها بما في ذلك الحساسية.
- إذا كنت تتناول كميات كبيرة من الكحوليات.
- إذا عانيت سابقًا من مرض بالكبد. قد يكون عرض زوكور غير مناسب لك.
- إذا كنت تصعد الخضوع لعملية جراحية. فقد تحتاج إلى التوقف عن تناول أقراص عقار زوكور لفترة قصيرة.
- إذا كنت أسويًا، فقد تأسبك جرعة مختلفة.

يجب أن يُجرى لك طبيبك فحص دم قبل أن تبدأ بتناول عقار زوكور وإذا عانيت من أي أعراض لمشاكل في الكبد أثناء تناؤك لعقار زوكور، وذلك للتحقق من مدى كفاءة عمل الكبد لديك.

قد يرغب طبيبك أيضًا في إجراء فحوصات بالدم للتحقق من مدى كفاءة عمل الكبد لديك بعد بدء تناول عقار زوكور.

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو معرضًا لخطر الإصابة به، فسيقوم طبيبك بمراقبة عن كثب أثناء الفترة التي تتناول فيها هذا الدواء. من الوارد أن تكون معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات السكر والدهون في الدم، أو زيادة في الوزن، وارتفاع ضغط الدم.

أخير طبيبك إذا كنت تعاني من مرض رئوي شديد.

اتصل بطبيبك في الغور إذا عانيت من الألم، أو أوجاع أو ضعف بالعضلات لا يمكن تفسيره، وذلك لأنه في حالات نادرة، يمكن لمشاكل العضلات أن تكون خطيرة، ويشمل ذلك تحلل العضلات الذي يؤدي إلى حدوث تلف بالكلى، وقد حدثت حالات وفاة بشكل نادر جدًا.

تكون مخاطر تحلل العضلات أكبر عند تناول جرعات مرتفعة من عقار زوكور، وخاصة جرعة 80 ملغم. تكون أيضًا مخاطر تحلل العضلات أكبر في بعض المرضى. تحدث مع طبيبك إذا كان لديك عليك أي مما يلي:

- إذا كنت تتناول كميات كبيرة من الكحوليات.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية.
- إذا كنت تبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر.
- إذا كنت أنثى.
- إذا عانيت سابقًا من مشاكل بالعضلات خلال العلاج باستخدام الأدوية الخافضة للكوليسترول والتي تُعرف بـ"الستاتينات" أو الفايبرات.
- إذا كنت أنت أو أحد أفراد العائلة المقربين تعاني من اضطراب وراثي بالعضلات.

أخير أيضًا طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تُعاني ضعفًا مستمرًا بالعضلات. قد يستلزم الأمر فحوصات وأدوية إضافية لتشخيص وعلاج لك.

الأطفال والمراهقون

تمت دراسة أمان وفعالية عقار زوكور في الفتيان من عمر 10 - 17 عامًا والفتيات اللواتي قد بدأت فترة الحيض لديهن قبل سنه واحدة على الأقل (انظر قسم 3: "كيفية تناول عقار زوكور"). لا تتم دراسة عقار زوكور في الأطفال في أقل من ثلث أعوامه عن 10 سنوات. للحصول على مزيد من المعلومات، تحدث مع طبيبك.

تناول أدوية أخرى مع عقار زوكور

أخير طبيبك إذا كنت تتناول أو تتناول مؤخرًا أو قد تتناول أية أدوية أخرى مع أيٍّ من المواد الفعالة التالية: تناول عقار زوكور مع أيٍّ من هذه العقاقير قد يزيد من مخاطر حدوث مشاكل بالعضلات (بعضها قد تم بالفعل سرد في قسم "لا تتناول عقار زوكور" أعلاه).

- إذا كنت بحاجة إلى تناول حمض الفوسيدنيك عن طريق الفم لعلاج عدوى فطسيتين عليك التوقف مؤقتًا عن استخدام هذا الدواء. سيخبرك طبيبك بالوقت الذي سيكون فيه من الأمان إعادة بدء تناول عقار زوكور. في حالات نادرة، قد يسبب تناول عقار زوكور بمصاحبة حمض الفوسيدنيك ضعفًا أو وجعًا أو ألمًا بالعضلات (انحلال البريدات). انظر المزيد من المعلومات بشأن انحلال البريدات في قسم 4.
- سيكلوسبورين (يُستخدم عادة في المرضى الخاضعين لعمليات زرع أعضاء)
- دافازول (هرمون من صنع الإنسان يُستخدم لعلاج انتفاخ بطنانة الرحم، وهي حالة تنمو فيها بطنانة الرحم خارج الرحم).
- الأدوية التي بها مادة فعالة مثل إتراكونازول أو كيتوكونازول أو فلوكونازول أو بوساكونازول أو فوريكونازول (يُستخدم لعلاج العدوى الفطرية)
- الفايبرات التي بها مادة فعالة مثل جيمفيروزيل وبيزافايبرات (تُستخدم لخفض نسبة الكوليسترول)
- إريثروميسين أو كلاريثروميسين أو تيليثروميسين (يُستخدم لعلاج العدوى البكتيرية)
- مضطبات إيزيم البروتينات الخاص بغيروس نقص المناعة البشري مثل إيندينايفير ونلفينايفير وريتونايفير وساكوينافير (يُستخدم لعلاج مرض "الإيدز")
- الأدوية المضادة لفيروس التهاب الكبد من النوع "سي" مثل بوسيسينيفير، تيلابريفير، إلباسفير أو جرازوبريفير (يُستخدم لعلاج عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي من النوع "سي")،
- نيفازودون (يُستخدم في علاج الاكتئاب)
- أدوية تحتوي على المادة الفعالة كوبيسيسينات،
- أمبودرون (يُستخدم في علاج عدم انتظام ضربات القلب)
- فيراإميل، ديليتيازيم، أو أملوديبين (يُستخدم لعلاج ضغط الدم المرتفع، الآلام الصدريه المرتبطة بأمراض القلب، أو بعض حالات أمراض القلب الأخرى).
- لوميتابايد (يُستخدم لعلاج الحالات الخطيرة والنادرة للكوليسترول الوراثي).
- دايفومييسين (عقار يُستخدم لعلاج تورم الدم والعدوى التي تصيب الجلد وبنيّة لجلد المعدة). من المحتمل أن تزداد الأعراض الجانبية التي تصيب العضلات عند تناول هذا الدواء أثناء العلاج للعلاج بسيمفاستاتين (على سبيل المثال: عقار زوكور). قد يقرر طبيبك أنه ينبغي عليك التوقف عن تناول عقار زوكور لفترة من الزمن،
- كوليستين (يستخدم في علاج مرض الفطرس).
- تيكاجريلور (دواء مضاد للصفيحات الدموية).

بالإضافة إلى الأدوية المذكورة أعلاه، أخير الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتناول أو تتناول مؤخرًا أية أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية. وعلى وجه الخصوص، أخير طبيبك إذا كنت تتناول أية أدوية أخرى تحتوي على أيٍّ من المواد الفعالة التالية:

- أدوية تحتوي على مادة فعالة لمنع تخثر (تجلط) الدم، مثل وارفارين أو فينوبروكومون أو أسيتروكمازول (مضادات لتجلط)
- فينوفايبرات (يُستخدم أيضًا لخفض نسبة الكوليسترول).
- نياسين (يُستخدم أيضًا لخفض نسبة الكوليسترول).
- ريفامبين (يستخدم في علاج السل).

يجب أيضًا أن تخبر أي طبيب يصف لك دواءً جديدًا بأنك تتناول عقار زوكور.

تناول عقار زوكور مع الأغذية والمشروبات

يحتوي عصير الجريب فروت على واحد أو أكثر من المكونات التي من شأنها أن تُغير من الطريقة التي يُستخدم بها الجسم بعض المنتجات الدوائية، بما في ذلك عقار زوكور؛ لذا يجب تجنب تناول عصير الجريب فروت.

الحمل والرضاعة الطبيعية

لا تتناولِي عقار زوكور إذا كنت حاملًا أو توين الحمل أو تعتقدين بأنك قد تكونين حاملًا. إذا أصبحت حاملًا أثناء تناول عقار زوكور، فتوقفي عن تناوله واستشيري طبيبك. لا تتناولي عقار زوكور إذا كنت مرضعًا؛ وذلك لأنه من غير المعروف ما إذا كان هذا الدواء يفرز في حليب الأم.

استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

القيادة واستخدام الآلات

من غير المتوقع أن يؤثر عقار زوكور في قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات. ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن بعض الأشخاص قد يصابون بصدخة بعد تناولهم لعقار زوكور.

يحتوي عقار زوكور على سكر الكاكتوز.

تحتوي أقراص عقار زوكور على سكر لـ "لاكتوز". إذا كان طبيبك قد أخبرك بأنك لا تتحمل بعض أنواع السكريات، فاستصل بعد قبل تناول هذا المنتج الدولي.

3. كيفية تناول عقار زوكور

سيحدد طبيبك تركيز الأقراص المناسب لك، بناءً على حالتك والعلاج الحالي الخاص بك ووضع المخاطر الفردية بالنسبة لك.

تناول دائمًا هذا الدواء كما أخبرك طبيبك بالضبط. يُرجى مراجعة طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تناول.

يجب عليك اتباع نظام غذائي خافضٍ للكوليسترول أثناء تناول عقار زوكور.

الجرعة:

الجرعة الموصى بها في سيمفاستاتين 5 ملغم أو 10 ملغم أو 20 ملغم أو 40 ملغم أو 80 ملغم مرة واحدة في اليوم عن طريق الفم.

البالعون:

جرعة البدء المعتادة هي 10 أو 20 أو في بعض الحالات؛ 40 ملغم في اليوم. قد يقوم طبيبك بضبط الجرعة بعد 4 أسابيع على الأقل لجرعة أقصاها 80 ملغم في اليوم. لا تتناول أكثر من 80 ملغم في اليوم.

قد يصف طبيبك جرعات أقل، وخاصة إذا كنت تتناول بعض المنتجات الدوائية المذكورة أعلاه أو تعاني من حالات معينة في الكلى.

يوصى بأصاغة الجرعة البالغة 80 ملغم فقط للمرضى البالغين الذين يعانون من ارتفاع شديد في مستويات الكوليسترول والأكثر غرضة لخطر الإصابة بأمراض قلبية والذين لم يبلغوا مستوى الكوليسترول المطلوب عند تناولهم جرعات أقل.

الاستخدام في الأطفال والمراهقين:

بالنسبة للأطفال (من 10 - 17 سنة)، فإن جرعة البدء المعتادة الموصى بها هي 10 ملغم يوميًا في المساء. الجرعة القصوى الموصى بها هي 40 ملغم في اليوم.

طريقة تناول:

تناول عقار زوكور في المساء. يمكنك تناوله مع الطعام أو دونه. استمر في تناول عقار زوكور ما لم يخبرك طبيبك أن تتوقف.

إذا كان طبيبك قد قام بوصف عقار زوكور مع أحد الأدوية الأخرى الخافضة للكوليسترول التي تحتوي على أي عازل للحمض الصفراوي، فيجب أن تتناول عقار زوكور قبل الدواء العازل للحمض الصفراوي بساعتين على الأقل أو بعده بأربع ساعات.

إذا تناولت كمية من عقار زوكور أكثر مما يجب

- يُرجى الاتصال بالطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

إذا نسيت تناول عقار زوكور

- لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض جرعة أغفلتها. لكن تناول الجرعة المعتادة فقط من عقار زوكور في الوقت المعتاد من اليوم التالي.

إذا توقفت عن تناول عقار زوكور

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي؛ لأن مستوى الكوليسترول لديك قد يرتفع مرة أخرى.

إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية حول استخدام هذا المنتج، فاستشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

4. الأعراض الجانبية المحتملة

مثل كافة الأدوية، قد يسبب عقار زوكور أعراضًا جانبية، على الرغم من أنها لا تحدث للجميع.

تصف المصطلحات التالية معدل الإبلاغ عن حدوث الأعراض الجانبية:

- نادرة (قد تؤثر في ما يصل إلى 1 من كل 1000 شخص).
- نادرة جدًا (قد تؤثر في ما يصل إلى 1 من كل 10000 شخص).
- غير معروفة (لا يمكن تقدير معدل التكرار من واقع البيانات المتاحة).

إذا ظهرت أي من الأعراض الجانبية الخطيرة المذكورة أعناه، فتوقف عن تناول الدواء وأخبر طبيبك فورًا أو اذهب إلى قسم الطوارئ بالقرى مستشفى.

تم الإبلاغ عن أعراض جانبية خطيرة لثلاثة حدوث وهي كالآتي:

- الآلام أو أوجاع أو ضعف أو تقلصات بالعضلات. وذلك لأنه في حالات نادرة، يُمكن لمشاكل العضلات أن تكون خطيرة، ويشمل ذلك تحلل العضلات الذي يؤدي إلى حدوث تلف بالكلى؛ وقد حدثت حالات وفاة بشكل نادر جدًا.
- تفاعلات فرط الحساسية (الحساسية) ومن بينها:
 - تورم الوجه واللسان والحلق مما قد يسبب صعوبة في التنفس (الوذمة الوعائية).
 - طفح شديد بالعضلات يكون عادة في الكففين والوراكين.
 - ألم جلد مصحوب بضعف في الأطراف وعضلات الرقبة.
 - آلام أو التهاب المفاصل (ألم المعضلات الروماتزمي).
 - التهاب الأوعية الدموية.
 - ظهور كدمات غير معتادة، طفح جلدي وتورم، شرى (ارتيكاريا)، حساسية الجلد للشمس، حمى، احمرار.
 - ضيق التنفس وشعور بالإحياء
 - ظهور مرض شبيه بالذئبة (يتضمن طفحًا جلديًا، اضطرابات بالمفاصل، وتأثيرات على كريات الدم).
- التهاب الكبد المصحوب بالأعراض الآتية: اصفرار الجلد والعينين، حكة، ظهور بول داكن اللون أو براز باحت اللون، الشعور بالتعب أو الضعف، فقدان الشهية، فشل كبدي (نادر جدًا).

- التهاب البنكرياس، ويكون عادة مصحوبًا بألم شديد بالبطن.

تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية الخطيرة الثلاثة جدًا وهي كالآتي:

- تفاعلات حساسية خطيرة تسبب صعوبة في التنفس أو دوخة (قئ).
- طفح قد يصيب الجلد أو فرح بالقم (طفح حرازي الشكل ناجم عن الغبار)،
- تمزق عضلي،
- تنتهي الرجال (يصنعُ الشَّخصُ لدى لدى الرجال).
- كما تم أيضًا الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية؛ بشكل نادر:
 - انخفاض عدد كريات الدم الحمراء (فقر الدم).
 - تعليل أو ضعف في الزراعين والساقين.
 - صداع، شعور بوخز، دوخة.
 - عدم وضوح رؤية، ضعف الرؤية،
 - اضطراب حسيّ حوضية (ألم بالبلع، الإمساك، انتفاخ البطن، عسر الهضم، إسهال، غثيان، قء).
 - طفح جلدي، حكة، تسلط الشعر.
 - ضعف.
 - مشاكل بالدم (نادرة جدًا).
 - ضعف الذاكرة (نادرة جدًا)، فقدان الذاكرة، الارتباك

كما تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية ولكن لا يمكن تقدير معدل تكرارها من واقع البيانات المتاحة (معدل الحدوث غير معروف):

- اضطرابات بالانصباب.
- اكتئاب.
- التهاب بالرئتين بسبب مشاكل في التنفس تتضمن سعالًا دائمًا و/أو ضيق التنفس أو حمى.
- مشاكل بالأوتار، قد تكون في بعض الأحيان مصحوبة بتمزق الوتر.
- تم الإبلاغ عن أعراض جانبية إضافية محتملة مع تناول بعض لـ "ستيكويدات":
 - اضطرابات في النوم، بما في ذلك الكوابيس.
 - صعوبات جنسية.
 - مرض السكري. من المرجح حدوث ذلك إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات السكر والدهون في الدم، أو زيادة الوزن وتعاني من ارتفاع ضغط الدم. سيقيم طبيبك بمراقبةك أثناء الفترة التي تتناول فيها هذا الدواء.
 - ألم عضلي، أوجاع، أو ضعف وألم العضلات قد لا يزول في حالات نادرة جدًا بعد التوقف عن تناول عقار زوكور (معدل التكرار غير معروف).

تتألف الفحوصات المخبرية

لوحظ ارتفاع في بعض فحوصات الدم المخبرية الخاصة بوظائف الكبد وأحد الإنزيمات العضلية (إيزيم كيناز الكريتين).

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

إذا ظهرت لديك أية أعراض جانبية، فتحدث إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك. ويشمل ذلك أية أعراض جانبية مُحتمَلة، غير المدرجة في هذه النشرة، من خلال إبلاغك عن الأعراض الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير معلومات إضافية حول أمان استخدام هذا الدواء.

5. كيفية تخزين عقار زوكور

احفظ هذا الدواء بعيدًا عن رطوبة ومُتناول الأطفال.

لا تقم بالتخزين في درجة حرارة تتعدى 30 درجة مئوية. يُرجى الحفظ داخل العبوة الأصلية. لا تُستخدم هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية الممنون على العبوة بعد كلمة "EXP".

لا تتخلص من الأدوية عن طريق إلقائها في مياه الشرف أو مع المخلفات المنزلية. استشر الصيدلي الخاص بك في كيفية التخلص من الأدوية التي لم تُعد تستخدمها. يساعد هذه الإجراءات في الحفاظ على البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

محتويات عقار زوكور

المادة الفعالة هي سيمفاستاتين (10 ملغم، 20 ملغم، أو 40 ملغم).

المكونات الأخرى هي: بوتيل هيدروكسي الأنيسول (E320)، حمض الأمكوريك (E300)، حمض ستريك أحادي الهيدرات (E330)، ساليور ديفق التابور (E460)، نشا سابق التجلت، ستيرات ستغسيوم (E572)، ولاكتوز أحادي الهيدرات. تحتوي طبقة تغليف القرص على هيدروميولاز (E464)، هيدروكسي برويل الساليولز (E463)، ثنائي أكسيد التيتانيوم (E171)، وبثك (E553b). كما تحتوي أقراص 10 ملغم و20 ملغم على أكسيد الحديد الأصفر (E172) وأكسيد الحديد الأحمر (E172). بالإضافة إلى ذلك، تحتوي أقراص 40 ملغم على أكسيد الحديد الأحمر.

شكل عقار زوكور ومحتويات العبوة

قرص مغلف.

أقرص 10 ملغم ملبسة تحتوي على 10 ملغم سيمفاستاتين ، بيضاوية الشكل، لونها زهري فاتح، مع عبارة MSD 735 منشوتة على جهة واحدة منها.

أحجام العبوة: شرايح من 1، 4، 10، 14، 15، 20، 30، 28 (10×3)، 50، 60، 90، 100 قرص.

أقرص 20 ملغم ملبسة تحتوي على 20 ملغم سيمفاستاتين ، بيضاوية الشكل، لونها غامق ، مع عبارة MSD 740 منشوتة على جهة واحدة منها.

أحجام العبوة: شرايح من 1، 4، 10، 14، 15، 20، 28، 30 (10×3)، 50، 60، 90، 100 قرص.

أقرص 40 ملغم ملبسة تحتوي على 40 ملغم سيمفاستاتين ، بيضاوية الشكل، لونها أحمر داكن، مع عبارة MSD 749 منشوتة على جهة واحدة منها.

أحجام العبوة: شرايح من 1، 4، 10، 14، 15، 20، 28، 30 (10×3)، 50، 60، 90، 100 قرص.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

الشركة المالكة لحقوق التسويق والشركة المصنعة

الشركة المالكة لحقوق التسويق:

ميرك شارب و ديم بي. في.

وارندروج 39

2031 بي ان هارلم

هولندا

الشركة المصنعة:

ميرك شارب و ديم المحدودة،

شوتون لين، كراملينجتون،

نورثمبر لاند ان إي33جي يو،

المملكة المتحدة

الشركة المصدرة للتشغيلة:

ميرك شارب و ديم بي. في.

وارندروج 39، 2031 بي ان

هارلم، هولندا.

تاريخ آخر موافقة على هذه النشرة 2020/12.

(هذا منتج دولي)

- الدواء منتج يُؤثر على صحتك ويتناوله على نحو مخالف للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع الوصفة الطبية تمامًا وطريقة الاستخدام والتعليمات الصيدلي الذي يباعك الدواء.
- الطبيب والصيدلي هما خبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها.

- لا توقف من تلقاء نفسك فترة العلاج التي تم وصفها لك.
- لا تكرر نفس الوصفة الطبية دون استشارة الطبيب.

احفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيدلة العرب