

عقار زوكور 10، 40 ملغم أقراص مغلفة

نشرة العبوة: معلومات للمريض

سيمفاستاين

القيادة واستخدام الالات
من غير المتنوع أن تؤثر عقار زوكور في قدرتك على القيادة أو استخدام الالات. ومع ذلك، يجب أن يردد في الاعتقاد أن بعض الأشخاص قد يصابون بدرجة بعد تناولهم لعقار زوكور.

يحتوي عقار زوكور على سكر الالكتوز.

تحتوي أقراص عقار زوكور على سكر الالكتوز. إذا كان طبيبك قد أخبرك بذلك لا تتحمل بعض أنواع السكريات، فاتصل به قبل تناول هذا المنتج الوظيفي.

3. كيفية تناول عقار زوكور

سيحدد طبيبك ترتكز الأعراض المناسب لك، بناء على حالتك والعلاج الحالي الخاص بك ووضع المخاطر الفردية بالنسبة لك.

تناول دائمًا هذا الدواء كما أخبرك طبيبك بالضبط. يرجى مراجعة طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متاكلاً عن كيفية التناول.

يجب عليك اتباع نظام غذائي خالٍ من الكوليسترون أثناء تناول عقار زوكور.

الجرعة:
الجرعة الموصى بها هي سيمفاستاين 5 ملغم أو 10 ملغم أو 20 ملغم في اليوم. قد يوصي طبيبك مرة واحدة في اليوم عن طريق الفم.

البالغون:
جرعة الدهن المعدنية هي 10 أو 20 في بعض الحالات؛ 40 ملغم في اليوم. قد يوصي طبيبك بضميرات الكوليسترون أو الأكتوز غصنة الخطر الإصابة بأمراض قلبية والذين لم يبلغوا مستوى الكوليسترون المطلوب من تناولهم جرعات أقل.

الاستخدام في الأطفال والمرأهقين:
بالنسبة للأطفال (من 10 - 17 سنة) فإن جرعة الدهن المعدنية الموصى بها هي 10 ملغم يوميًّا في المساء. الجرعة القصوى الموصى بها هي 40 ملغم في اليوم.

طريقة التناول:
تناول عقار زوكور في المساء. يمكنك تناوله مع الطعام أو دونه. استمر في تناول عقار زوكور ما لم يخبرك طبيبك أن توقف.

إذا كان طبيبك قد أوصى بوصف عقار زوكور مع أحد الأدوية الأخرى الخاضعة للكوليسترون التي تحتوي على أي عارل للدهن المضاد للمغصاري، فيجب أن تناول عقار زوكور قبل الدواء العازل للمغصاري بسبعين على الأقل أو بعد باربع ساعات.

إذا تناولت كمية من عقار زوكور أكثر مما يجب

• يرجى التصال بطبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

إذا تناولت عقار زوكور

• لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض اغفلتها. لكن تناول الجرعة المعدنية فقط من عقار زوكور في الوقت المعتاد من اليوم التالي.

إذا توقفت عن تناول عقار زوكور

• تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي، لأن مستوى الكوليسترون لديك قد يرتفع مرة أخرى.

إذا كانت لديك آية أسلمة اضافية حول استخدام هذا المنتج، فاتصل بطبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

4. الأعراض الجانبية المختلطة

مثل كافة الأدوية، قد يسبب عقار زوكور أعراضًا جانبية، على الرغم من أنها لا تحدث للجميع.

نصف المصطلحات الثالثية معدل الإلحاد عن حدوث الأعراض الجانبية:

• نادراً (قد تؤثر في ما يصل إلى 1 من كل 1000 شخص).

• غير معروفة (لا يمكن تدبير معدل التكرار أو موقع البيانات المختلطة).

إذا ظهرت أي من الأعراض الجانبية الخطيرة المذكورة أدناه، توقف عن تناول الدواء وأخبر طبيبك فوراً أو اذهب إلى قسم الطوارئ بالقرب من مستشفى.

تم الإبلاغ عن أعراض جانبية خطيرة تأثر الحدوث وهي كالتالي:

• الام أو لوحة أو ضغفه أو اضطرابات بالأعضاء، وذلك لأنه في حالات نادرة، يمكن مشاكل

العضلات أن تكون خطيرة، ويشمل ذلك تحمل العضلات الذي يؤدي إلى حدوث تأثير بالكلية، وقد حدثت حالات وفاة بشكل نادر جدًا.

• تفاعلات فرط الحساسية (الحساسية) ومن بينها:

• تورم الوجه والعنق والحلق والرقبة مما قد يسبب صعوبة في التنفس (الوذمة الوعائية).

• الم شديد بالعضلات تكون عادة في الكتفين والوركين.

• مفعح جلدي مصحوب بضعف في الأطراف وعضلات الرقبة.

• الام أو اهتمام العضلات (الم العضلات الرموماتي).

• التهاب الأوعية المغوية.

• ظهور كدمات غير معتاد، مفعح جلدي ونورم، شرى (أرتيريا)، حساسية الجلد

• التهاب المفاصل، ضيق التنفس وشحوم.

• ضيق التنفس وشحوم ثانية (تضخم طحال جلدي، اضطرابات بالمفاصل، وتأثيرات

على كرباسات الم).

• التهاب الكبد المصادر بالأعراض الأتية: اصفرار جلد والعينين، حكة، ظهور بول

ذان الورم في الدم، أو زراعة بذان الورم، الشعور بالغثيان، فقدان الشهية، مثل كبد

نادر جدًا.

تم الإبلاغ عن أعراض جانبية تأثر حدوث ذلك إما كنت تعاني من ارتفاع مستويات السكر

والدهون في الدم، أو زيادة الوزن وتعاني من ارتفاع ضغط الدم، سيقوم طبيبك بمتابعتك

أثناء الفترة التي تتناول فيها هذا الدواء.

• الام العضلي، أو وجاع، أو ضغف دام بالعضلات قد لا يزول في حالات نادرة جدًا بعد التوقف عن تناول عقار زوكور (بعد التكرار غير معروف).

تناول الفحوصات المختلطة

للحذر ارتفاع في بعض فحوصات الدم المختبرية الخاصة بوظائف الكبد وأحد الإنزيمات العضلية

(أنزيم دهون الكرياتينين).

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

إذا طبّرت لديك آية اعراض جانبية، فتحتّت إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك، وشمل ذلك

أعراض جانبية مختلفة، غير الشديدة في هذه النشرة، من خلال إبلاغك عن الأعراض الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير معلومات اضافية حول أمن استخدام هذا الدواء.

5. كيفية تخفيف عقار زوكور

يُحفظ هذا الدواء بعيداً عن رؤية وتناول الأطفال.

لا تتم تخزين في درجة حرارة تتدنى 30 درجة مئوية. يرجى الحفظ داخل الغرفة الأصلية.

لا تخلص من الأدوية بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة بعد كلمة "EXP".

لا تخلص من الأدوية قبل انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة بعد كلمة "EXP".

الإجراءات في الحفاظ على البيئة.

شكل عقار زوكور ومتويات العبوة

فراص مغلق.

مع عبارة 10 ملغم ملبيبة تحتوي على 10 ملغم سيمفاستاين، ببصارة الشكل، لونها زهري فاتح،

أحجم العبوة: شرائح من 1-10، 10-20، 20-30، 30-40، 40-50، 50-60، 60-70، 70-80، 80-90، 90-100، أو 100 قرص.

أقراص 40 ملغم ملبيبة تحتوي على 40 ملغم سيمفاستاين، ببصارة الشكل، لونها أحمر داكن،

أحجم العبوة: شرائح من 4-7، 7-10، 10-14، 14-20، 20-28، 28-30، 30-36، 36-42، 42-48، 48-54، 54-60، 60-66، 66-72، 72-78، 78-84، 84-90، 90-96، أو 100 قرص.

قد لا يتم تسويق جميع حجم العبوة.

الشركة المطلقة الملحقة التسوق والشركة المصنعة:

ميرك شارب وروم بودي.

شوتون لين، كرالملينجنون،

نوشميريلاند إن أي 23 في بي،

المملكة المتحدة

الشركة المصدرة للنشفيفات:

ميرك شارب وروم بودي.

واردروج 39.

2031 بي إن هارام

هولندا

الشركة المصنعة:

ميرك شارب وروم بودي.

واردروج 39.

2031 بي إن هارام

تاريخ آخر موافقة على هذه النشرة 2020/12/12.

(هذه منتج موافق)

الآن، أنت، مثلك، على تناوله على حفاظه النشيفيفات، بغيرك زوكور.

الآن، الوضعية الطبيعية تماماً، وطرقه الآمنة، وفعاليته المصنوعة، بغيرك زوكور.

لا توقف عن تناوله على سكر الالكتوز.

لا توقف عن تناول عقار زوكور على سكر الالكتوز. إذا كان طبيبك قد أخبرك بذلك لا تتحمل

بعض أنواع السكريات، فاتصل به قبل تناول هذا المنتج الوظيفي.

3. كيفية تناول عقار زوكور

سيحدد طبيبك ترتكز الأعراض المناسب لك، بناء على حالتك والعلاج الحالي الخاص بك ووضع

المخاطر الفردية بالنسبة لك.

تناول دائمًا هذا الدواء كما أخبرك طبيبك بالضبط. يرجى مراجعة طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن

متاكلاً عن كيفية التناول.

يجب عليك اتباع نظام غذائي خالٍ من الكوليسترون أثناء تناول عقار زوكور.

الجرعة:

الجرعة الموصى بها هي سيمفاستاين 5 ملغم أو 10 ملغم أو 20 ملغم أو 40 ملغم أو 80 ملغم

مرة واحدة في اليوم عن طريق الفم.

البالغون:

جرعة الدهن المعدنية هي 10 أو 20 في بعض الحالات؛ 40 ملغم في اليوم. قد يوصي طبيبك

بضميرات الكوليسترون أو الأكتوز غصنة الخطر الإصابة بأمراض قلبية والذين لم يبلغوا مستوى

الكوليسترون المطلوب من تناولهم جرعات أقل.

قد يوصي طبيبك بضميرات الكوليسترون أو الصيدلي الخاص بك ووضع المخاطر

الآمنة، أو بعض أنواع السكريات، فاتصل به قبل تناول عقار زوكور.

يجب عليك اتباع نظام غذائي خالٍ من الكوليسترون أثناء تناول عقار زوكور.

الجرعة:

الجرعة الموصى بها هي سيمفاستاين 5 ملغم أو 10 ملغم سيمفاستاين، ببصارة الشكل، لونها زهري فاتح،

أحجم العبوة: شرائح من 1-10، 10-20، 20-30، 30-40، 40-50، 50-60، 60-70، 70-80، 80-90، 90-100، أو 100 قرص.

أقراص 40 ملغم ملبيبة تحتوي على 40 ملغم سيمفاستاين، ببصارة الشكل، لونها أحمر داكن،

أحجم العبوة: شرائح من 4-7، 7-10، 10-14، 14-20، 20-28، 28-30، 30-36، 36-42، 42-48، 48-54، 54-60، 60-66، 66-72، 72-78، 78-84، 84-90، 90-96، أو 100 قرص.

قد لا يتم تسويق جميع حجم العبوة.

الشركة المطلقة الملحقة التسوق والشركة المصنعة:

ميرك شارب وروم بودي.

واردروج 39.

2031 بي إن هارام

هولندا

الشركة المصنعة:

ميرك شارب وروم بودي.

واردروج 39.

2031 بي إن هارام

هولندا

الشركة المصنعة:

ميرك شارب وروم بودي.

واردروج 39.

2031 بي إن هارام

هولندا

الشركة المصنعة:

ميرك شارب وروم بودي.

واردروج 39.

2031 بي إن هارام

هولندا

الشركة المصنعة:

ميرك شارب وروم بودي.

واردروج 39.

2031 بي إن هارام

هولندا

الشركة المصنعة:

ميرك شارب وروم بودي.

واردروج 39.

2031 بي إن هارام

هولندا

الشركة المصنعة:

ميرك شارب وروم بودي.

واردروج 39.

2031 بي إن هارام

هولندا

الشركة المصنعة:

ميرك شارب وروم بودي.

واردروج 39.

2031 بي إن هارام

هولندا

الشركة المصنعة:

ميرك شارب وروم بودي.

واردروج 39.

2031 بي إن هارام

هولندا

الشركة المصنعة:

ميرك شارب وروم بودي.

واردروج 39.

2031 بي إن هارام

هولندا

الشركة المصنعة:

ميرك شارب وروم بودي.

واردروج 39.

2031 بي إن هارام

هولندا

الشركة المصنعة:

ميرك شارب وروم بودي.

واردروج 39.

2031 بي إن هارام