

succinimide pharbiol 3g

poudre pour suspension buvable en sachet-dose

Composition qualitative et quantitative

SUCCINIMIDE 3 g

Excipients: saccharose, silice colloïdale anhydre, huile essentielle de citron. Pour un sachet-dose

Forme pharmaceutique

Poudre pour suspension buvable, boîte de 30 sachets

Classe pharmaco-thérapeutique

A visée ANTIOXALURIQUE (G. Urologie)

Nom et adresse de l'exploitant

S.E.R.P. - Immeuble le Triton

5 Rue du Gabian - 98000 MONACO

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Traitemen d'appoint de certaines variétés de lithiases rénales (calculs rénaux) chez l'adulte.

ATTENTION !

Dans quel cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi

Le régime doit être appauvri en calcium (supprimer lait et laitages) et en oxalates. Il est conseillé de boire beaucoup d'eau (de préférence faiblement minéralisée) pendant le traitement.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement

Ce médicament ne doit pas être pris pendant la grossesse, ni pendant l'allaitement.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, CONSULTER VOTRE MEDECIN car lui seul pourra adapter le traitement à votre cas.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Posologie

RESERVE A L'ADULTE

En règle générale, 1 sachet par prise, 3 fois par jour

Mode et voie d'administration

Voie orale

Le sachet doit être dissout dans un grand verre d'eau sucrée ou non et pris avant les repas.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants: intolérance digestive et éruptions cutanées réversibles à l'arrêt du traitement.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

S.E.R.P. - Immeuble le Triton
5 Rue du Gabian - 98000 MONACO

Date de révision de la notice: Juin 2004