

التركيب

كل جرعة من بخاخ تابونكس المائي تعطي تقريبا ١٠٠-١٠٠ ملجم من ملحق موميتازون فيورات، تحتوي على موميتازون فيورات أحادي الهيدرات ما يعادل ٥٠ ميكروجرام من موميتازون فيورات.
المواد: ميكروكربونات سيليلوز وكربوكسي ميثيل سيليلوز صوديوم، جلايسرين، حمض السيتريك، سترات الصوديوم، بوليوسوربيت، بنزالكوكيوم كلوريد، كحول فينيل إيثيل.

الصفات

تابونكس بخاخ مائي للأنف عبارة عن وحدة إرذاذات تعطى جرعة محدودة و هي مصدقة بدوية تحتوي على ملحق من موميتازون فيورات.
موميتازون فيورات هو عبارة عن ستيرويد قشري موضعي له خواص مضادة للالتهاب دون أن يكون له آثار بدنية.

دواعي الاستعمال

تابونكس بخاخ مائي للأنف يستعمل من قبل البالغين، والمراهقين، والأطفال بين عمر ٢ و ١١ سنة لعلاج أعراض التهاب الأنف الموسمي والحولي.
بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى شديدة لالتهاب الأنف الموسمي، فإنه يفضل القيام بالعلاج الوقائي باستخدام تابونكس بخاخ مائي للأنف لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع قبل ابتداء موسم الفعار.
كما يستخدم بخاخ تابونكس المائي أيضا للبالغين والشباب في سن المراهقة ١٢ سنة و ما فوق كعلاج داعم مع المضادات الحيوية معارضة التهاب الجيوب الحاد.

موانع الاستعمال

يجب عدم استعمال تابونكس بخاخ مائي للأنف من قبل المرضى الذين يعانون من فرط الحساسية لأي من مكوناته.

الاحتياطات

يجب استعمال تابونكس بخاخ مائي للأنف بحذر في المرضى المصابين بالعدوى الدرقية النشطة أو الهامدة بالتهاب التنفسي أو العدوى الفطرية أو البكتيرية الغير معالجة، أو العدوى الفيروسية البدينية أو الحلا بسيط العدوى.
كما هو الحال في المستحضرات الأنفية الأخرى المحتوية على الستيرويدات القشرية، لا يجب استعمال تابونكس بخاخ مائي للأنف للنساء الحوامل أو الأمهات المرضعات إلا إذا فالت أهمية الفائدة المرجوة منه قيمة الأضرار التي يحتمل أن تصيب الأم أو الجنين. يجب فحص الأطفال المولودين من الأمهات اللاتي تناولن الستيرويدات القشرية جيدا لاحتمال وجود القصور الكظري.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى

تم استخدام تابونكس بخاخ مائي للأنف مع لوراتادين بدون ظهور أي تأثير على تركيز اللوراتادين أو المستقلب الأساسي في البلازما.
إن تركيز موميتازون فيورات بالبلازما لا يمكن قياسه و كان التحمل لهذه التركيبة جيدا.

المحاذير

لا يجب استعمال تابونكس بخاخ مائي للأنف في حالة حدوث عدوى موضعية غير معالجة تشمل المنطقة المخاطية بالأنف.
كما هو الحال مع أي علاج طويل المدى، فإنه يجب فحص المرضى الذين يستعملون تابونكس بخاخ مائي على مدى عدة شهور أو أطول بشكل دوري لاحتمال حدوث تغيرات للمخاط الأنفي.
في حالة حدوث عدوى فطرية موضعية بالأنف أو الالتهاب، أنه قد يتحتم إيقاف استعمال تابونكس بخاخ مائي و يستبدل بعلاج آخر مناسب. بغاء التهييج الأنفي الالتهابي قد يكون مَرشراً لإيقاف استعمال تابونكس بخاخ مائي للأنف.

الجرعة و طريقة الاستعمال

التهاب الأنف الموسمي والحولي بعد التهديد المبدي لمضخة تابونكس بخاخ مائي للأنف (عادة ٦ إلى ١٠ وحدة إرذاذات حتى يتنظم المناخ)، تعطي كل وحدة إرذاذ تقريبا ١٠٠ ملجم من ملحق موميتازون فيورات الذي يحتوي على ٥٠ ميكروجرام من موميتازون فيورات. يجب إعادة التهديد المبدي لمضخة البخاخة عند عدم استخدامها لمدة ١٤ يوم أو أكثر عند الاستخدام التالي.

رَح العومة جيدا قبل كل استعمال

الكبار (متضمنة المرضى المسنين) والمراهقين: الجرعة المعتادة للوقاية والعلاج هي بخنتين (٥٠ ميكروجرام لكل بخة) في كل منخر مرة يوميا (الجرعة الإجمالية ٢٠٠ ميكروجرام)

عندما يتم السيطرة على الأعراض: تخفض الجرعة إلى بخة واحدة في كل منخر (الجرعة الإجمالية ١٠٠ ميكروجرام) وقد تكون هذه الجرعة فعالة كجرعة دأمة.

إن لم يتم السيطرة على الأعراض بشكل جيد، فإنه من الممكن زيادة الجرعة للحد الأقصى وهو أربعة بخات في كل منخر مرة يوميا (الجرعة الإجمالية ٤٠٠ ميكروجرام). ينصح بتقليل الجرعة بعد السيطرة على الأعراض.

بتم إبتداء المفعول المؤثر إكلينيكيًا بعد ١٢ ساعة من أول جرعة.

الأطفال بين ٢ و ١١ سنة: الجرعة المعتادة بخة واحدة (٥٠ ميكروجرام/بخة) في كل منخر مرة يوميا (الجرعة الإجمالية ١٠٠ ميكروجرام).

عند استعمال الأطفال للبخاخة، يجب مساعدة الكبار لهم

العلاج الداعم معارضة التهاب الجيوب الحادة البالغين (متضمنة المرضى المسنين) والمراهقين ١٢ سنة و ما فوق: الجرعة المعتادة هي ٢ بخة (٥٠ ميكروجرام/ بخة) في كل منخر مرتين يوميا (الجرعة الإجمالية ٤٠٠ ميكروجرام).

إن لم يتم السيطرة على الأعراض بشكل جيد، فإنه يمكن زيادة الجرعة إلى أربعة بخات (٥٠ ميكروجرام / بخة) في كل منخر مرتين يوميا (الجرعة الإجمالية ٨٠٠ ميكروجرام).

زيادة الجرعة

نظرا لضعف التواجد الجيوي البديني لتابونكس (أقل من ٠.١٪) فإن زيادة الجرعة ليس من المحتمل أن تحتاج إلى علاج غير الملاحظة، ينبغي إعطاء الجرعة المناسبة الموصوفة.

الأعراض الجانبية

الأكثر من ١٠٪: صداع، التهاب البلعوم، سعال، رشح، التهابات الفهريسية
إلى ١٠٪: ألم في الصدر، عسر الطمث، قىء، إسهال، سوء الهضم، غثيان، ألم عضلي سطحي، ألم مفصلي، ألم عضلي، التهاب المتحمته، ألم الأذن، التهاب الأذن الوسطى، التهاب الجهاز التنفسي العلوي، التهاب الجيوب، رشح، التهاب القصبات، تهيج في الأنف، التهاب الأنف، آزيز عند التنفس، أعراض مشابهة بالإنفلونزا.
يجب مراجعة الصيدلاني أو الطبيب المعالج في حالة ظهور أي عرض جانبي.

الاحتياطات الصيدلانية

يحفظ في درجة حرارة الغرفة (١٠-٢٠°م).
يحفظ بعيدا عن النجم.
رَح جيدا قبل الاستعمال.
لا تستعمل الدواء بعد انتهاء مدة صلاحيته أو عند ملاحظة أي علامة تلف فيه.

العيوب

تحتوي كل عبوة على الأقل على ١٢٠ جرعة.

علامة تجارية

- إن هذا نداء
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات بعرضك للحظر
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة استعمال الدواء وتعليمات الصيدلاني الذي صرفه لك.
- الطبيب والصيدلاني هما المسؤولان بالدواء وبقائه وضرره.
- لا تقطع دقة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدال العرب

