

حالات العصب والعضلات بالمطبيقات: غير شائعة: عدى مضاعفة بالطب (الكبد).

الدم والجهاز اللمفاوي: غير شائعة: نقص الكريات البيض في الدم، نقص الكريات البيض المتماثلة، نقص الصفائح الدموية. نادرة: الأنيميا، حدوث لزيف (بما في ذلك التفرقة، الزراف، إطالة وقت اللزيف)، إزدياد الحمضات في الدم، أنيميا ناتجة عن تطل كريات الدم الحمراء. نادرة جداً: ندرة المحببات، نتيجة إيجابية لإختبار كومبس المباشرة، زمن الثرومبولاستين الجزئي طويل، زمن الثرومبولاستين طويل، كثرة الصفائح.

اضطرابات الجهاز الهضمي: غير شائعة: تفاعلات فرط الحساسية. نادر: تفاعلات تآكلية (بما فيها الصدمة التآكلية).

الاضطرابات الإسقاطية الغذائية: نادرة جداً: إخفاض البوتاسيوم في الدم، إخفاض غلوكوز الدم، إخفاض ألومين الدم، إخفاض غلوكوز الدم، ونقص البوتاسيوم في الدم.

اضطرابات النظام العصبي: غير شائعة: صداع، أرق.

اضطرابات وعائية: غير شائعة: إخفاض ضغط الدم، التهاب الوريد، التهاب الوريد الخثاري. نادرة: إحصار الوجه.

اضطرابات معدية معوية: شائعة: الإسهال، الغثان، التقيؤ. غير شائعة: الإمساك، سوء البصر، اليرقان، التهاب الكبد. نادرة: ألم المعدة، التهاب غشاء القولون الزائف.

اضطرابات الكبد والصفراء: غير شائعة: زيادة في إزيم ناقلة أمين الألانين، زيادة في إزيم ناقلة أمين الأسبرتات. نادرة: زيادة في البيليروبين، زيادة في إزيم الفوسفات القلوي في الدم، زيادة في إزيم ناقلة الغاماغلوتاميل، التهاب الكبد.

الاضطرابات الجلدية وحت الجلدية: شائعة: الطفح الجلدي. غير شائعة: الحكة، الثرى. نادرة: القناع، الحملي متعددة الأشكال. نادرة جداً: متندرة ستيقنز-جونسون، نيكروليس (موت خلايا البشرة).

اضطرابات الهيكل العظمي والعضلات والأشجعة والربطة والعظام: نادرة: ألم مفصلي.

اضطرابات الكلى: الإضطرابات البولية: غير شائعة: زيادة في كرياتين الدم. نادرة: عدى ما بين أنسجة الكلية، القشل الكلوي. نادرة جداً: زيادة يوريا الدم.

اضطرابات عامة واضطرابات موقع الحقن: غير شائعة: حمى و رد فعل عند موضع الحقن. نادرة: التسلب.

تُرأفت المعالجة بالبيريأسين بزيادة حدوث الحمى والطفح الجلدي عند المرضى الذين يعانون من مرض التسلب الكسبي.

إن الامتثال للتعليمات في الشرة يقلل من خطر الأعراض الجانبية. إذا لاحظت أي أعراض جانبية متدرجة أو غير متدرجة في هذه الشرة، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

تاريخ إنتهاء الصلاحية وظروف التخزين

راجع تاريخ إنتهاء الصلاحية الممنون على العبوة الخارجية.

يشير هذا التاريخ إلى منتج محفوظ بشكل صحيح في غلاف غير مفتوح.

لا تستعمل يتوفن بعد إنتهاء هذا التاريخ.

إعطاه في درجة حرارة لا تتعدى ٣٠°م.

بعد إعادة التركيب باستخدام المادة المذابة المناسبة، تكون المحاليل للإستخدام الوريدي والعضلي مستقرة لفترة ٢٤ ساعة في حال تخزينها بدرجة حرارة الغرفة ولفترة ٤٨ ساعة في حال تخزينها في الثلجة (٢-٨°م)، ويجب التخلص من أي محاليل لم تستخدم.

إحفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

التركيب

يتوفن ٢ غرام + ٢٥ ، ٠ غرام مسحوق معقم ومذيب لمحول للحقن في العضل

تحتوي كل عبوة على: المواد الفعالة: بيريأسين صوديوم ٠,٨٥٥ غرام (ما يعادل ٢ غرام من البيريأسين)، تازوبكتام صوديوم ٠,٢٦٨٣ غرام (ما يعادل ٠,٢٥ غرام من التازوبكتام). تحتوي كل أمبولة مذيب على: هايدروكلورايد البندوكاين ٠,٥ ٪، ماء للحقن.

يتوفن ٤ غرام + ٥ ، ٠ غرام مسحوق معقم لمحول للري الوريدي

تحتوي كل عبوة على: المواد الفعالة: بيريأسين صوديوم ٤,١٧٠ غرام (ما يعادل ٤ غرام من البيريأسين)، تازوبكتام صوديوم ٠,٥٣٦٦ غرام (ما يعادل ٠,٥ غرام من التازوبكتام).

الشكل الصيدلاني ومحتوى العبوة

- مسحوق معقم ومذيب لمحول للحقن في العضل

عبوة تحتوي على مسحوق ٢ غرام + ٢٥ ، ٠ غرام من البيريأسين والتازوبكتام وأمبولة تحتوي على المذيب هايدروكلورايد البندوكاين ٢٠ ملغم/ ٤ مل.

- مسحوق معقم لمحول للري الوريدي

المذيب مع البندوكاين للحقن في العضل فقط

عبوة تحتوي على مسحوق ٤ غرام + ٥ ، ٠ غرام من البيريأسين والتازوبكتام.

إنتاج: ميتم ش.م.

بريشا، إيطاليا

لصالح: أروان للصناعات الدوائية لبنان ش.م.ل.

جدار، لبنان

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات بعرضك الخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال الممنوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما المختاران بالدواء ويتبعه وضرور.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقا نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب، اتحاد الصيدلة العرب