

لوزانت آي أم ١٠٠ ملغ / ٥ ملغ، أقراص

لوزانت آي أم ١٠٠ ملغ / ١٠ ملغ، أقراص

(على شكل أملوديبين بيزيلات) لوزانت بوتاسيوم / أملوديبين (على شكل أملوديبين بيزيلات)

اقرأوا هذه النشرة بالكامل بعناية قبل القيام بتناول هذا الدواء حيث أنها تحتوي على معلومات مهمة لك.

احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إليها لاحقاً.

في حال وجود أي تساؤلات لديك يفضل استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي.

لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً ولا ينبغي لك أن تتعطه لأحد آخر حتى لو ظهرت عليه نفس أعراض مرضك فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار به.

إذا أصبحت بأى آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة اخْرِ الطبيب المعالج أو الصيدلي.

ما الذي تحتويه هذه النشرة

أ. ما هو لوزانت آي أم وما هي دواعي استعماله

أ. ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول لوزانت آي أم

٣. ما هي طريقة تناول لوزانت آي أم

٤. الأعراض الجانبية المحتملة

٥. طريقة تخزين لوزانت آي أم

٦. محتويات العلبة ومعلومات إضافية أخرى

٧. ما هو لوزانت آي أم وما هي دواعي استعماله

تحتوي أقراص لوزانت آي أم على لوزانت بوتاسيوم والأملوديبين. تُستخدم هاتان المادتين لضبط ارتفاع ضغط الدم.

٨. ينتمي لوزانت بوتاسيوم لمجموعة من الأدوية تدعى "مثبطات الأنجيوتنسين". ينبع الجسم أنجيوتنسين ٢ الذي يسبب تضيق

اللاؤتينية الدموية. وبالتالي يرفع ضغط الدم يقوم لوزانت بوتاسيوم بتثبيط تأثير أنجيوتنسين ٢.

٩. ينتمي أملوديبين إلى مجموعة من الأدوية التي تعرف باسم "حاصرات فنوات الكالسيوم". يمنع أملوديبين من انتقال الكالسيوم إلى جدران

الأوعية الدموية مما يؤدي إلى استرخاء الأوعية الدموية.

١٠. ما يعني أن هاتين المادتين تمنعان تضيق الأوعية الدموية وينتاج عن ذلك استرخاء الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم.

١١. يستخدم لوزانت آي أم لمعالجة ارتفاع ضغط الدم للمرضى الذين يتألقون لوزانت بوتاسيوم والأملوديبين من أفراد/كيسيولات مختلفه تناول لوزانت آي أم.

١٢. مقدار الجرعة وفي حال كان من الصعب ضبط اليوم بشكل كافٍ لدى بعض البالغين إذا تناولوا إحدى المادتين أملوديبين أو لوزانت بوتاسيوم.

١٣. ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول لوزانت آي أم

لا تتناول لوزانت آي أم إذا كان لديك حساسية للأملوديبين أو لأى من حاصلات فنوات الكالسيوم الأخرى. قد تشمل أعراض الحساسية الحكة، أحمرار الجلد أو

صعوبة في التنفس.

١٤. إذا كان لديك حساسية للوزانت بوتاسيوم أو لأى من مكونات هذا الدواء الأخرى (المدرجة في القسم ١).

١٥. إذا كنت تعاني من أمراض خطيرة تسبب الكبد أو الصفراء مثل التهاب الأقنية الصفراوية الأولي أو الركود الصفراوي.

١٦. إذا كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الكلى أو إذا كنت تخضع لгинسال الكل.

١٧. إذا كنت حاملاً لأكثر من ٣ أشهر من الآشهر من الآشهر امضياً تجنب لوزانت آي أم في بداية الحمل. مراجعة قسم الحمل.

١٨. إذا كنت تعاني من انخفاض حاد في ضغط الدم.

١٩. إذا كنت تعاني من نصيبي في الصمام الأبهري (تضيق الأبهري) أو صدمة قلبية (حالة مرضية حيث يفقد القلب قدرته على إمداد الجسم بكمية

كافية من الدم).

٢٠. إذا كنت تعاني من قصور في القلب بعد نوبة قلبية.

٢١. إذا كانت أحدى الشروط المذكورة أعلاه تنطبق عليك، لا تتناول لوزانت آي أم واستشر الطبيب المعالج.

التحذيرات والاحتياطات

استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

يجرب علىك الجرعة عند تناوله قبل تناول هذا الدواء.

٢٢. إذا كنت تعاني من أمراض القوى أو الإسهال.

٢٣. إذا كنت تعاني من أمراض الكبد أو الكل.

٢٤. إذا كنت قد خضعت لعملية زرع كلوي أو إذا كنت تعاني من تضيق في شرايين الكل.

٢٥. إذا كنت تعاني من مرض يؤثر على الغدد الكلوية يعرف بـ "فرط الأندروستيرون الأولي".

٢٦. إذا كنت قد عانيت من قصور في الوجه والحلق، أثناء تناول أدوية أخرى (بما في ذلك مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين). إذا واجهت أيًا

من هذه الأعراض، توقف عن تناول لوزانت آي أم واتصل بالطبيب المعالج على الفور، لا يجب أن تتناول لوزانت آي أم مرة أخرى.

٢٧. إذا كنت تناولت أيًا من الأدوية التالية المستخدمة لمعالجة ارتفاع ضغط الدم:

٢٨. مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (على سبيل المثال إنابرابيل لينوبيريل، رامببريل). خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكل لها

علة بمرض السكري.

٢٩. أليسكرين.

٣٠. الأدوية الأخرى لوزانت آي أم

استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أيًّا من الأدوية أخرى.

٣١. قد تغير النتيجة العلاجية إذا تم تناول لوزانت آي أم إلى جانب بعض الأدوية الأخرى. قد يكون من الضروري تغيير الجرعة أو اتخاذ احتياطات أخرى، وفي بعض

الحالات قد تضرر للنفوف عن تناول أحد الأدوية بعضاً أيضًا.

٣٢. مدرات البول (أحد أنواع الأدوية يُعرف أيضًا بـ "حبوب الماء") التي تزيد من كمية البول التي يفرزها الجسم)

٣٣. الليبيوم (دواء يستخدم لمعالجة بعض أنواع الاكتئاب)

٣٤. مدرات البول الحافظة للبوتاسيوم، مكملات البوتاسيوم، مكملات الصمام التاجي أو إذا كانت سماكة عضلة القلب

اليوناسيوم يقمع الأطعمة مثل كاريمازيبين، فينوباربيتال، فوسفينيتوبين، بريميدون)

٣٥. نسبة سانت جون

٣٦. التنوجلسيرين والنترات الأخرى، أو مواد أخرى تسمى "موسعة الأوعية الدموية"

٣٧. الأدوية المستخدمة لمعالجة فيروس نقص المناعة البشرية / أميدز (مثل إيتراوكونازول، كيتوكونازول)

٣٨. فيرآميبل، ديلتايريزم (يُستخدم لمعالجة ارتفاع ضغط الدم، الذبحة الصدرية وعُضُّ أنواع عدم انتظام ضربات القلب)

٣٩. سيميماسانتين (دواء يستخدم للتحكم في ارتفاع مستويات الكوليستيول)

٤٠. داتيبريلين (المعد للتسلسلي الوردي في حال تقليل درجة حرارة الجسم بشكل غير طبيعي).

٤١. الأدوية المستخدمة للوقاية من فرض الأعضاء المزروعة (سيكلوسبيرون).

لوزانت آي أم مع الطعام والشراب

يمكنك تناول لوزانت آي أم مع الطعام أو بدونه. لا يجب أن يتناول أيًّا من الأدوية الأخرى أو قد تتناول لوزانت آي أم لأن

الجريب فروت وعصير الجريب فروت يمكن أن يؤديان إلى ارتفاع مستوى المادة الفعالة أملوديبين في الدم، مما يتسبب في زيادة غير مذكورة في هذه النشرة.

٤٢. أم الخاضع لضغط الدم، استشر الطبيب المعالج قبل شرب الكحول. قد تؤدي الكحول إلى انخفاض ضغط الدم بشكل كبير وأو زيادة احتمال الإصابة

بالدورة أو الإغماء.

الحمل والرضاعة الطبيعية

الحمل

استشيري الطبيب المعالج إذا كنت تعنتدين أنك (أو قمت تصحيhen) جاميل. بطلب الطبيب المعالج عادة من المريضة بالتوقف عن تناول هذا الدواء قبل

الحمل أو حالماً تدرك أنها حامل وستصف لك دواء آخر بدلاً من لوزانت آي أم.

٤٣. لا ينصح باستخدامه هذا الدواء في بداية الحمل ولا يجب تناوله إذا كنت حاملاً لأكثر من ٣ أشهر لأنه قد يسبب ضررًا خطيرًا لطفلك إذا تم استخدامه بعد

الشهر الثالث من الحمل.

٤٤. الرضاعة الطبيعية

استشيري الطبيب المعالج إذا كنت ترضعين طفلك أو على وشك البدء في الرضاعة الطبيعية. ثبت أن أملوديبين ينتقل إلى حليب الثدي بكميات صغيرة.

ولا ينصح للأمهات المرضعات باستخدام هذا الدواء وقد يختلط الطبيب المعالج علاجاً آخر لك إذا كنت ترغبين في الرضاعة الطبيعية، خاصة إذا كان طفلك

حدث الولادة أو كان قد ولد قبل وفاته.

استخدام الأطفال والمراهقين لهذا الدواء

لا ينصح للأطفال والمراهقين (الذين تقل عمرهم عن ١٨ سنة) باستخدام لوزانت آي أم.

٤٥. القيادة واستخدام الآلات

قد يجعلك هذا الدواء وكذلك بعض الأدوية الأخرى المستخدمة لمعالجة ارتفاع ضغط الدم تشعر بالدوار، إذا واجهت هذه الأعراض، لا تقد السيارة ولا

تستخدم الأدوات أو الآلات.

٤٦. ما هي طريقة تناول لوزانت آي أم

اتبع بدقة إرشادات الطبيب المعالج عند تناول هذا الدواء. واستشر الطبيب المعالج إذا لست متأكداً.

٤٧. الجرعة المعتادة من لوزانت آي أم للبالغين هي قرص واحد في اليوم.

٤٨. من الأفضل أن تتناول القرص في الوقت نفسه من كل يوم.

٤٩. يجب بلع الأقراص مع كوب من الماء.

٥٠. بناءً على استجابة جسمك للعلاج، قد يصف لك الطبيب المعالج جرعة أعلى أو أقل. لا تتجاوز الجرعة الموصوفة لك.

٥١. يمكنك تناول لوزانت آي أم مع الطعام أو بدونه. لا تأخذ لوزانت آي أم مع الجريب فروت أو عصير الجريب فروت.

٥٢. لوزانت آي أم وكبار السن (١٥ عاماً وما فوق)

على الطبيب المعالج أن يتوخى الحذر عند زيادة جرعتك. إذا كانت لديك أستئنة إضافية حول كيفية استخدام هذا الدواء، استشر الطبيب المعالج أو

الصيدلي.

٥٣. إذا تناولت أقراص لوزانت آي أم بكمية أكبر مما ينبغي عليك

إذا تناولت أقراص لوزانت آي أم بكمية أكبر مما ينبغي، استشر الطبيب المعالج التالية: ضربات قلب سريعة (قد تواجه أيضًا تباطؤ في

ضربات القلب)، وانخفاض ضغط الدم.

٥٤. إذا نسيت تناول لوزانت آي أم

إذن بذلة طفيفة في حال تناول لوزانت آي أم.

٥٥. إذا تناولت لوزانت آي أم بكمية أكبر مما ينبغي، انتبه إلى عناية طبية فورية.

٥٦. إذا واجهت تحسسي شديد (طفح جلدي، حكة، توهج الوجه الشفتيين، الفم أو الحلق، الضعف، الإرهاق، مساعدة على انتظام ضربات القلب)

٥٧. رد فعل تحسسي على الأدوية التي تؤدي إلى عناية طبية عاجلة أو دخول المستشفى. هذا الأثر

الجانبي خطير ولكنه نادر قد تحتاج إلى تناولها بانتظام.

٥٨. قد تواجه هذه الآثار غير معروف (لا يمكن تقديم مدخل توارثها بانتظام) في حال تناول لوزانت آي أم

قد تواجه هذه الآثار غير معروف (لا يمكن تقديم مدخل توارثها بانتظام) في الحالات المزروعة بها.

٥٩. لوزانت بوتاسيوم

الآثار الجانبية الشائعة (قد تسبب شحضاً من بين ١٠٠ شخص)، صداع، دوار، نعاس (خاصة عند بداية العلاج)، خفقان القلب (خصوصاً في النساء)، احتقان، تقيؤ، تقرحات (شري)، حكة، طفح جلدي، توهج

أو خسارة اللون، الشعور بالغثيان، اضطرابات الأمعاء، الإسهال، غثيان، قيء، تقيؤ، تقرحات (شري)، حكة، طفح جلدي، توهج

أو خسارة اللون، الشعور بالغثيان، اضطرابات الأمعاء، الإسهال، غثيان، قيء، تقيؤ، تقرحات (شري)، حكة، طفح جلدي، توهج

أو خسارة اللون، الشعور بالغثيان، اضطرابات الأمعاء، الإسهال، غثيان، قيء، تقيؤ، تقرحات (شري)، حكة، طفح جلدي، توهج

أو خسارة اللون، الشعور بالغثيان، اضطرابات الأمعاء، الإسهال، غثيان، قيء، تقيؤ، تقرحات (شري)، حكة، طفح جلدي، توهج

أو خسارة اللون، الشعور بالغثيان، اضطرابات الأمعاء، الإسهال، غثيان، قيء، تقيؤ، تقرحات (شري)، حكة، طفح جلدي، توهج

أو خسارة اللون، الشعور بالغثيان، اضطرابات الأمعاء، الإسهال، غثيان، قيء، تقيؤ، تقرحات (شري)، حكة، طفح جلدي، توهج

أو خسارة اللون، الشعور بالغثيان، اضطرابات الأمعاء، الإسهال، غثيان، قيء، تقيؤ، تقرحات (شري)، حكة، طفح جلدي، توهج

أو خسارة اللون، الشعور بالغثيان، اضطرابات الأمعاء، الإسهال، غثيان، قيء، تقيؤ، تقرحات (شري)، حكة، طفح جلدي، توهج

أو خسارة اللون، الشعور بالغثيان، اضطرابات الأمعاء، الإسهال، غثيان، قيء، تقيؤ، تقرحات (شري)، حكة، طفح جلدي، توهج

أو خسارة اللون، الشعور بالغثيان، اضطرابات الأمعاء، الإسهال، غثيان، قيء، تقيؤ، تقرحات (شري)، حكة، طفح جلدي، توهج

أو خسارة اللون، الشعور بالغثيان، اضطرابات الأمعاء، الإسهال، غثيان، قيء، تقيؤ، تقرحات (شري)، حكة، طفح جلدي، توهج

أو خسارة اللون، الشعور بالغثيان، اضطرابات الأمعاء، الإسهال، غثيان، قيء، تقيؤ، تقرحات (شري)، حكة، طفح جلدي، توهج

أو خسارة اللون، الشعور بالغثيان، اضطرابات الأمعاء، الإسهال، غثيان، قيء، تقيؤ، تقرحات (شري)، حكة، طفح جلدي، توهج

أو خسارة اللون، الشعور بالغثيان، اضطرابات الأمعاء، الإسهال، غثيان، قيء، تقيؤ، تقرحات (شري)، حكة، طفح جلدي، توهج

أو خسارة اللون، الشعور بالغثيان، اضطرابات الأمعاء، الإسهال، غثيان، قيء، تقيؤ، تقرحات (شري)، حكة، طفح جلدي، توهج