جليـم (م)

نشرة العبوة: معلومات لمستخدم الدواء

أقراص جليـم 1 ملجم
أقراص جليـم 2 ملجم
أقراص جليـم 3 ملجم
أقراص جليـم 4 ملجم
أقراص جليـم 6 ملجم
جليميبرايد

اقرأ كل ما بهذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ بتناول هذا الدواء

- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، اسأل طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعامل معه.
- هذا الدواء تم وصفه لك. لا تعطيه للآخرين. فقد يضرهم حتى لو كانت أعراضهم هي نفس أعراضك.
- إذا لاحظت أن أياً من الآثار الجانبية لهذا الدواء أصبحت جسيمة، أو لاحظت ظهور أعراض جانبية لم ترد في هذه النشرة، فضلاً أخبر طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعامل معه.

هذه النشرة تحتوي على ما يلي:

1. **ما هي أقراص جليـم وفيم تستخدم.**
2. **ما يجب مراعاته قبل تناول أقراص جليـم.**
3. **كيفية تناول أقراص جليـم.**
4. **الأعراض الجانبية المحتملة.**
5. **كيفية حفظ أقراص جليـم.**
6. **معلومات إضافية.**

1. ما هي أقراص جليـم وفيم تستخدم

جليـم هو عبارة عن دواء يؤخذ عن طريق الفم لتقليل مستوى السكر بالدم. هذا الدواء ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى السلفونيل يوريا تستخدم لتقليل مستوى السكر بالدم. **جليـم** يعمل على زيادة كمية الإنسولين المفرزة من البنكرياس. الإنسولين يقوم بتقليل مستوى السكر بالدم لديك.

فيم تستخدم أقراص **جليـم**

تستخدم أقراص **جليـم** لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني عندما تكون الحمية، التمرين البدني، وتقليل الوزن وحدها غير قادرة علي التحكم في مستوى السكر بالدم لديك.

2. ما يجب مراعاته قبل تناول أقراص "جليـم"

امتنع عن تناول أقراص "جليـم" وأخبر طبيبك في الحالات الآتية:

- إذا كنت تعاني من فرط التحسس لمادة الجليميبرايد أو أي دواء آخر من مجموعة السلفونيل يوريا؛ (وهي أدوية تستخدم لتقليل مستوى السكر بالدم مثل الجليبنكلاميد) أو السلفوناميدات (وهي أدوية تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية مثل السلفا ميثوكسازول) أو أي من المكونات الأخرى لأقراص "**جليـم**" (مذكورة في القسم"6" مم تتكون أقراص "**جليـم**").
- إذا كنت مصابا بمرض السكري المعتمد على الإنسولين من النوع الأول.
- إذا كنت تعاني من الحماض الكيتوني السكري (وهو أحد مضاعفات داء السكري عندما يزيد مستوى الحمض بالدم لديك وقد تعاني من الأعراض التالية: التعب، الشعور بالإعياء (الغثيان)، كثرة التبول والتيبس العضلي).
- إذا كنت في حالة غيبوبة سكري.
- إذا كنت مصابا بمرض حاد بالكلى.
- إذا كنت مصابا بمرض حاد بالكبد.
- بشكل عام بالنسبة للنتائج المتعلقة بالأوعية الكبيرة: ليس هناك دراسات سريرية أثبتت بالأدلة القاطعة الحد من مخاطر الأوعية الكبيرة.

لا تقم بتناول هذا الدواء إذا كانت تنطبق عليك أيا من هذه الحالات المذكورة أعلاه. إذا كنت غير واثق، تحدث إلى طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعامل معه قبل تناول هذا الدواء.

ينبغي توخي الحذر عند تناول أقراص "جليـم"

فضلا قم بمراجعة طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعامل معه قبل تناولك لهذا الدواء في الحالات الآتية:

- إذا كنت تتعافى من إصابة بجرح، عملية جراحية، عدوى مصحوبة بحمى أو من أي شكل من أشكال الإجهاد، أخبر طبيبك لأنه قد يجد أنه من الضروري تغيير العلاج بشكل مؤقت.
- إذا كنت مصابا باضطراب حاد بالكبد أو الكلى.
- إذا كنت غير متأكد من مدى تطابق هذه الحالات مع حالتك، تحدث إلى طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعامل معه قبل تناول هذا الدواء.

في حالة المرضى الذين يعانون من نقص إنزيم جلوكوز- 6- فوسفات ديهيدروجينيز، قد يحدث انخفاض في مستوى الهيموجلوبين وتكسر لخلايا الدم الحمراء (فقر الدم الإنحلالي) عند تناولهم "**جليـم**".

المعلومات المتاحة حول استخدام عقار "**جليـم**" لمن هم أقل من 18 سنة معلومات محدودة، لذا لا يوصى باستخدامه في حالة المرضى من هذه الفئة العمرية.

معلومات هامة عن نقص مستوى السكر في الدم

عند تناولك لأقراص "**جليـم**" فإنه من الممكن أن تصاب بانخفاض مستوى السكر بالدم (الهيبوجلايسيميا). فضلا انظر أدناه لمعلومات إضافية حول الهيبوجلايسيميا، علاماتها وعلاجها.

العوامل الآتية من الممكن أن تزيد من خطورة التعرض لإصابتك نقص مستوى السكر في الدم:

- سوء التغذية، عدم انتظام وقت الطعام، فقدان أو تأخير وجبة أو الامتناع عن الطعام لفترات طويلة.
- تغيرات في نظام أكلك.
- تناولك لعقار "**جليـم**" بجرعة أكبر مما تحتاج.
- إصابتك بقصور في وظائف الكلى.
- إصابتك بمرض شديد بالكبد.
- إذا كنت تعاني من اضطرابات خاصة بسبب الهرمونات (مثل اضطرابات الغدة الدرقية، الغدة النخامية أو القشرة الكظرية).
- شرب الكحوليات (خاصة في حالة فقدان وجبة الطعام).
- تناول بعض الأدوية الأخرى (انظر فقرة تناول أدوية أخرى أدناه).
- عند قيامك بالتمارين البدنية بشكل زائد وعدم الأكل بشكل كافٍ أو تناول طعام يحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات.

علامات نقص مستوى السكر في الدم تشمل:

- قرصات الجوع، صداع، غثيان، قيء، خمول، نعاس، اضطراب في النوم، عدم ارتياح، عدوانية، عدم تركيز، قلة الانتباه و بطء رد الفعل، اكتئاب، ارتباك، اضطرابات في الرؤية و الكلام، تلعثم بالكلام، ارتجاف، شلل جزئي، اضطرابات الحواس، دوار،اليأس.
- من الممكن أيضا ظهور بعض العلامات الآتية: عرق، رطوبة الجلد، قلق، سرعة ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، خفقان القلب، ألم شديد مفاجيء بالصدر من الممكن انتشاره في المناطق المجاورة (الذبحة الصدرية وعدم انتظام ضربات القلب).

ولو استمر مستوى السكر بالدم في الهبوط ربما تعاني من ارتباك ملحوظ (هذيان)، حدوث تشنجات، فقدان السيطرة على النفس، ربما تصاب بضعف في التنفس وبطء في ضربات القلب، وربما تفقد الوعي.

الحالة السريرية للانخفاض الحاد لمستوى السكر بالدم ربما تشبه الحالة السريرية للسكتة الدماغية.

علاج نقص مستوى السكر في الدم

غالبا ما تزول علامات انخفاض مستوى السكر بالدم لديك بسرعة عند تناولك للسكر مثل مكعبات السكر، عصير محلى بالسكر أو شاي محلى بالسكر، لذا ينبغي عليك الاحتفاظ دائما بالسكر معك (مثل مكعبات السكر على سبيل المثال).

تذكر أن المحليات الصناعيه لا تكون فعالة. رجاء تواصل مع طبيبك أو اذهب إلى المستشفي في حالة عدم تحسنك عند تناولك للسكر أو في حالة رجوع الأعراض مرة أخرى.

الاختبارات المخبرية:

يجب التحقق من مستوى السكر لديك في الدم أو البول بصفة منتظمة. ربما يلجأ طبيبك إلى إجراء فحص الدم لديك لقياس مستويات خلايا الدم ووظائف الكبد.

في حال تناول أدوية أخرى

رجاء أخبر طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعامل معه في حالة تناولك مسبقا أوحديثا لأي أدوية أخرى، بما فيها الأدوية التي تتناولها بدون وصفة طبية.

إذ ربما يلجأ طبيبك إلى تغيير جرعة عقار"**جليـم**" التي تتناولها في حالة تناوله بالتزامن مع أدويه أخرى قد تتسبب في تقليل أو زيادة تأثير عقار "**جليـم**" على مستوى السكر في الدم لديك.

الأدويه الآتية تزيد من تأثير عقار"**جليـم**" على تقليل مستوى السكرفي الدم. هذا قد يؤدي إلى خطر الإصابة بنقص مستوى السكر في الدم:

- مستحضرات طبية أخرى لعلاج مرض السكري (مثل الإنسولين أو الميتفورمين).
- مستحضرات طبية لعلاج الألم والالتهاب (فينيل بيوتازون، أزوبروبازون، أوكسيفين بيوتازون، الأدوية المشابه للأسبرين).
- مستحضرات طبيه لعلاج عدوى الجهاز البولي (مثل بعض السلفوناميدات طويلة المفعول).
- مستحضرات طبيه لعلاج العدوى البكتيريه والفطرية (تتراسكلين، كلورا مفينيكول،فلوكونازول، ميكونازول، الكينولونز، كلاريثرومايسين).
- مستحضرات طبيه لتثبيط تجلط الدم (مشتقات الكومارين مثل الوارفارين).
- مستحضرات طبية لدعم بناء العضلات (المواد البنائية).
- مستحضرات طبية لعلاج نقص هرمونات الذكورة.
- مستحضرات طبية لعلاج الاكتئاب (فلوكستين، مثبطات إنزيم أحادي أمين الأوكسيد).
- مستحضرات طبية لتقليل مستوى الكوليستيرول العالي (الفايبرات).
- مستحضرات طبية لتقليل ضغط الدم المرتفع (مثبطات إنزيم المحول للأنجيوتنسين).
- مستحضرات طبية لعلاج النقرس (ألوبيورينول، بروبينسيد، سلفين بيرازون).
- مستحضرات طبية لعلاج السرطان (سيكلوفوسفاميد، إيفوسفاميد، تروفوسفاميد).
- مستحضرات طبية لإنقاص وزن الجسم (فينفلورامين).
- مستحضرات طبية تستخدم لزيادة دورة الدم عندما تعطى بجرعة عالية عن طريق التسريب بالوريد (بنتوكسيفيللين).
- مستحضرات طبية لعلاج حساسية الأنف مثل حمى القش (ترايتوكوالين).
- مستحضرات طبية تسمى مبطلات تأثير الجملة العصبية الودية تستخدم لعلاج ضغط الدم المرتفع، فشل القلب، أو أعراض البروستاتا.

الأدويه الآتية ربما تتسبب في تقليل فاعلية أقراص"**جليـم**" على إنقاص مستوى السكر بالدم. ذلك قد يؤدي إلى خطر زيادة مستوى السكر في الدم:

- عقاقير طبية تحتوي على هرمونات الجنسية الأنثوية (الإستروجين، البروجيستيرون).
- عقاقير طبية تساعد على زيادة إدرار البول (مدرات البول من مجموعة ثيازايد).
- عقاقير طبية تستخدم لتنشيط الغدة الدرقية (مثل ليفوثيروكسين).
- عقاقير طبية تستخدم لعلاج الحساسية والالتهاب (جلوكوكورتيكويد).
- عقاقير طبية تستخدم لعلاج الاضطرابات الذهنية الحادة (كلوربرومازين و مشتقات اخرى من فينوثيازين).
- عقاقير طبية تستخدم لتزيد من ضربات القلب وتعالج الربو أو احتقان الأنف والسعال ونزلات البرد وتستخدم لإنقاص الوزن أو تستخدم في حالات الطوارئ التي تهدد الحياة (أدرينالين والمنشطات السيمبثاوية).
- عقاقير طبية لعلاج مستوى الكوليسيترول المرتفع (حمض نيكوتينك).
- عقاقير طبية لعلاج الإمساك عندما تستخدم لفترة طويلة (الملينات).
- عقاقير طبية لعلاج نوبات الصرع (فينيتوين).
- عقاقير طبية لعلاج التوتر العصبي ومشاكل النوم (الباربتيورات).
- عقاقير طبية لعلاج زيادة الضغط في العين(اسيتازولاميد).
- عقاقير طبية لعلاج ضغط الدم المرتفع أو إنقاص سكر الدم (ديازوكسيد).
- عقاقير طبية لعلاج العدوى والسل (ريفامبيسين).
- عقاقير طبية لعلاج النقص الحاد لمستوى السكر بالدم (جلوكاجون).

الأدويه الآتية يمكنها زيادة أو تقليل فاعلية عقار "**جليـم**" في إنقاص مستوى السكر بالدم:

- عقاقير طبية تستخدم لعلاج تقرحات المعدة (تسمى مضادات الهستامين H2).
- عقاقير طبية تستخدم لعلاج ضغط الدم المرتفع أو فشل القلب مثل مثبطات بيتا ،كلونيدين، جوانيثيدين، وريسيربين. هذه الأدوية يمكنها أيضا إخفاء أعراض هبوط السكر في الدم، لذلك يجب توخي الحذر عند تناول هذه الأدوية.

كولسيفيلام، مستحضر يستخدم لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، ويؤثر على امتصاص **جليـم**، لتجنب هذا التأثير تناول **جليـم** قبل تناول كولسيفيلام على الأقل ب 4 ساعات.

عقار"**جليـم**" من الممكن أن يتسبب في زيادة أو نقص مفعول الأدوية الآتية:

- العقاقير الطبية التي تستخدم لتثبيط تجلط الدم (مشتقات الكومارين مثل الوارفارين).

تناول عقار"جليـم"مع الطعام والشراب.

تناول الكحول ربما يتسبب في زيادة أو إنقاص فاعلية عقار"**جليـم**" في تقليل مستوى السكر في الدم بطريقة لا يمكن التنبؤ بها.

الحمل والرضاعة

الحمل

عقار"**جليـم**" يجب ألا يستخدم خلال فترة الحمل. أخبري طبيبك إذا كنت حامل، أو تعتقدين أنه من المحتمل أن تكوني حاملا أو تخططين لأن تكوني حاملا.

الرضاعة

قد يمر عقار"**جليـم**" إلى لبن الأم. عقار "**جليـم**"يجب ألا يستخدم خلال فترة الرضاعة. اسألي طبيبك أو الصيدلي للنصيحة قبل تناول أي دواء.

الأطفال والمراهقين

جليم لاينصح أن يستخدم في الأطفال أقل من 18 عاما.

القيادة واستخدام الآلات

القدرة على التركيز ورد الفعل لديك قد تنخفض إذا كان مستوى السكر في الدم عندك منخفض، أو مرتفع أو ربما تتطور إلى مشاكل في الرؤية نتيجة لتلك الحالات، .يجب أن تاخذ في اعتبارك أنك قد تضع نفسك والآخرين في خطر(مثلا عند قيادة السيارة أو استخدام الآلات). رجاء اسأل طبيبك إذا كنت تستطيع قيادة السيارة في الحالات الآتية:

- تصاب بنوبات متكررة من هبوط مستوى السكر في الدم.
- تعاني من ضعف أو انعدام التمييز لعلامات هبوط مستوى السكر في الدم.

معلومات هامة عن بعض مكونات عقار "جليـم"

عقار "**جليـم** "يحتوي على اللاكتوز. لو أخبرك طبيبك بأنك لا تستطيع تحمل بعض السكريات، تواصل مع طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

3. كيفية تناول عقار "جليـم"

قم دائما بتناول عقار "**جليـم**"تماما كما أخبرك طبيبك المعالج. إذا كنت غير واثق من طريقة تناول هذا الدواء يجب عليك أن تراجع طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعامل معه.

طريقة تناول هذا الدواء

- تناول هذا الدواء عن طريق الفم، مباشرة قبل أو مع أول وجبة رئيسية في اليوم. في حالة عدم تناولك لوجبة الإفطار يجب عليك تناول هذا الدواء حسب الجدول الزمني الموصوف لك من قبل الطبيب. من الضروري عدم تفويت أي وجبة مادمت مستمرا على تناول عقار"**جليـم**".
- قم بابتلاع القرص كاملا مع على الأقل نصف كوب من الماء. لا تقم بتكسير أو مضغ القرص قبل ابتلاعه.

الجرعة

جرعة عقار"**جليـم**" تعتمد على حالتك، ظروفك ونتائج اختبارات مستوى السكر في الدم والبول المقررة من قبل طبيبك المعالج. لا تقم بتناول جرعة أكثر من تلك الموصوفة لك من قبل الطبيب المعالج.

- الجرعة المبدئية عادة ما تكون قرص واحد من"**جليـم 1** ملجم" مرة واحدة يوميا.
- في حالة الضرورة قد يقوم طبيبك المعالج بزيادة الجرعة بعد كل 1-2 أسبوع من العلاج.
- أعلى جرعة يمكن وصفها في اليوم 6 ملجم من عقار"**جليـم**".
- من الممكن البدء بجرعة مركبة من جليميبرايد مع ميتفورمين أو **جليـم**بريد مع إنسولين. في هذه الحالة سيقوم طبيبك المعالج بتحديد الجرعات المناسبة لك من جليميبرايد، ميتفورمين أو الإنسولين كل على حدة.
- قد يتطلب تغير جرعة عقار"**جليـم**" في حالات معينة مثل: تغير وزنك أو تغيرنمط حياتك أو ظروف تسبب لك التوتر العصبي، لذلك يجب عليك أن تخبر طبيبك المعالج.
- في حالة شعورك بقوة أو ضعف تأثير هذا الدواء عليك لا تقم بتغير الجرعة من تلقاء نفسك ولكن يجب عليك سؤال الطبيب.

في حالة تناول جرعة زائدة من عقار"جليـم"

في حالة تناولك لكمية كبيرة أو جرعة إضافية من عقار "**جليـم**" سيكون هناك خطورة للإصابة بهبوط السكر بالدم (لمعرفة علامات هبوط السكر بالدم انظر القسم 2- ينبغي توخي الحذر عند تناول أقراص "**جليـم**") لذلك يجب عليك فورا تناول كمية كافية من السكر(على سبيل المثال قالب صغير من مكعبات السكر، عصير محلى بالسكر، شاي محلى بالسكر)، وقم بإخبار الطبيب في الحال.

عند معالجة حالة هبوط مستوى السكر في الدم لدى الأطفال نتيجة تناول جرعة زائدة من الدواء عن طريق الخطأ يجب الحرص على التحكم في كمية السكر المعطاة للطفل لتجنب حدوث ارتفاع خطير في مستوى السكر بالدم.

في حالة غياب الشخص عن الوعي يجب تجنب إعطاؤه الطعام أو الشراب.

نظرا لاحتمالية استمرار حالة هبوط مستوى السكر في الدم لبعض الوقت يجب مراقبة المريض بحرص لتجنب وجود المزيد من الخطر.على سبيل الاحتياط ربما يكون من الضروري احتجاز المريض بالمستشفي. يجب عرض ما تبقى من الأقراص داخل العلبة ليتمكن الطبيب من معرفة ما تم تناوله من الدواء.

الحالات الحادة من هبوط مستوى السكرالمصحوبة بفقدان للوعي وقصور حاد في الجهاز العصبي هي حالات طارئة وتتطلب تدخل طبي سريع واحتجاز المريض داخل المستشفي. لذا يجب التأكد من وجود شخص يعرف مسبقا تاريخ الحالة ليستطيع إبلاغ الطبيب في حالة الطوارئ.

في حالة نسيان تناول عقار"جليـم"

في حالة نسيانك لتناول جرعة عقار"**جليـم**" الخاصة بك، لا تقم بتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المفقودة.

في حالة التوقف عن تناول عقار"جليـم"

في حالة الانقطاع أو التوقف عن تناول الدواء يجب أن تعلم بأن تأثير الدواء في الحصول على المستوى المطلوب للسكر بالدم لن يتحقق أو أن الحالة المرضية ستتدهور مرة أخرى. لذا يجب الحرص على تناول عقار"**جليـم**" ولا تتوقف إلا حسب تعليمات الطبيب.

اذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استخدام هذا الدواء، فضلا اسأل طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعامل معه.

4. الأعراض الجانبية المحتملة

كما هو شأن جميع الأدوية يمكن أن يسبب عقار"**جليـم**" تأثيرات جانبية، ولو أن تلك التأثيرات لا تحدث لكل من يتناول الدواء.

أخبر طبيبك المعالج فورا إذا شعرت بأي من الأعراض الآتية:

- تفاعلات الحساسية (تشمل التهاب الأوعية الدموية وغالبا ما يصاحبها طفح جلدي) والتي قد تتطور إلى تفاعلات خطيرة يصاحبها صعوبة في التنفس وهبوط في ضغط الدم وأحيانا تتطور إلى صدمة.
- خلل في وظائف الكبد وتشمل اصفرار الجلد والعينين (الصفراء) وقصور في تدفق الصفراء (ركود الصفراء) والتهاب في الكبد (الالتهاب الكبدي) أو الفشل الكبدي.
- فرط الحساسية في الجلد مثل الحكة والطفح الجلدي وزيادة الحساسية للشمس. يمكن تطور بعض حالات الحساسية الخفيفة إلى تفاعلات خطيرة.
- حالات الهبوط الحاد لمستوى السكر في الدم والتي تشمل فقدان الوعي والتشنج أو الغيبوبة.

بعض المرضى قد عانوا من الآثار الجانبية مع تناولهم لعقار "**جليـم**" ومنها:

آثار جانبية نادرة (تصيب أكثر من مريض واحد لكل 10،000 شخص وأقل من مريض واحد لكل 1000 شخص).

- هبوط مستوى السكر في الدم (هيبوجلايسميا) (انظر القسم 2- ما يجب مراعاته قبل تناول أقراص "**جليـم**").
- نقص في عدد خلايا الدم التالية:
  - الصفائح الدموية (والتي قد تزيد من خطورة الإصابة بالنزيف).
  - خلايا الدم البيضاء (والتي تزيد من خطر الإصابة بالعدوى).
  - خلايا الدم الحمراء (والتي تسبب شحوب الجلد وتسبب الضعف أو عدم التنفس بارتياح).

هذه الأعراض عامة تتحسن بعد التوقف عن تناول عقار"**جليـم**".

هناك أعراض جانبية نادرة جدا (تصيب أقل من مريض واحد لكل 10،000شخص)

- تفاعلات الحساسية (تشمل التهاب الأوعية الدموية وغالبا ما تكون مصحوبة بطفح جلدي) والتي قد تتطور إلى صعوبة التنفس وهبوط في ضغط الدم وأحيانا تتطور إلى صدمة. في حالة شعورك بأي من هذه الأعراض، أخبر طبيبك المعالج فورا.
- خلل في وظائف الكبد وتشمل اصفرارالجلد والعينين (الصفراء) وقصور في تدفق الصفراء (ركود الصفراء) والالتهاب الكبدي أو الفشل الكبدي. في حالة شعورك بأي من هذه الأعراض أخبر طبيبك المعالج فورا.
- الشعور بالإعياء والإسهال والشعور بالامتلاء أو الانتفاخ وألم في البطن.
- نقص مستوى الصوديوم في الدم (يتم الكشف عنه عن طريق اختبارات الدم).

آثار جانبية أخرى وتشمل:

- حساسية الجلد مثل الحكة والطفح الجلدي والشرى وزيادة الحساسية للشمس. يمكن لبعض تفاعلات الحساسية الخفيفة أن تتطور إلى مشاكل في البلع أو التنفس وتورم في الشفتين والحلق أو اللسان. لذلك في حال حدوث أي من هذه الأعراض، أخبرطبيبك المعالج فورا.
- قد تحدث تفاعلات فرط تحسس أحيانا من مركبات السلفونيل يوريا، السلفوناميدات، أو بعض الأدويه المقاربة لها).
- قد تحدث لديك مشاكل في الرؤية في بداية تناول عقار"**جليـم**". ذلك نتيجة حدوث تغييرات في مستوى السكر، في الحالات الطبيعية تزول هذه المشاكل سريعا.
- زيادة في إنزيمات الكبد.
- نزيف شديد غير معتاد أو كدمات تحت الجلد.

إذا لاحظت أن أيا من هذه الآثار الجانبية أصبح جسيما، أو إذا لاحظت ظهور أي أعراض جانبية لم ترد في هذه النشرة فإنه يرجى أن تخبر طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعامل معي بشأنها.

تجربة مابعد التسويق:

نقص الصفائح الدموية (بما في ذلك الحالات الشديدة والتي يقل فيها العدد عن µL / 10.000) ونقص الصفائح الدموية الفرفرية.

5. كيفية حفظ أقراص "جليـم"

يحفظ بعيدا عن متناول ونظر الاطفال.

لا تستعمل أقراص "**جليـم**" بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة والشريط. تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى آخر يوم في الشهر المذكور في تاريخ انتهاء الصلاحية.

لا يحفظ في درجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية.

يحفظ في العبوة الأصليه.

6. معلومات أخرى

محتويات أقراص "**جليـم**"

- المادة الفعالة هي جليميبرايد بتركيز 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 6 ملليجرام في كل قرص.
- مكونات أخرى وهي:

أقراص جليـم 1 ملجم: لاكتوز BP 200، جليكولات نشا الصوديوم، ستيارات ماغنسيوم و بوفيدون K-30، أفيسيل PH 101 وأكسيد الحديد الأصفر.

أقراص جليـم 2 ملجم: لاكتوز BP 200، جليكولات نشا الصوديوم، ستيارات ماغنسيوم و بوفيدون K-30، أفيسيل PH 101 وسبكتراكول أزرق لامع LK 815030 وأكسيد الحديد الأصفر.

أقراص جليـم 3 ملجم: لاكتوز BP 200، جليكولات نشا الصوديوم، ستيارات ماغنسيوم و بوفيدون K-30، أفيسيل PH 101 وأكسيد الحديد الأحمر.

أقراص جليـم 4 ملجم: لاكتوز BP 200، جليكولات نشا الصوديوم، ستيارات ماغنسيوم و بوفيدون K-30، أفيسيل PH 101 وسبيكتراكول أزرق لامع LK 815030.

أقراص جليـم 6 ملجم: لاكتوز BP 200، جليكولات نشا الصوديوم، ستيارات ماغنسيوم و بوفيدون K-30، أفيسيل PH 101.

شكل أقراص "جليـم" ومحتويات العبوة

تتوفر أقراص "**جليـم**" على شكل شرائط داخل عبوة، وتحتوي كل عبوة على 30 قرص.

أقراص جليـم 1 ملجم :أقراص بلون أصفر فاتح متماثلة إلى مرقشة الشكل بيضاوية مشطوفة الحواف.القرص غير مغلف مع وجود خط للكسر على أحد الجانبين و حفر برقم 15 على الجانب الآخر.

أقراص جليـم 2 ملجم :أقراص بلون أخضر فاتح متماثلة إلى مرقشة الشكل بيضاوية مشطوفة الحواف.القرص غير مغلف مع وجود خط للكسر على أحد الجانبين و حفر برقم 16 على الجانب الآخر.

أقراص جليـم 3 ملجم :أقراص بلون أحمر فاتح متماثلة إلى مرقشة الشكل بيضاوية مشطوفة الحواف.القرص غير مغلف مع وجود خط للكسر على أحد الجانبين و حفر برقم 17 على الجانب الآخر.

أقراص جليـم 4 ملجم :أقراص بلون أزرق فاتح متماثلة إلى مرقشة الشكل بيضاوية مشطوفة الحواف.القرص غير مغلف مع وجود خط للكسر على أحد الجانبين و حفر برقم 18 على الجانب الآخر.

أقراص جليـم 6 ملجم :أقراص بيضاء إلى مستطيلة مستقيمة ،مشطوفة الحواف غير مغلفة مع وجود خط للكسر على أحد الجانبين وحفر برقم "10" على الجانب الآخر.

مالك الحقوق التسويقية و المصنع
الدوائية
مصنع الأدوية بالقصيم
المملكة العربية السعودية

تم الموافقة على هذه النشرة بتاريخ يوليو 2018. **النسخة:1.**

"**جليـم**"علامة تجارية
34GI689

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية

- المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية:
فاكس: 2057662 11 966+
للإتصال بالإدارة التنفيذية للتيقظ و إدارة الأزمات.
هاتف: 2038222 11 966+ تحويلة: 2340-2353-2356-2317-2345-2334
الهاتف المجاني:8002490000
البريد الالكترونى: npc.drug@sfda.gov.sa
الموقع الالكترونى: www.sfda.gov.sa/npc

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب
واتحاد الصيادلة العرب