

لورينزين

نشرة العبوة: معلومات لمستخدم الدواء

لورينزين

لوراتادين وكبريتات السودايفيدرين

اقرأ كل ما هذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ بتناول هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، اسأل طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعامل معه.
- هذا الدواء تم وصفه خصيصاً لك (أو لطفلك). لا تعطيه للآخرين. فقد يضرهم حتى لو كانت أعراضهم هي نفس أعراضك.
- إذا لاحظت أن أيا من الآثار الجانبية لهذا الدواء أصبحت جسيمة، أو لاحظت ظهور أي أعراض جانبية تم ترد في هذه النشرة، فضلاً أخبر طبيبك المعالج أو الصيدلي الذي تتعامل معه.

هذه النشرة تحتوي على ما يلي:

1. ما هو لورينزين وفيه يستخدم.
2. ما يجب مراعاته قبل استخدام لورينزين.
3. كيفية تناول لورينزين.
4. الأعراض الجانبية المحتملة الحدوث.
5. كيفية حفظ لورينزين.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو لورينزين وفيه يستخدم

لورينزين هو مستحضر دوائي يحتوي على مادتين فعالتين هما: لوراتادين وسودايفيدرين. لوراتادين هو مضاد للهستامين قوي طويل المفعول ثلاثي الحلقة له تأثير اختياري مضاد لمستقبلات H1 الظرفية. أما كبريتات السودايفيدرين، فهو واحد من فلويدات الإيفيدرا الموجودة في الطبيعة وهو مضيئ للأوعية الدموية يعطي بالقم، وينتج عنه أثر تدريجي مزيل للاحتقان ولكنه ممنع، فيسهل انكماش الغشاء المخاطي المحققن في مناطق الجهاز التنفسي العليا. ويتم إزالة الاحتقان من الغشاء المخاطي للسبيل التنفسي من خلال مفعوله على الأعصاب الودية (السمبثاوية).

لورينزين يخفف من الأعراض المصاحبة لحساسية الأنف (حى القش) مثل:

- احتقان الأنف والجيوب الأنفية.
- العطس.
- سيلان الأنف.
- حكة في العيون مع زيادة الدموع.

لورينزين يحتوي على مزيج من دوائين هما: لوراتادين (مضاد للهستامين) و سودايفيدرين (مزيل للاحتقان).

مضادات الهيستامين تساعد على تقليل أعراض الحساسية بمنع تأثير مادة تسمى الهيستامين. ينتج الهيستامين في الجسم كرد فعل لوجود أجسام غريبة يتحسس لها الجسم. مزيلات الاحتقان تقوم بتضييق الأوعية الدموية. وهذا يؤدي إلى تصفية الأنف غير جيدة التهوية أو المسدودة.

قد يقوم طبيبك المعالج أو الصيدلي بوصف لورينزين لسبب آخر. اسأل طبيبك المعالج أو الصيدلي إذا كانت لديك أي أسئلة حول سبب وصف لورينزين لك.

2. ما يجب مراعاته قبل تناول لورينزين

لا تتناول لورينزين في الحالات الآتية:

- إذا كنت مصاباً بالحساسية تجاه لورينزين أو أي من المكونات المذكورة في نهاية هذه النشرة.

لا تتناول لورينزين إذا كان لديك حالياً أو مسبقاً أي من الحالات الطبية الآتية:

- المياه الزرقاء.
- صعوبة في التبول.
- ارتفاع شديد في ضغط الدم.
- أمراض الأوعية الدموية الشديدة.
- فرط نشاط الغدة الدرقية.

لا تقم بتناول لورينزين إذا كنت حالياً تتناول أو مارلت في خلال 14 يوم من التوقف عن تناول مثبطات أو كسبيديز أحادي الأمين وهي أدوية تستخدم في علاج الاكتئاب.

بالنسبة ل لورينزين أقراص:

لا تعطي لورينزين أقراص إلى الأطفال الأقل في العمر من 12 سنة.

بالنسبة ل لورينزين شراب:

لا تعطي لورينزين شراب إلى الأطفال الأقل في العمر من 6 سنوات.

لا تتناول لورينزين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المطبوع على العبوة.

لا تتناول لورينزين إذا كانت العبوة مزمرة أو ظهر عليها علامات العيب.

قبل البدء في تناول هذا الدواء، أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كانت لديك حساسية من:

- أي أدوية أخرى.
- أي مكونات أخرى، مثل بعض أنواع الطعام أو المواد الحافظة أو الصبغات.

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك حالياً أو مسبقاً أي من الحالات الطبية، وبخاصة الآتي ذكرها:

- مشاكل في العين (مثل ارتفاع ضغط العين أوالمياه الزرقاء).
- قرحة المعدة.
- انسداد معوي.
- البروستاتا أومشاكل المثانة البولية.
- مرض في القلب.
- مرض السكري.

- إذا كنت تبلغ من العمر 60 سنة أو أكثر، وذلك لأن كبار السن قد يكونوا أكثر حساسية لتأثيرات هذا الدواء.

إذا كنت لم تجرب طبيبك المعالج أو الصيدلي عن أي من الأعراض السابقة، أخبرهم قبل تناول لورينزين.

يعتبر السودايفيدرين المتواجد في لورينزين كمنشط من قبل الهيئات الرياضية. لا ينصح باستخدامه في الرياضيين المتنافسين.

تتناول أدوية أخرى

أخبر طبيبك المعالج أو الصيدلي إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى، وذلك يتضمن الأدوية اللاوصفية التي قمت بشرائها من الصيدلية أو من السوق المركزي أو من متجر الأغذية الصحية.

بعض الأدوية لا يجب تناولها مع لورينزين. وذلك يتضمن:

- أدوية القلب وضغط الدم.
- مثبطات أو كسبيديز أحادي الأمين، والأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب.
- مضادات الحموضة.
- كاؤولين.

هذه الأدوية من الممكن أن تتأثر ب لورينزين، أو من الممكن أن تؤثر على كيفية عمله. من الممكن أن تحتاج إلى جرعات مختلفة من الدواء الخاص بك، أو من الممكن أن تحتاج إلى تناول أدوية مختلفة. سوف يقوم بصحبتك طبيبك المعالج أو الصيدلي.

تتناول لورينزين مع الطعام

لا يهم تناول لورينزين قبل أو بعد الطعام.

الحمل والرضاعة

لا تتناولي الدواء إذا كنت حاملاً أو تقومين بالرضاعة الطبيعية إذا لم تقومين بمناقشة المخاطر والفوائد المتضمنة مع طبيبك أو الصيدلي.

القيادة واستخدام الآلات

كن متأكداً من معرفتك عن مدى رد فعلك تجاه لورينزين قبل قيادتك للسيارة أو تشغيل الماكينات، من غير المرجح أن يتسبب لك لورينزين في النعاس. إذا كنت في حالة من النعاس، لا تقود السيارة أو تقوم بالعمل مع الآلات.

3. كيفية تناول لورينزين

بالنسبة ل لورينزين أقراص:

الجرعة الموصى بها من لورينزين أقراص في البالغين والأطفال أكبر من 12 سنة هي قرص واحد كل 12 ساعة.

لا يستخدم في الأطفال الأقل في العمر من 12 سنة.

قم ببلع القرص بالكامل مع كوب من الماء. لا تقم بسحق أو كسر أو وضع القرص قبل بلعه.

بالنسبة ل لورينزين شراب:

البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6-12 سنة (وزن الجسم أكثر من 30 كجم): تكون الجرعة هي 5 مل (ملعقة صغيرة واحدة) مرتين يومياً (كل 12 ساعة).

لا تعطي للأطفال الأقل في العمر من 6 سنوات.

استشر طبيبك المعالج إذا لم تتحسن لديك الأعراض خلال 7 أيام أو إذا كانت الأعراض مصحوبة بحمي.

تأكد من تناول لورينزين بالظبط كما اخبرك طبيبك أو الصيدلي.

إذا لم تقم باتباع تعليماتهم، قد لا تتعافى من أعراضك.

لا تقم بتناول لورينزين أكثر مما أوصي به طبيبك أو الصيدلي.

إذا نسيت أن تتناول لورينزين

إذا كان الوقت هو تقريبا وقت الجرعة التالية، قم بنخطي الجرعة التي نسيتهها وقم بتناول الجرعة التالية في وقتها.

خلاف ذلك، تناول الجرعة حالما تتذكر، وبعد ذلك قم بتناول دوائك كالمعتاد. لا تقم بتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة النسيية.

إذا تناولت لورينزين أكثر مما يجب (جرعة مفرطة)

اتصل في الحال بطبيبك للاستشارة أو توجه إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى، إذا اعتقدت أنك أنت أو أي شخص آخر قد تناول الكثير من لورينزين. قم بذلك حتى ولو لم تظهر أي أعراض من عدم الراحة أو التسمم. فقد تكون هناك حاجة إلى رعاية طبية عاجلة.

أثناء تناولك لورينزين

أشياء من الواجب أن تفعلها

أخبر جميع الأطباء وأطبآء الأسنان والصيدالة الذين يقومون بعلاجك أنك تتناول لورينزين.

أخبري طبيبك أو الصيدلي في حالة ما أصبحت حاملاً أثناء تناولك لورينزين.

أشياء من الواجب أن تفعلها

لا تقم بإعطاء لورينزين لأي شخص آخر، حتى ولو تشابهت أعراضهم مع أعراضك.

لا تستخدمه في علاج أي شكاي أخرى إذا لم يقل طبيبك أو الصيدلي ذلك.

توقف عن تناول لورينزين 48 ساعة قبل إجراء أي اختبار جلدي للحساسية.

مضادات الهيستامين من الممكن أن تتداخل مع نتائج الاختبارات الجلدية.

4. الأعراض الجانبية محتملة الحدوث

أخبر طبيبك أو الصيدلي في أقرب وقت ممكن إذا لم تشعر أنك على ما يرام أثناء تناولك لورينزين.

يساعد لورينزين معظم الناس المصابين بالحساسية، ولكن من الممكن أن يكون له بعض الآثار الغير المرغوب فيها في بعض الناس.

مثل باقي الأدوية، من الممكن أن يتسبب لورينزين في بعض الآثار الجانبية. في حالة ظهورها، فهي في الأغلب تكون ثانوية ومؤقتة. ومع ذلك، من الممكن أن يكون بعض منها خطير ويحتاج إلى الرعاية الطبية.

معظم الآثار الجانبية الغير مرغوب فيها الملحوظة مع لورينزين تكون خفيفة إلى متوسطة. وتتضمن:

- مشاكل في النوم.

- جفاف الفم.

- الصداع.

- النعاس.

- الاضطراب.

- الدوخة.

- التعب.

من الممكن أن تظهر آثار جانبية أخرى غير مرغوب فيها في بعض الناس ممن يتناولون لورينزين.

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا قمت بملاحظة أي آثار أخرى.

لا تتزعج من هذه القائمة من الآثار الجانبية المحتملة الحدوث.

فقد لا يحدث لك أي منها.

5. كيفية حفظ لورينزين

بالنسبة ل لورينزين أقراص:

قم بحفظ الأقراص في العبوة الخاصة بها في مكان جاف حتي ميعاد تناولها.

إذا قمت بأخذ الأقراص خارج العبوة فهذا قد يتسبب في عدم حفظها جيداً.

لا تحفظ هذا الدواء في درجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية.

بالنسبة ل لورينزين شراب:

احفظ الزجاجة في مكان جاف وبارد.

لا تحفظ هذا الدواء في درجة حرارة أعلى من 30 درجة مئوية.

لا تقم بحفظ هذا الدواء أو أي أدوية أخرى في الحمام أو قرب المغسلة.

لا تقم بترك الدواء في السيارة في الأيام الحارة أو على حافة الشباك.

احفظ الأقراص بحيث لا يمكن للأطفال الوصول إليها.

سوف تنتهي صلاحية هذا الدواء بعد 30 يوماً من فتح العبوة للمرة الأولى.

إذا أخبرك طبيبك أو الصيدلي بأن تتوقف عن تناول لورينزين أو إذا تجاوزت الأقراص تاريخ الصلاحية، اسأل الصيدلي عما يجب القيام به مع الأقراص المتبقية.

6. معلومات اضافية

شكل لورينزين ومكونات العبوة

بالنسبة ل لورينزين أقراص

قرص لورينزين دائري، مشطوف الحافة، غير مصقول ذو طبقة ثنائية، مرقش على الجانب الوردي الملون، ومنقوش ب «115» و سطح أبيض عادي على الجانب الآخر.

عبوات الأقراص: 14 قرصاً لكل عبوة.

حاويات الأقراص: شرائط شفاقة حرارية من مادة البني في سي/ البني في دي سي مع غطاء من رقائق الألومنيوم الثابت.

بالنسبة ل لورينزين شراب

شراب عديم اللون إلى مصفر ذو طعم ورائحة الفواولة المميزة، خلي من أي مواد غريبة. عبوات الشراب: زجاجة كهرمانية اللون مزودة بغطاء مقاوم لعبت الأطفال سعة 100 مل/لي عبوة.

علام يحتوي لورينزين

بالنسبة ل لورينزين أقراص:

المادة الفعالة هي: لوراتادين 5 ملجم و كبريتات السودايفيدرين 120 ملجم.

المكونات الأخرى هي: لانتوز سريخ التلفق ان اف، هيدروكسي بروبيل ميثيل سيليلوز كيه- 4م، هيدروكسي بروبيل ميثيل سيليلوز كيه- 4م، براكربلين بوتاسيوم، ستيرات ماغنسيوم، فركتوز، بولي إيثيلين جلايكول 1500(اس بي)، إيدينات ثنائي

الصوديوم، حمض الستريك الالاماني، ستيرات صوديوم لامائية، بنزوات صوديوم، محلول سوريبيتول 70% غير ميلور، بروبيلين جلايكول، سائل نكهة الفواولة، سكر الوز و ماء منقي.

بالنسبة ل لورينزين شراب:

المادة الفعالة هي: لوراتادين 5 ملجم و كبريتات السودايفيدرين 60 ملجم.

المكونات الأخرى: فركتوز، بولي إيثيلين جلايكول 1500(اس بي)، إيدينات ثنائي الصوديوم، حمض الستريك الالاماني، ستيرات صوديوم لامائية، بنزوات صوديوم، محلول سوريبيتول 70% غير ميلور، بروبيلين جلايكول، سائل نكهة الفواولة، سكر الوز و ماء منقي.

المصنع و مالك الحقوق التسويقية

صنع بواسطة:

الدوائية

مصنع الأدوية بالفصيم

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

المملكة العربية السعودية

تمت الموافقة على هذه النشرة بتاريخ نوفمبر 2016.

«لورينزين» علامة تجارية

34LN688

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية

- المركز الوطني للتنظف والسلامة الدوائية:

فاكس: +966 11 2057662

للإتصال بالإدارة التنفيذية للتنظف و إدارة الأزمات.

هاتف: 11 2038222 +966 2356-2357-2317-2345-2334

2340

الهاتف المجاني: 8002490000

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.a.gov.sa

الموقع الإلكتروني: www.sfta.gov.sa/npc

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً لتعليمات يعرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

- الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغيه وضروه.

- لا تقم بتددة العلاج المحدد لك من تلقاء نفسك.

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

واتحاد الصيدالة العرب