

<b>نشرة العبوة: معلومات للمستخدم</b>
<b>أقراص كوزار® ١٠٠ ملغ المغلفة</b>
<b>لوسارتان البوتاسيوم</b>

**الرجاء قراءة هذه النشرة باكملها بعناية قبل تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة إليك**

– احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.

– اسأل الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة للحصول على المزيد من المعلومات.

– وُصِف هذا الدواء لك بشكل خاص. لا تُعطيه إلى شخص آخر، فقد يُضرره حتى لو كانت أعراضه تُشبه أعراضك.

– أخبر الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة إذا شعرت بأثار جانبية خطيرة أو إذا لاحظت أثارًا جانبية غير تلك المذكورة في هذه النشرة. راجع القسم 4.

**في هذه النشرة ما يلي:**

- ما هو كوزار وما هي دواعي استعماله
- ما يجب معرفته قبل تناول كوزار
- كيف تتناول كوزار
- الأثار الجانبية المحتملة
- كيف يُخزّن كوزار
- محتوى العبوة ومعلومات إضافية

**١- ما هو كوزار وما هي دواعي استعماله؟**

لوسارتان (كوزار) من الأدوية التي تُعرّف بمثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين الثاني. الأنجيوتنسين الثاني مادة يتم إنتاجها في الجسم، تتصلّق بالمستقبلات في الأوعية الدموية، ما يسبّب تضيقها ويؤدّي إلى ارتفاع في ضغط الدم. يمنع لوسارتان التصاق مادة الأنجيوتنسين الثاني بالمستقبلات، ما يؤدّي إلى استرخاء الأوعية الدموية التي، بدورها، تُخفّض ضغط الدم. يُعطى لوسارتان تدهور عمل الكلى لدى المرضى المُصابين بضغط دم مرتفع وبداء السكري من النوع الثاني.

يتم استخدام كوزار في الحالات التالية:

- معالجة المرضى المصابين بارتفاع في ضغط الدم بالنسبة إلى البالغين، الأطفال وبالنسبة إلى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و١٨ سنة.
- حماية الكلى لدى المرضى المصابين بداء السكري من النوع الثاني وبارتفاع في ضغط الدم، مع وجود أدلّة مخبرية عن تَعملّ وظيفة الكلى وبيلة بروتينية ≤ ٥٠٥ غ يومياً (في هذه الحالة، يحتوي البول على كمية بروتين غير طبيعية).
- لعلاج المرضى الذين يعانون من قصور القلب المزمن عند العلاج مع أدويه محددة تسمى مثبطات الانزيمات المحولة للانجيوتنسين (مثبطات ACE ، الأدوية المستخدمة لخفض ضغط الدم المرتفع) لا يعتبر مناسباً من قبل طبيبكِ. إذا كان فشل القلب الخاص بك قد استقرّ مع مثبطات ACE يجب ان لا يتم تبديله إلى لوسارتان.
- معالجة المرضى المُصابين بضغط دم مرتفع وتثخين البطين الأيسر، إذ أثبت أن كوزار يحثّ من خطر التعرّض لسكتة (مؤشر LIFE).

**٢- ما يجب معرفته قبل تناول كوزار**

**لا تتناول كوزار**

في الحالات التالية:

- لديك حساسية من مادة لوسارتان أو أي مكونات أخرى من أقراص كوزار (المدرجة في القسم ٦)
- إذا كنت حاملاً لأكثر من ثلاثة أشهر (كما من الأفضل تفادي تناول كوزار في بداية الحمل – راجع قسم الحمل)
- في حال وجود قصور حاد في وظيفة الكبد
- إذا كنت مصاباً بداء السكري أو تُعاني قصوراً في وظيفة الكلى وإذا كنت تتناول دواءً اسمه البيسكيرين لتخفيض ضغط الدم

**التحذير والوقاية**

إسأل الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة قبل تناول كوزار.

عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تَظُنّين أنك حامل (**أو قد تصبحين حاملاً**). لا يوصى بتناول كوزار في بداية الحمل ويجب عدم تناوله إذا كنت حاملاً لأكثر من ٣ أشهر، لأنه قد يُسبّب أذى خطيراً لجنينك في حال تناوله في هذه المرحلة (راجع قسم الحمل).

من المهم إبلاغ طبيبك قبل تناول كوزار في الحالات التالية:

- لديك تاريخ من الإصابة بوذمة وعائية (تورّم الوجه، والشفتين، والحنجرة، و/أو اللسان) (راجع أيضاً القسم ٤ "الأثار الجانبية المحتملة")
- إنّك مصاب بالتقيؤ أو الإسهال الحاد، مما يؤدّي إلى خسارة كبيرة للسوائل و/أو الأملاح في جسمك
- إنّك تتناول مدرّات البول (أدوية تزيد من كمية المياه التي تمرّ عبر الكلى) أو تتّبع حمية غذائية بلا ملح، ممّا يؤدّي إلى فقدان كبير للسوائل والأملاح في جسمك (راجع القسم ٣ "تحديد الجرعة بالنسبة إلى مجموعات مرضى خاصة")
- إنّك تعرف أنّ أو عيّتك الدموية المؤدية إلى الكلى ضئيلة أو مسدودة أو إذا حصلت مؤخراً على زرع كلى
- تَعملّ وظيفة الكبد (راجع القسم ٢ "لا تتناول كوزار " والقسم ٣ "تحديد الجرعة بالنسبة إلى مجموعات مرضى خاصة")
- تُعاني قصوراً في القلب مع أو بلا عجز في الكلى أو بالتزامن مع اضطراب النظم القلبي المَهدّد للحياة بشكل كبير. يجب إيلاء عناية خاصة عندما تتناول محصرات البِيتا (β–blocker) في الوقت نفسه.
- تُعاني مشكلة في صمام القلب أو عضلة القلب.
- تُعاني أمراض قلب ناجمة (بسبب انخفاض تدفّق الدم في أوعية الدم في القلب) أو أمراضاً وعائية دماغية (بسبب انخفاض دورة الدم في الدماغ)
- تُعاني فرط الألدوستيرونية الأولى (أحد اضطراب الغدة الكظرية حيث تقوم الغدة بإنتاج كمية كبيرة جدًا من هرمون الألدوستيرون، سببه خلل في الغدّة)
- إذا كنت تتناول أحد الأدوية التالية المستخدمة لمعالجة ارتفاع ضغط الدم:
  - مُثبّط إنزيم محوّل للانجيوتنسين (مثلاً، إينالابريل، ليزينابريل، راميبريل)، لا سيّما إذا كنت تُعاني مشاكل كلى سببها السكري
  - دواء إسمه البيسكيرين لتخفيض ضغط الدم
- قد يتأدك الطبيب من وظيفة الكلى، وضغط الدم، وكميّة الكتروليت (مثلاً البوتاسيوم) في دمك ضمن فترات منتظمة.
- راجع أيضاً المعلومات الواردة تحت عنوان **"لا تتناول كوزار"**.
- إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تزيد من مستوى البوتاسيوم في الدم (راجع القسم 2 " تناول كوزار مع أدوية أخرى").

**الأطفال والمراهقون**

تمّت دراسة كوزار لدى الأطفال. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بطبيبكِ.

لا يوصى بتناول كوزار للأطفال الذين يعانون قصوراً في الكلى أو في الكبد، بما أنّ المعلومات المتوفرة بشأن مجموعات المرضى هذه محدودة. ولا يوصى بتناول كوزار للأطفال دون السادسة من عمرهم، بما أنّه لم يُثبت أنّه فاعل بالنسبة إلى الفئة العمرية هذه.

**تناول كوزار مع أدوية أخرى**

أطلع الطبيب أو الصيدلي في حال كنت تتناول دواءً آخر، أو قد تتولّت دواءً مؤخراً، أو قد تتناول أي دواء آخر.

- أطلع الطبيب إذا كنت تتناول مكملات البوتاسيوم، وبدائل الملح التي تحتوي على البوتاسيوم ، والأدوية الموقرة للبوتاسيوم على غرار بعض مدرّات البول (أميلوريد، وتريلميتيرين، وسبيرونولاكتون) ، أو أدوية أخرى التي قد تزيد من مستوى البوتاسيوم في الدم (مثال الهيبارين، أدوية تحتوي على ثرايميتوريم) ، حيث لا ينصح بأخذها مع كوزار.
- إنبتة إذا كنت تتناول الأدوية التالية وأنت تتابع علاجاً بالكوراز:
- الأدوية الأخرى المخفّضة لضغط الدم بما أنّها تخفّض ضغط الدم بشكل أكبر.

- كما قد تخفّض الأدوية أو مجموعة الأدوية التالية ضغط الدم: مضادات الاكتئاب الثلاثيّة الحلقات، ومضادات الذاهان، وبلكولين ، وأميفوستين.
- مضادات التهاب لاسيترويدية مثّل إندوميثاسين، بما في ذلك مثبّطات كوكس 2 (cox–2–inhibitors) (أدوية تحدّ من الالتهاب ويمكن استخدامها من أجل التخفيف من الألم)، بما أنّها قد تحدّ من تأثير لوسارتان الذي يخفّض ضغط الدم.

قد يحتاج طبيبك إلى تبديل جرعتك و/أو أخذ إجراءات وقائية أخرى:
إذا كنت تتناول مُثبّط إنزيم محوّلًا لانجيوتنسين أو الألسكيرين (راجع أيضاً المعلومات تحت العنوانين "لا تتناول كوزار" و"التحذير والوقاية").

في حال عانت الكلى قصوراً، قد يؤدّي الاستخدام المتزامن لهذه الأدوية إلى تدهور عمل الكلى. يجب عدم تناول الأدوية التي تحتوي على الليثيوم مع لوسارتان، من دون مراقبة عن كثب من الطبيب. قد تكون الإجراءات الوقائية الخاصة ملائمة (مثلاً، فحوصات الدم).

**تناول كوزار مع المأكولات والمشروبات**

يمكن تناول كوزار مع الأكل أو من دونه.

**الحمل والرضاعة**

**الحمل**

عليك إبلاغ الطبيب في حال كنت تَظُنّين أنك حامل أو قد تصبحين حاملاً. ننصحك الطبيب عادة بالتوقّف عن تناول كوزار قبل أن تصبحي حاملاً أو ما أن تعرفي أنّك حامل ونصحك باستبداله بدواء آخر . لا يوصى بتناول كوزار في بداية الحمل ويجب عدم تناوله بعد مرور ٣ أشهر على الحمل، بما أنّه قد يُلحق ضرراً خطيراً بالجنين في هذه الحالة.

**الرضاعة**

أطعمي الطبيب في حال كنت ترضعين أو على وشك البدء بالرضاعة. لا يوصى كوزار للأم المرضعة وقد يستبدل الطبيب كوزار بدواء آخر في حال كنت ترضعين بالرضاعة، لا سيّما إذا كان مولودك مولوداً جديداً أو ولد قبل أوانه. إسأل الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذه الدواء.

**القيادة واستعمال الآليات**

لا توجد دراسات حول التأثير على القدرة على القيادة أو استخدام الآليات.

لا يُتوقّع أن يؤثّر كوزار على قدرتك على قيادة الآليات أو استخدامها. لكن، كما هي الحال مع أدوية عديدة أخرى تُستخدَم لمعالجة ضغط الدم المرتفع، قد يُسبّب لوسارتان الدوار أو التعباس بالنسبة إلى بعض الأشخاص. في هذه الحالة، يُرجى استشارة الطبيب قبل ممارسة هذه الأنشطة.

**يحتوي كوزار على اللاكتوز**

يحتوي كوزار على اللاكتوز أحادي هيدرات. إذا قال لك طبيبك أنّه لديك حساسية تجاه بعض السكريّات، اتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

**٣-كيف تتناول كوزار**

تناول كوزار دائماً بحسب وصفة الطبيب أو الصيدلي. يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي في حال لم تكن متأكداً من ذلك. يقرّر الطبيب الجرعة الملائمة من كوزار، حسب وضعك وإذا ما كنت تتناول أدوية أخرى. من المهمّ الاستمرار في تناول كوزار بناءً على وصفة الطبيب من أجل المحافظة على السيطرة على ضغط الدم.

**المرضى البالغون المصابون بارتفاع ضغط الدم:**

يبدأ العلاج عادةً بقرص لوسارتان ٥٠ ملغ (قرص كوزار ٥٠ ملغ) مرّة واحدة يومياً. يجب بلوغ التأثير الأقصى لتخفيض ضغط الدم في غضون ٣ إلى ٦ أسابيع بعد البدء بالعلاج. وبالنسبة إلى بعض المرضى، قد تُرَفّع الجرعة لاحقاً إلى لوسارتان ١٠٠ ملغ (قرصان كوزار ٥٠ ملغ أو قرص واحد ١٠٠ ملغ) مرّة واحدة يومياً.

إذا شعرت أن تأثير لوسارتان قوي جدًا أو ضعيف جدًا، يُرجى منك التحدّث إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

**استخدام الدواء لدى الأطفال والمراهقين:**

**الأطفال دون ٦ سنوات:**

لا يوصى باستخدام كوزار لدى الأطفال دون ٦ سنوات، بما أنّه لم تُثبت فاعليّته بالنسبة إلى هذه الفئة العمرية.

**الأطفال من ٦ إلى ١٨ سنة:**

يوصى بجرعة أوليّة لدى المرضى الذين يتراوح وزنهيم بين ٢٠ و٥٠ كلغ قدرها 7٠٠ ملغ من لوسارتان للكيلو الواحد، مرّة واحدة يومياً (حتى ٢٥ ملغ من كوزار). قد يرفع الطبيب الجرعة في حال عدم السيطرة على ضغط الدم.

قد تكون أشكال أخرى من هذا الدواء أكثر ملاءمة للأطفال؛ إسأل الطبيب أو الصيدلي.

**المرضى البالغون المصابون بارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني:**

يبدأ العلاج عادةً بقرص لوسارتان ٥٠ ملغ (قرص كوزار ٥٠ ملغ) مرّة واحدة يومياً. قد تُرَفّع الجرعة لاحقاً إلى لوسارتان ١٠٠ ملغ (قرصا كوزار ٥٠ ملغ أو قرص كوزار ١٠٠ ملغ) مرّة واحدة يومياً حسب استجابة ضغط الدم. قد يُعطى لوسارتان مع أدوية أخرى مخفّضة لضغط الدم (مثلاً مدرّات البول، ومحصرات قنوات الكلسيوم، ومحصرات ألفا أو بيتا، وأدوية ذات التأثير المركزي، بالإضافة إلى الإنسولين وأدوية أخرى شائعة الاستخدام تخفّض مستوى الجلوكوز في الدم (مثلاً، مثبّطات سلفونيلوريذ، وغليتازونز، وغلوكوزيداز).

**تحديد الجرعات لدى مجموعات المرضى الخاصة**

قد يوصى الطبيب بجرعة أقل، لا سيّما عند البدء بعلاج بعض المرضى، على غرار المرضى المعالجين بمدّرات البول بجرعات مرتفعة ولدى المرضى الذين يعانون قصوراً في الكبد أو المرضى البالغين من العمر أكثر من ٧٥ عاماً. لا يوصى بتناول لوسارتان لدى المرضى المصابين بعجز كبدي حاد (راجع القسم "لا تتناول كوزار").

**تناول الجرعات**

يجب تناول الأقراص بالكامل مع كوب ماء. يجب محاولة تناول الجرعة اليومية في الوقت نفسه من كل يوم. من المهمّ أن تستمرّ في تناول كوزار حتى يطلب منك الطبيب التوقّف عن ذلك.

**إذا تناولت جرعات كوزار أكثر من التي عليك تناولها**

في حال تناولت عن طريق الخطأ عدداً كبيراً من الأقراص، اتّصل بالطبيب على الفور. من بين أعراض الجرعة الزائدة، انخفاض ضغط الدم، ودقّات القلب المتسارعة، وانخفاض محتمل لدقّات القلب.

**إذا نسيت تناول كوزار**

لا تأخذ جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية، بل تناول الجرعة العادية في الوقت المُعدّاد في اليوم التالي. في حال كان لديك أي سؤال حول استخدام هذا الدواء، إسأل الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة.

**٤-الأثار الجانبية المحتملة**

على غرار الأدوية كافّة، يُمكن أن يُسبّب كوزار تأثيرات جانبية لبعض الأشخاص، وإن كانت لا تُصيب الجميع.

إذا تعرّضت للتأثيرات الجانبية التالية، توقّف عن تناول لوسارتان وأخبر طبيبك فوراً أو توجّه إلى قسم الإسعابات في أقرب مستشفى لك:

ردّة فعل حساسية حادة (طفح جلدي، حكاك، تورّم الوجه، أو الشفتين، أو الفم، أو الحنجرة، ما قد يُسبّب صعوبة في البلع أو التنفّس).

إنّه أثر خطير، وإنّما نادر، يُصيب أكثر من مريض من أصل ١٠٠٠٠، إنّما أقلّ من مريض من أصل ١٠٠٠. قد تحتاج إلى دخول المستشفى أو إلى رعاية طبّية طارئة.

لقد تمّ التبليغ عن الأثار الجانبية التالية لدى الأشخاص الذين يتناولون كوزار:

*الأثار الشائعة (قد تؤثرّ على شخص من أصل ١٠)*

- الدوار،
- ضغط دم منخفض (لا سيما بعد خسارة كبيرة للمياه من الجسم في الأوعية الدموية، مثلاً بالنسبة إلى المرضى المصابين بقصور في القلب أو يُتابعون علاجاً بجرعة كبيرة من مدرّات البول)
- تغيّرات في وضعية الجسم حسب الجرعة، مثلاً هبوط ضغط الدم عند الوقوف بعد وضعيةّ الجلوس أو الاستلقاء،
- الوهن،
- التعب،
- كميّة منخفضة جدّاً من السكر في الدم (نقص جلوكوز الدم)
- كميّة مرتفعة جدّاً من البوتاسيوم في الدم
- تغيّيرات في وظيفة الكلى، بما في ذلك عجز في الكلى
- عدد منخفض لكريات الدم الحمراء (فقر الدم)
- زيادة يوريا الدم وكرياتينين في المصل وبوتاسيوم في المصل لدى المرضى المصابين بقصور في القلب.

*الأثار غير الشائعة (قد تؤثرّ على شخص من أصل ١٠٠):*

- التعباس،
- الصداع،
- اضطرابات النوم،
- الشعور بزيادة وتيرة ودقّات القلب (خفقان القلب)،
- آلم حاد في الصدر (ذبحة صدرية)،
- ضيق النفس،
- آلم في البطن،
- إسهال مُعدّد،
- إسهال،
- غثيان،
- تقيؤ،
- شرى،
- حكاك،
- طفح جلدي،
- تورّم مُحدّد الموقع،
- سعال.

*أثار جانبية نادرة (قد تؤثرّ على شخص من أصل ١٠٠٠)*

- حساسية مفرطة،
- الوذمة الوعائية،
- التهاب الأوعية الدموية (التهاب وعاني، بما فيها فرقرية هينوخ شونلاين Henoch–Schönlein purpura)،
- شعور بالتشنج أو الوخز (المدلّ)،
- فقدان الوعي (الإغماء)،
- دقّات القلب المتسارعة جدّاً وغير المنتظمة (رجحان أذينيّ)،
- سكتة دماغية،
- التهاب الكبد،
- مستويات ناقلة أمين الألانين مرتفعة في الدم، تتمّ معالجتها عادةً من خلال إيقاف العلاج

*أثار جانبية غير معروفة (لا يُمكن تقدير الوتيرة بناءً على البيانات المتوفرة):*

- عدد صفحات منخفضة
- صداع
- اضطرابات في وظيفة الكبد
- آلم في العضلات والمفاصل
- أعراض تُشبه أعراض الانفلوانزا
- آلم في الظهر والتهاب في الجهاز البولي
- ازدياد الحساسية تجاه الشمس (حسّاس ضوئي)
- آلم في العضلات غير مبرّر مع بول داكن اللون (بولون الشاي) (احلال اليريدات)
- العجز الجنسي
- التهاب البنكرياس
- مستويات صوديوم منخفضة في الدم (انخفاض صوديوم الدم)
- الاستكئاب
- شعور عام بالاعياء (توَعك)
- طنين، أو رنين، أو طنين الأذنّين
- خلل الذوق

الأثار الجانبية لدى الأطفال مشابهة لتلك التي نراها لدى البالغين.

**الإبلاغ عن الأثار الجانبية**

في حال لاحظت أثارًا جانبية، حتى تلك غير واردة في هذا الكتيّب، يُرجى إبلاغ الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة.

من خلال الإبلاغ عن الأثار الجانبية، يُمكنك المساهمة في تأمين معلومات إضافية حول سلامة هذا الدواء.

**٥-كيف يُخزّن كوزار**

لا تترك الدواء في متناول الأطفال وعلى مرأى منهم.

لا تستعمل الدواء إذا انتهت مدّة صلاحيّته الواردة على العبوة أو على العلبة. يُشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم من الشهر.

كوزار ١٠٠ ملغ: يُخزّن الدواء على درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية ويُحفظ في غلافه الأصلي بعيداً عن الضوء والرطوبة.

لا تفتح العبوة إلا إذا كنت مستعداً لتناول الدواء.

لا تتخلّص من الأدوية عبر مياه الصرف الصحي أو التفتاليل المنزليّة. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعملها. قد تُساعدك هذه الإجراءات على حماية البيئة.

**٦. محتوى العبوة ومعلومات إضافية**

**تركيبة كوزار**

المادة الفاعلة هي لوسارتان البوتاسيوم.

يحتوي كل قرص كوزار ١٠٠ ملغ على ١٠٠ ملغ لوسارتان البوتاسيوم.

المكوّنات الأخرى هي: سيليلوز ميكروكريستالين (E460)، واللاكٹوز أحادي الهيدرات، ونشا الذرة المحلّي مُسبّقاً بالجلاتين، وستيرات الماغنيسيوم (E572)، وهيبورلوز (E463)، وهيبروميلوز (E464).

تحتوي أقراص كوزار ١٠٠ ملغ على البوتاسيوم بالمكيّات التالية: 8.48 ملغ (0.216 ميلي مكافئ).

تحتوي أقراص كوزار ١٠٠ ملغ على شمع الكرنوبا (E903) وثاني أكسيد التيتانيوم (E171).

**الشكل الصيدلاني ومحتوى العبوة**

أقراص كوزار ١٠٠ ملغ أقراص مغلفة وغير قابلة للقس، تحتوي على ١٠٠ ملغ من لوسارتان البوتاسيوم.

يتمّ تسويق كوزار في الأحجام التالية:

–كوزار ١٠٠ ملغ – عبوات PVC/PE/PVDC مع غطاء من ورق الألومنيوم لعبوات من 7، 10، و14، و15، و20، و28، و30(3x10) ، و50 ، و56، و84، و90، و98، أو 280، أو عبوات مغلفة لكل حبة من 28، و56، و98 قرصاً للاستعمال في المستشفى. متوفر أيضاً في زجاجات HDPE ١٠٠-ل قرص.

قد لا يتمّ تسويق أحجام العبوات المختلفة.

**الشركة المالكة لحقوق التسويق و يتم إصدار التشغيل من قبل:**

ميرك شارب ودوم بي في

واردربويج ٣٩

بي ان هارلم ٢٠٣١

هولندا

**الشركة الصانعة:**

ميرك شارب ودوم ليميتد.

شوتون لين، كرامليفجتون

نورثمبرلاند إن إى ٢٢ جى يو

المملكة المتحدة

**تمت آخر مراجعة لهذه النشرة في كانون الاول/ ديسمبر ٢٠١٨ .**

<p>(إنّ هذا الدواء):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– الدواء مستحضر يؤثّر على حسنك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يُعرّضك للخطر</li> <li>– اتّبع بدقّة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك</li> <li>– فالطبيب والصيدلاني هما الخياران بالدواء وينفعه وضرره</li> <li>– لا تقطع مدة العلاج المُحدّدة لك من تلقاء نفسك</li> <li>– لا تُكرّر صرف الدواء بدون وصفة طبية</li></ul> <p>لا تتركّ الأدوية في متناول الأطفال</p> <p>مجلس وزراء الصحة العرب</p> <p>واحد الصيدالة العرب</p>
--

