

نشرة العبوة: معلومات للمستخدم

أقراص هيزار* المغلفة ٥٠ ملغ ١٢.٥/ ملغ
لوسارتان بوتاسيوم و هيدروكلوروثيازيد

الرجاء قراءة هذه النشرة بأكملها بعناية قبل تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة إليك

- احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- اسأل الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة للحصول على المزيد من المعلومات.
- وُصِفَ هذا الدواء لك بشكل خاص. لا تُعطِه إلى شخص آخر، فقد يُضرره حتى لو كانت أعراضه تشبه أعراضك.
- أخبر الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة إذا شعرت بأثار جانبية خطيرة أو إذا لاحظت آثاراً جانبية غير تلك المذكورة في هذه النشرة. راجع القسم 4.

في هذه النشرة ما يلي:

- ١- ما هو هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ وما هي دواعي استعماله
- ٢- ما يجب معرفته قبل تناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ
- ٣-كيف تتناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ
- ٤-الآثار الجانبية المحتملة
- ٥- كيف يُخزّن هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ
- ٦-محتوى العبوة ومعلومات إضافية

- ١- **ما هو هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ وما هي دواعي استعماله؟**
هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ توليفة من دواء يُعرف بمضيق مستقبلات الأنجيوتنسينII (لوسارتان) ودواء مُدرّ للبول (هيدروكلوروثيازيد). الأنجيوتنسينII مادة يتم إنتاجها في الجسم، ترتبط بالمستقبلات في الأوعية الدموية، ما يسبب تضيقها ويؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم. يمنع لوسارتان ارتباط مادة الأنجيوتنسينII بالمستقبلات، ممّا يؤدي إلى استرخاء الأوعية الدموية التي، بدورها، تُخفّض ضغط الدم. أمّا الهيدروكلوروثيازيد، فيساعد الكلى على تمرير كمية أكبر من المياه والملح، ممّا يُساهم في تخفيض ضغط الدم.

يتم استخدام هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ لمعالجة ارتفاع ضغط الدم.

٢-ما يجب معرفته قبل تناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ

لا تتناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ

في الحالات التالية:

- لديك حساسية من مادة لوسارتان أو هيدروكلوروثيازيد أو أي مكونات أخرى من أقراص هيزار (الدرجة في القسم ٦)
- إذا كان لديك حساسية من المواد الأخرى الناتجة عن السولفوناميد (مثلاً، مواد التيازيد الأخرى، وبعض الأدوية المضادة للبكتيريا، مثل كـوتريموكسازول، إيسال الطبيب في حال لم تكن متأكدًا).
- إذا كنت تُعاني قصوراً حاداً في وظيفة الكبد.
- إذا كان مستوى البوتاسيوم أو الصوديوم منخفضاً جداً وإذا كان مستوى الكلسيوم مرتفعاً جداً، لا يُمكن تصحيحه بواسطة العلاج.
- إذا كنت تُعاني من الفرس (داء المفصل).
- إذا كنت حاملاً لأكثر من ثلاثة أشهر (كما من الأفضل تقادي تناول هيزار في بداية الحمل – راجع قسم الحمل)
- في حال وجود قصور حاد في وظيفة الكلى أو إذا كانت الكلى لا تُنتج البول.
- إذا كنت مصاباً بداء السكري أو تُعاني قصوراً في وظيفة الكلى وإذا كنت تخضع لعلاج بواسطة دواء يُخفّض ضغط الدم يحتوي على الإليسكربين.

التحذير والوقاية

إسأل الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة قبل تناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ. عليك إطلاع طبيبك إذا كنت تُظنّين أنك حامل (أو قد تصيبين حاملاً). لا يوصي بتناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ في بداية الحمل ويجب عدم تناوله إذا كنت حاملاً لأكثر من ٣ أشهر، لأنّه قد يُسبب أدّى خطيراً لجينيك في حال تناوله في هذه المرحلة (راجع قسم الحمل).

من المهم إبلاغ طبيبك قبل تناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ في الحالات التالية:

- تعرّضت في الماضي لانتفاخ الوجه، أو الشفّتين، أو اللسان
- تتناول مدرّات البول
- تتّبع حمية غذائية محدودة الملح
- إنك مصاب بالتقيؤ أو الإسهال الحاد
- تُعاني قصوراً في القلب
- تُعاني قصوراً في وظيفة الكبد (راجع القسم 2 "لا تتناول هيزار")
- إذا كانت أوعيتك الدموية المؤدية إلى الكلى ضيقة أو مسدودة أو إذا كانت لديك كلية واحدة تعمل أو إذا حصلت مؤخراً على زرع كلى
- إذا كانت أوعيتك الدموية ضيقة (التصلّب الشرياني) أو تعرّضت لنذبة صدرية ألم في الصدر بسبب قصور في وظيفة القلب
- كنت مُصاباً بضيق الصمام التاجي أو تضيق الأبهر أو باعتلال قلبي تضخمي (مرض يُسبب سماكة عضلة القلب)
- كنت مُصاباً بداء السكري
- كنت مُصاباً بالفرس (داء التهاب المفصل)
- كنت مُصاباً في الماضي أو في الحاضر بحساسية، أو الربو، أو حالة تُشبّه ألماً في المفصل، وطفح جلدي، وحُمى (ذئبة حُمائية مُجمّعة).
- إذا كان مستوى الكلسيوم لديك مرتفعاً أو مستوى البوتاسيوم منخفضاً أو إذا كنت تتّبع حمية غذائية منخفضة البوتاسيوم.
- إذا كنت بحاجة إلى مُخدر (حتى عند طبيب الأسنان) أو قبل الجراحة أو إذا كنت ستخضع لفحوصات للتأكد من وظيفة الغدة المجاورة للغرقية، عليك إطلاع الطبيب أو الطاقم الطبي أنك تتناول أقراص بوتاسيوم لوسارتان وهيدروكلوروثيازيد.
- تعاني فرط الألدوستيرونية الأولي (أحد اضطرابات الغدة الكظرية حيث تقوم الغدة بإنتاج كمية كبيرة جدًا من هرمون الألدوستيرون، سببه خلل في الغدة)
- إذا كنت تتناول أحد الأدوية التالية المستخدمة لمعالجة ارتفاع ضغط الدم: – مثبط أنزيم محوّل للأنجيوتنسين (مثلاً، إينالابريل، ليزينابريل، راميريل)، لا سيّما إذا كنت تُعاني مشاكل كلى سببها السكري

قد يفحص الطبيب وظيفة الكلى، وضغط الدم، وكميّة الأملاح (مثلاً البوتاسيوم) في دمك ضمن فترات منتظمة.

راجع أيضاً المعلومات الواردة تحت عنوان "لا تتناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ".

– إذا كنت تتناول أدوية أخرى قد تزيد من مستوى البوتاسيوم في الدم (راجع القسم 2 "لا تتناول هيزار").

– إذا سبق أن أصبت بسرطان الجلد أو إذا أصبت باقعة جلدية غير متوقفة أثناء تلقّيك العلاج. فيمكن للعلاج بواسطة الهيدروكلوروثيازيد، خاصة الجرعات العالية على المدى الطويل، أن يؤدي إلى زيادة خطى الإصابة ببعض أنواع سرطان الجلد

والشفة (سرطان الجلد غير الميلانيني). يجب أن تحمي بشرتك من التعرض للأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية أثناء استعمال هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ.

الأطفال والمراهقون

لا تجرّبه لاستخدام هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ لدى الأطفال. وبالتالي، يجب عدم إعطاء هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ إلى الأطفال.

تناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ مع أدوية أخرى

أطلع الطبيب أو الصيدلي في حال كنت تتناول دواء آخر، أو قد تناولت دواءً مؤخرًا، أو قد تتناول أي دواء آخر.

قد تتفاعل العوامل المدرّة للبول مثل الهيدروكلوروثيازيد في هيزار مع أدوية أخرى.

يجب عدم تناول مواد تحتوي على الليثيوم مع هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ من دون إشراف طبيبك.

قد يكون من الملائم اتّخاذ إجراءات وقائيّة (مثلاً فحوصات دم) في حال تناولت كمّلات بوتاسيوم، أو بدائل ملح تحتوي على البوتاسيوم، أو الأدوية الموفرة للبوتاسيوم، أو مدرّات بول أخرى (أقراص مياه)، أو بعض المليّنات، أو الأدوية لمعالجة القرّس، أو أدوية لضبط دقات القلب أو السكري (إنسولين أو أدوية عن طريق الفم).

من المهمّ أيضاً أن يعرف طبيبك إذا كنت تتناول ما يلي:

- أدوية أخرى لتخفيض ضغط الدم
- ستيرويدات
- أدوية لمعالجة السرطان
- منسكّات الألم
- أدوية لمعالجة التهابات فطرية
- أدوية لمعالجة داء المفصل
- الارتجات المستخدم لمعالجة مستوى الكولسترول المرتفع، مثل الكوليستيرامين
- الأدوية لإرخاء العضلات
- أقراص النوم
- أدوية أفونيّة، مثل المورفين
- "مليّنات الضغط"، مثل الأدينينلين أو أدوية أخرى من المجموعة نفسها
- أدوية عن طريق الفم لداء السكري أو الإنسولين

قد يحتاج الطبيب إلى تبديل جرّعتك و/أو يطلب منك اتّخاذ إجراءات وقائيّة أخرى:

إذا كنت تتناول مثبط الأنزيم المحوّل للأنجيوتنسين أو الأليسكربين (راجع أيضاً المعلومات في القسم "لا تتناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ" و"التحذير والوقاية").

يجزى إطلاع الطبيب في حال كنت تتناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ إذا كنت ستخضع لتصوير إشعاعي وسُعطلي مادة البوليثاينية.

تناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ مع المأكولات والمشروبات

يُنصح بعدم شرب الكحول عند تناول هذه الأقراص: فالكحول وأقراص هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ قد تزيد من آثار بعضها البعض.

كما قد يُبطّل تناول الملح بكميّات كبيرة معفول أقراص هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ. يُمكن تناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ مع الأكل أو من دونه.

الحمل والرضاعة

الحمل
عليك إطلاع الطبيب في حال كنت تُظنّين أنك حامل أو قد تصيبين حاملاً.

ينصحك الطبيب عادةً بالتوقّف عن تناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ قبل أن تصبّحي حاملاً أو ما تُعرّفي أنك حامل وينصحك باستبداله بدواء آخر. لا يوصى بتناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ في بداية الحمل ويجب عدم تناوله بعد مرور ٣ أشهر على الحمل، بما أمّه أنه قد يُلحق ضرراً خطيراً بالجنين في هذه الحالة.

الرضاعة

أطلعِي الطبيب في حال كنت ترضعين أو على وشك البدء بالرضاعة. لا يوصى هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ لأم المرضعة وقد يستبدل الطبيب هيزار بدواء آخر في حال كنت ترغيبين بالرضاعة.

الاستخدام لدى المرضى الكبار بالسن
يعمل هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ بنفس المفعالية وتتقلّله غالبية المرضى البالغين الأكبر سنًا والأصغر. ويحتاج المرضى الأكبر سنًا في غالبيتهم إلى الجرعة نفسها مقارنةً مع المرضى الأصغر.

القيادة واستعمال الآليات

عند البدء بالعلاج بواسطة هذا الدواء، عليك الامتناع عن القيام بأعمال تحتاج إلى انتباه خاص (مثلاً قيادة سيّارة أو تشغيل آليّات خطيرة) حتى معرفة إذا كنت تتقلّب الدواء.

يحتوي هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ على اللاكتوز

إذا قال لك طبيبك إنك لا تتقلّب بعض السكريّات، اتّصلَ بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

٣-كيف تتناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ

تناول هيزار دائماً بحسب وصفة الطبيب أو الصيدلي. يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي في حال لم تكن متأكدًا من ذلك. يفرّز المسيد الجرعة الملائمة من هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ، حسب وضك وإذا ما كنت تتناول جرعة أخرى. من المهمّ الاستمرار في تناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ بناءً على وصفة الطبيب من أجل السيطرة بشكل سلس على ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم:

تُحدّد جرعة الدوائية الاعتيادية بقرص واحد من هيزار 50 ملج/12.5 ملج (لوسارتان 50 ملج/هيدروكلوروثيازيد 12.5 ملج) مرة في اليوم. لدى المرضى الذين لا يتجاوبون جيّداً مع هيزار 50 ملج/12.5 ملج، يمكن زيادة الجرعة إلى قرص واحد من فورترّار 100 ملج/25 ملج (لوسارتان 100 ملج/هيدروكلوروثيازيد 25 ملج) مرة في اليوم، علّماً أن الجرعة القصوى هي قرص واحد من فورترّار 100 ملج/25 ملج مرة في اليوم. بصورة عامة، يتحقّق التأثيرُ الخافض لضغط الدم في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع من بداية العلاج. هيزار 100/12.5 (لوسارتان 100 ملج/هيدروكلوروثيازيد 12.5 ملج) متاح للمرضى الذين يُعانيّ جرّعهم بـ 100 ملج من كوزار ويحتاجون إلى المزيد من السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

تناول الجرعات

يجب تناول الأقراص بالكامل مع كوب ماء.

إذا تناولت جرعات هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ أكثر من التي عليك تناولها
في حال تناولت جرعة زائدة، اتّصلَ بالطبيب على الفور للحصول على الرعاية الطبيّة بشكل سريع، من بين أعراض الجرعة الزائدة، انخفاض ضغط الدم، ودقات القلب المتسارعة، وانخفاض محتمل لدقات القلب، والجفاف، والتبذّلات في تركيبة الدم.

إذا نسيت تناول هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ

حارجة، لا تتناول جرعة إضافية، بل استأنفك الجدول الزمني المُستاد.

٤-الآثار الجانبية المحتملة

على غرار الأدوية كافة، يُمكن أن يُسبّب هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ آثاراً جانبية لبعض الأشخاص، وإن كانت لا تُصيب الجميع.

في حال واجهت الآثار الجانبية التالية، توقّف عن تناول أقراص هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ وأخبر طبيبك فوراً أو توجّه إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى لك:

ردّة فعل حساسيّة حادة (طفح جلدي، حكاك، تورّم الوجه، أو الشفّتين، أو الفم، أو الحنجرة، ما قد يُسبّب صعوبة في البلع أو التنفّس).

هذا أثر خطير، إنّما نادر، يُصيب أكثر من مريض واحد من أصل ١٠٠٠٠، إنّما أقلّ من مريض واحد من أصل ١٠٠٠. قد تحتاج إلى دخول المستشفى أو إلى رعاية طبيّة طارئة.

تم التبليغ عن الآثار الجانبية التالية لدى الأشخاص الذين يتناولون هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ:

الآثار الشائعة (قد تؤثرُ على شخص من أصل ١٠)

- السعال، التهاب المجاري الهوائية العلوية، احتقان الأنف، التهاب الجيوب الأنفية، اضطرابات في الجيوب الأنفية
- الإسهال، ألم البطن، الغثيان، عسر الهضم
- آلام في العضلات أو تشنجات، ألم في الساق وآلام الظهر
- الآرق، الصداع، الدوار
- الوهن، التعب، الألم في الصدر
- ارتفاع مستوى البوتاسيوم (ممّا قد يُسبّب دقات قلب غير منتظمة) وانخفاض مستوى الهيموغلوبين
- تبدّل في وظيفة الكلى، بما في ذلك فشل كلوي
- انخفاض حاد لمستوى السكر في الدم

الآثار غير الشائعة (قد تؤثرُ على شخص من أصل ١٠٠):

- فقر الدم أو بقع حمراء أو مائلة إلى اللون البني على الجلد (أحياناً، بشكل خوص، على القدمين، والساقين، والذراعين، والرفقين، مع ألم في المفاصل، وانتفاخ اليدين والقدمين والم في المعدة)، والتكدم، وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، ومشاكل تخثّر، وانخفاض عدد الصفائح.
- فقدان الشهية، وزيادة مستويات الحمض البولي أو الفرس، وزيادة مستوى السكر في الدم، ومستوى غير طبيعي للاملاح في الدم.
- الأرق، والتوتر، واضطرابات الهلع (نوبات هلع متكرّرة)، والارتباك، والاكتئاب، والأحلام غير الطبيعية، واضطرابات النوم، والشعور بالنعاس، وعجز الذاكرة.
- الإبر والوخز أو أحاسيس مُشابهة، وآلم في الأطراف، ورجفان، وصداغ نصفي، وفقدان الوعي
- تغيّم الرؤية، وحرق أو وخز في العينين، والتهاب الملتحمة، وتدهور النظر، ورؤية الأشياء باللون الأصفر
- الرين، أو الأزيز أو الطنين أو طرقة أو نقر في الأذنين، الشعور بالدوار
- انخفاض ضغط الدم، الذي يُمكن ربطه بالتغيّرات في الوضعية (الشعور بالدوخة أو بالوهن عند الوقوف)، النذبة (ضيق النفس)، دقات قلب غير طبيعية، وحادثة وعائية دماغية (سكتة مُسفّرة)، ونوبة قلبيّة، واختلاجات
- التهاب الأوعية الدموية، الذي غالباً ما يكون مربوطاً بالتكدّم أو الطّحح الجلدي
- ألم في الحنجرة، وانقطاع النفس، والتهاب الشعب الهوائية، والالتهاب الرئوي، ومياه في الرئتين (ممّا يُسبّب صعوبة في التنفّس)، ونزيف الأنف، وشرج، واحتقان الأنف
- الأناس، وإمساك عنيد، ورجح، وتقلّبات المعدة، وتشنّجات في المعدة، وتقيؤ، وجفاف في الفم، والتهاب الغدة اللعابية، وآلم في الأسنان
- الفرقان (أصفران العينين والبشرة) والتهاب البنكرياس
- الشرى، والحكة، والتهاب البشرة، والطفح الجلدي، واحمرار البشرة، والحساسية على الثور، وجفاف البشرة، والهيّات الساخنة، والتعرّق، وفقدان الشعر
- ألم في الذراعين، أو الكتفين، أو الوركين، أو المفاصل الأخرى، وانتفاخ المفاصل، والتصلّب، والوهن في العضلات
- كثرة التبول بما في ذلك ليلاً ، ووظيفة كلويّة غير طبيعيّة، بما في ذلك التهاب الكلى، والتهاب المجاري البوليّة، ووجود سكر في الدم
- انخفاض الرغبة الجنسية، والعجز الجنسي
- تورم في الوجه، تورم موضعي (وذمة) والحمى

آثار جانبية نادرة (قد تؤثرُ على شخص من أصل ١٠٠٠):

–التهاب الكبد ونتائج غير طبيعيّة لاختبارات وظيفة الكبد

آثار جانبية غير معروفة (لا يُمكن تقدير التوتيرة بناءً على البيانات المتوفرة):

- الأعراض الشبيهة بأعراض الرشح
- الألم غير المبرر في العضل مع بول داكن (بلون الشاي) (انحلال البريدات)
- مستوى الصوديوم المنخفض في الدم
- الشعور العام بالانزعاج
- تبدّل حاسة الذوق (خلل التوق)
- سرطان الجلد والشفة (سرطان الجلد غير الميلانيني).

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

في حال لاحظت آثاراً جانبية، حتى تلك غير الواردة في هذا الكتيّب، يُرجى إطلاع الطبيب أو الصيدلي أو الممرّضة.

من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يُمكنك المساهمة في تأمين معلومات إضافية حول سلامة هذا الدواء.

٥-كيف يُخزّن هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ

لا تترك الدواء في متناول الأطفال وعلى مرأى منهم.

لا تستعمل الدواء إذا انتهت مدّة صلاحيّته الواردة على العبوة. يُشير تاريخ إنتهاء الصلاحيّة إلى آخر يوم من الشهر المذكور.

أشربة

خزّن هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ في عبوته الأصليّة من أجل حمايته من الضوء والرطوبة على درجة حرارة ١٥ – ٣٠ درجة مئوية.

لا تتخلّص من الأدوية عبر مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزليّة. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعدّ تستعملها. قد تُساعدك هذه الإجراءات على حماية البيئة.

٦. محتوى العبوة ومعلومات إضافية

تركيبة هيزار ٥٠ملغ/١٢.٥ملغ

المادّتان النّاشطتان هما لوسارتان والبوتاسيوم وهيدروكلوروثيازيد.

يحتوي كلّ قرص هيزار ٥٠ ملج/١٢.٥ملغ على ٥٠ ملج من لوسارتان البوتاسيوم وعلى ١٢.٥ ملج من هيدروكلوروثيازيد كمادّتين ناشطتين.

المكوّنات الأخرى غير النّشطة هي: سيليلوز ميكروكريستالين (E460)، واللاكروز أحادي هيدرات، ونشا الذّرة المغلّف مسبقاً بالجلاتين، وستيرات الماغنسيوم (E572)، و هيدروكسيبروبيل سيليلوز (E463)، و هيدروميلوز (E464).

يحتوي كلّ قرص هيزار ٥٠ ملج/١٢.٥ملغ على ٢٤.٤ ملج (١٠٨.٠ ميلي مكافئ) من البوتاسيوم.

يحتوي كلّ قرص هيزار ٥٠ ملج/١٢.٥ملغ على ثاني أكسيد التيتانيوم (E171)، والزمينيوم أصفر الكيلورين (E104)، وشمع كرونا (E903).

الشكل الصيدلاني ومحتوى العبوة

أقراص هيزار ٥٠ ملج/١٢.٥ملغ على أقراص مغلّفة بوضوية الشكل ولونها أصفر، مطبوع 717 على جهة منها ولا شيء مطبوع على الجهة الأخرى منها أو مرّقة على الجهة الأخرى، الخط الفاصل غير مخصّص لكسر القرص.

يتمّ تسويق هيزار ٥٠ ملج/١٢.٥ملغ في الأحجام التالية:
– هيزار ٥٠ ملج/١٢.٥ملغ – شريط PVC/PE/PVDC مغلف بورق الألومنيوم في عبوات تحتوي على ٤ (٤x١)، و٧، و١٠، و١٤، و(١٤x٢) ٢٨، و٢٠، و(١٠x٣) ٣٠، و٥٠، و٥٦، و٨٤، و٩٨، و٢٨٠ قرصاً أو رزمة بجرعة واحدة من ٢٨، و٥٦، و٩٨ قرصاً للاستعمال في المستشفى. ثمة زجاجات HDPE لـ ١٠٠ قرص.

قد لا يتمّ تسويق أحجام العبوات كلّها.

الشركة المالكة لحقوق التسويق ويتمّ إصدار التشغيل في قبل:

ميرك شارب ودوم، بي بي وارندروج ٣٩ بي أن هارلم هولندا

الشركة الصانعة:

ميرك شارب ودوم ليميتد، شوتون لين نورثمبرلاند، إن إي ٢٣ ججي يو، كراملينجتون المملكة المتّحدة

تمتّ آخر مراجعة لهذه النشرة في كانون الاول/ ديسمبر ٢٠١٨.

(إن هذا الدواء):
– الدواء مستحضر يؤثّر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يُعرّضك للخطر
– أتّبع بدقّة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك
– فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضروه
– لا تقطع مدّة العلاج المُحدّدة لك من تلقاء نفسك
– لا تُكرّر صرف الدواء بدون وصفة طبية
لا تترك الأدوية في متناول الأطفال
مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيادلة العرب

