

يتم طرح حوالي 70% من الجرعة المعبأة على شكل ميريوبليم غير متغير في البول في غضون 12 ساعة، أو يرد بعدها إلا كمية قليلة خارجة في البول. تبقى تركيزات الميريوبليم في البول التي تزيد عن 10 ميكروغرام/مل حتى 5 ساعات بعد إعطاء جرعة 0.5 غرام. ولم يلاحظ أي تراكم لميريوبليم في البلازما أو البول عند إعطاء 0.5 غرام كل 8 ساعات أو 1 غرام كل 6 ساعات عند الأشخاص المتطوعين ذوي الوظيفة الكلوية السليمة.

إن المستقلب الوحيد لميريوبليم هو غير فعال على المستوى الميكروبيولوجي. يخترق ميريوبليم معظم السوائل والأنسجة داخل الجسم، بما فيها السائل المخي النخاعي عند المرضى العصابين بالتهاب السحايا البكتيري، محققاً تركيزات فائضة عن تلك المطلوبة لتثبيت معظم أنواع البكتيريا.

وقد أظهرت الدراسات على الأطفال أن الحراك الدوائية لميريوبليم عند الأطفال مماثلة لها عند البالغين. قد بلغ العمر النصفى لطرح الميريوبليم حوالي 1.5 إلى 2.3 ساعات عند الأطفال دون عمر الستين، والحراك الدوائية تكون خطية عند إعطاء جرعات تتراوح بين 10 و 40 ملغم/كلغم.

وقد أظهرت الدراسات على الحراك الدوائية عند المرضى الذين يشكون من قصور كلوي أن تصفية ميريوبليم من البلازما مترابطة مع تصفية الكرياتينين. ويلزم تعديل الجرعات عند الأشخاص ذوي الحلال الكلوي.

أما الدراسات على الحراك الدوائية عند كبار السن فقد أظهرت انخفاضاً في معدل تصفية ميريوبليم من البلازما، المترابطة مع انخفاض معدل تصفية الكرياتينين المرتبط بالعمر.

ولم تظهر الدراسات على الحراك الدوائية عند المرضى الذين يعانون مرضاً في الكبد أي تأثير للعرض على الحراك الدوائية لميريوبليم.

ظروف التخزين وتاريخ انتهاء الصلاحية

راجع تاريخ انتهاء الصلاحية الممنون على العبوة الخارجية.

يشير هذا التاريخ إلى منتج محفوظ بشكل صحيح في غلاف غير مفتوح.

لا تستعمل أروهم بعد انقضاء هذا التاريخ.

احفظه في درجة حرارة لا تتعدى 30°C. تجنب تجميد المستحضر.

احفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.

يوصى باستخدام محاليل أروهم فور تحضيرها لإعطائها سواء عن طريق الحقن في الوريد أو الربي الوريدي. يمكن الاحتفاظ بالمحاليل المحضرة لمدة ساعتين إذا تم حفظها في درجة حرارة الغرفة (15-25°C) أو لمدة 12 ساعة إذا تم حفظها في الثلجة (درجة حرارة 4°C).

عدد ساعات الإستقرار		المذيب
في درجة حرارة 4°C	في درجة حرارة 15-25°C	
المحاليل (200-1 ملغم/ملييلتر) محضرة مع:		
24	4	كلوريد الصوديوم 0.9%
4	1	غلوكوز 5%
4	1	غلوكوز 5% وكلوريد الصوديوم 0.225%
2	1	غلوكوز 5% وكلوريد الصوديوم 0.9%
2	1	غلوكوز 5% وكلوريد البوتاسيوم 0.1%
16	2	ماتيتول 2.5% أو 10% للربي الوريدي
2	1	غلوكوز 10%
6	1	غلوكوز 5% وبيكربونات الصوديوم 0.2% للربي الوريدي

محتوى العبوة

أروهم مسحوق معقم لمحلول للحقن في الوريد أو للربي الوريدي متوفر في عبوة تحتوي على عبوة واحدة سعة 0.5 غرام أو 1 غرام ميريوبليم مع كربونات الصوديوم.

إنتاج: زامبون سويتزرنلند ش.م.

كادميينو، سويسرا

لصالح: أروان للصناعات الدوائية لبنان ش.م.ل.

جرا، لبنان

إن هذا الدواء

- دواء مستحضر يثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- لطبيب والصيدلي هما الخياران بالدواء ويتبعه وضرور.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب، اتحاد الصيدلة العرب