

تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ رامبيريل - هيدروكلوروثيازيد 10 ملغ/12.5 ملغ

حول هذا الدواء

دواعي استعمال هذا الدواء
وصف لك طبيبك أقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ لتخفيض ضغط دمك.

مفعول هذا الدواء
يحتوي قرص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ على الرامبيريل الذي هو من ضمن مجموعة الأدوية تدعى مثبطات أنزيم تحويل الأنجيوتنسين ACE ويعمل على القلب وعلى الأوعية الدموية. يعوق الرامبيريل أنزيمًا في الجسم ضرورياً لإنتاج مادة تؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية.

يحتوي أيضاً قرص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ على الهيدروكلوروثيازيد الذي هو من ضمن مجموعة أدوية تدعى مدرات البول. تسمى أحياناً مدرات البول أقراص ماء. إنها تخفف كمية الملح والماء في جسمك مما يساعد على تخفيض ضغط دمك.

متى يمنع استعمال هذا الدواء
لا يجدر بك أخذ تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ في الحالات التالية:
• في حال أصبت سابقاً بارتكاس تحصصي ضد الرامبيريل أو أي مثبط آخر لأنزيم تحويل الأنجيوتنسين أو الهيدروكلوروثيازيد أو مدرات البول من الثيازيد أو أي مركب من مركبات هذا الدواء أو الأدوية المشتقة من السلفوناميد
• إذا كان لديك ماضٍ من الخبز الوعائي (تورم حول وجهك أو حلقك أو لسانك)
• إذا كنت حاملاً أو مرضعة
المادتان الفاعلتان هما:

رامبيريل 10.0 ملغ
هيدروكلوروثيازيد 12.50 ملغ
في القرص الواحد

المركبات الأخرى هي:
سلولوز ميثيل هيدروكسيبروبيل، نشا الذرة مسبق التهلين، سلولوز دقيق البلورية، فومرات ستيريلير الصوديوم وأكسيد الحديد الأصفر (E172) وأكسيد الحديد الأحمر (E172).

التحذيرات والمحاذير

تحذيرات ومحاذير مهمة
يجب عدم استعمال أقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ خلال فترة الحمل لأنه يمكن أن يؤدي الجنين. إذا اكتشفت أنك حامل خلال العلاج بأقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ، أوقف العلاج واتصل بطبيبك.

هل أخبرت طبيبك كل شيء عن حالتك وعن أي مشاكل يمكن أن تكون قد تعرضت لها وانت تتناول أدوية في الماضي؟
قبل أن تستعمل أقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ تحدث إلى طبيب أو الصيدلي في الحالات التالية:

- إذا كان عليك القيام بأعمال تطلب انتباهاً خاصاً (مثلاً تشغيل سيارة أو آلة)؛
 - إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب أو من أمراض في الكلى أو الكبد؛
 - إذا كنت تخضع لذيذة الدم؛
 - إذا كنت تعاني من حساسية ضد أقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ أو ضد أي من مركباته؛
 - إذا كان لديك ماضٍ من الخبز الوعائي (تورم حول وجهك أو حلقك أو لسانك)؛
 - إذا كنت تعاني من الذأب الحمامي (اضطرابات في جهاز المناعة) أو من تصلب الجلد (مرض يمكن أن يسبب تشنن أو تصلب أو تضيق الجلد والأوعية الدموية والأعضاء الداخلية)؛
 - إذا كنت حاملاً أو مرضعة أو تتوون الحمل.
- إن تناول أقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ خلال فترة الحمل يمكن أن يؤدي الجنين وأن يتسبب بوفاته حتى. يمنع استعمال هذا الدواء خلال فترة الحمل. إذا أصبحت حاملاً خلال فترة العلاج، توقف عن تناول الدواء واتصل فوراً بالطبيب. من غير المعروف إذا كانت أقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ تنتقل إلى حليب الثدي. لا يجدر بك أن ترضعي خلال فترة تناول أقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ.

التفاعلات مع هذا الدواء

قد يكون لبعض الأدوية تأثير سلبي على أقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ أو يمكن أن يكون لأقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ تأثير سلبي على أدوية أخرى. لذا إذا كنت تتناول حالياً دواء بناء على وصفة طبية أم لا، أعلم الطبيب أو الصيدلاني. تتضمن الأدوية التي قد تتفاعل مع أقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ:
• مدرات البول (أقراص الماء) ومدرات البول المحافظة على البوتاسيوم؛
• أدوية الضغط الدم المرتفع وأدوية أمراض القلب؛
• أملاح الليثيوم؛
• الأدوية المضادة لداء السكري؛
• مستحضر الديجيتاليس (ديجوكسين)؛
• مضادات التهاب غير الستيرويدية؛
• الستيرويدات القشرية؛
• مغذات الودي التي يمكن إيجادها في بعض مزيلات الإحقان وأدوية الزكام؛
• أدوية التخدير
تفاد إستهلاك المشروبات الكحولية حتى تكون ناقشت استعمالها مع طبيبك. فاستهلاك الكحول يمكن أن يغير ضغط دمك و/ أو يزيد إمكانية الدوار أو الإغماء.

الإستعمال المناسب لهذا الدواء

من المهم تناول أقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ في الوقت نفسه كل يوم حسب وصفة طبيبك. بصورة عامة، ينصح بتناول الجرعة اليومية في الصباح. إنقع قرصك كاملاً مع كمية كافية من الماء (نصف كوب تقريباً) قبل الطعام أو خلاله أو بعده. لا تمضغ الأقراص أو تصحقها.
الجرعة العادية
طبيبك هو من يحدد جرعات البداية التي عليك تناولها مع الأخذ بعين الاعتبار علاج ضغط الدم السابق. تبلغ الجرعة اليومية القصوى من أقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5، 10 ملغ/50 ملغ.
فرط الجرعة
في حال تناولت جرعة مفرطة، اتصل فوراً بالطبيب أو بأقرب مستشفى.

تفويت الجرعة

في حال فوّت جرعة من هذا الدواء، عليك تناولها في أقرب وقت ممكن. ولكن إذا كان وقت الجرعة التالية قد حان، لا تتناول الجرعة التي فوّتها وعد إلى برنامج الجرعات العادي. لا تتناول جرعات مضاعفة.

التأثيرات الجانبية ومواجهتها

يمكن أن تسبب أقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ مع مفعولها، تأثيرات جانبية. فيعد أن تبدأ بتناول أقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ، من المهم أن تعلم طبيبك فوراً بأي أعراض غير مفسر قد تتعرض له. تتضمن الأمثلة عن التأثيرات الجانبية العرضية:

- الدوار
- الصداع
- عوارض تشبه عوارض أزركام مثل التهاب الحلق والحمى والتوكم وآلم العضلات والطفح والغثيان والتقيؤ والإسهال
- السعال الجاف، تقرح الفم، آلم اللسان
- آلم الصدر
- تعب و/أو ضعف غير اعتيادي
- الخفقان وتسرع القلب
- تغييرات في المزاج، تورم، تملل، ارتباك
- مشاكل في النوم
- صعوبات جنسية لدى الرجال
- يجد عدد قليل من الأشخاص أن هذا الدواء يؤثر على حساسية الذوق والشم لديهم.
- إذا شعرت أنك مريض بعد البدء بتناول أقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ، أو إذا لاحظت أي شيء غير عادي أو غير متوقع، أعلم طبيبك أو اطلب مساعدة طبية.

التأثيرات الجانبية الخطيرة، عدد مرات حصولها وكيفية مواجهتها

العارض/التأثير	تحدث إلى الطبيب أو الصيدلي		توقف عن تناول الدواء واتصل بالطبيب أو بالصيدلاني* أو بالصيدلاني*
	إذا كان حاداً فقط	في كل الحالات	
شائع	فرط الحساسية تنفط جلدي، طفح جلدي أو أي تأثير أخر على الجلد أو العينين أو حكاك أو حمى	√	
غير شائع	آلم في البطن	√	
	نقص ضغط الدم إغماء عندما يكون ضغط الدم منخفضاً جداً	√	
	الارتكاسات التحسسية تورم الشفتين أو الوجه أو العنق مع صعوبة في التنفس، التكلّم أو البلع (إشارات الخبز الوعائي). يمكن أن يحصّل أيضاً خبز وعائي معوي يتميز بآلم في البطن (مع أو بدون غثيان أو تقيؤ)	√	
	اضطراب في الكبد تتضمن العوارض الغثيان وفقدان الشهية و التقيؤ مع الحكاك وآلم في أعلى البطن واصفرار الجلد أو العينين (إشارة اليرقان أو التهاب الكبد)	√	

*إذا كنت تعتقد تعاني من التأثيرات الجانبية هذه، من المهم استشارة طبيبك على الفور. ليست لائحة كاملة بالتأثيرات الجانبية. في حال حصول أي تأثيرات غير متوقعة خلال العلاج بأقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ، اتصل بالطبيب أو الصيدلي.

كيفية حفظ الدواء

احفظ أقراص تريetas® كومب 10 ملغ/12.5 ملغ في عبئها الأصلية في حرارة الغرفة بين 15 و 30 درجة مئوية ولا تستعملها بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المدون على العبئة الخارجية. أبق الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

موضب في
بنّا ش.م.ل.، ضبيه - لبنان

بترخيص من

ساتوفي - أفنتس دوتسلاند جي إم بي إيتش

المانيا

تاريخ مراجعة النشرة الأخير: نيسان 2012.

هذا دواء:
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك، وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتبع وصفة الطبيب بدقة، وإرشادات الإستعمال، وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران في الأدوية، فإندها ومخاطرها.
- لا تقطع فترة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر نفس الوصفة دون إستشارة طبيبك.
- احفظ الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال.