إليزون ١,٠٪

فيورات الوميتازون
كريم جلدي

التركيبة: يحتوي كل ١ غم من **إليزون** على:
فيورات الوميتازون ١ ملغم

اقرأ كامل النشرة بعناية قبل البدء باستخدام هذا الدواء.
- احتفظ بالنشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة إضافية، اسأل طبيبك أو الصيدلاني المسؤول.
- هذا الدواء موصوف لك، لا تشاركه مع غيرك حتى لو تشابهت الأعراض.
- تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني المسؤول إذا شعرت بظهور أعراض جديدة أو تفاقمت بعض الأعراض الجانبية.

في هذه النشرة:
١- ما هو **إليزون** و ما هو استعماله.
٢- قبل استخدام **إليزون**.
٣- كيف تستخدم **إليزون**.
٤- الاثار الجانبية المحتملة.
٥- كيف تخزن **إليزون**.
٦- معلومات اضافية.

١- ما هو إليزون و ما هو استعماله:
ينتمي كريم **إليزون** إلى المجموعة الدوائية المعروفة باسم الكورتيكوستيرويدات الموضعية. يتم تصنيفها على أنها «الكورتيكوستيرويدات القوية».
توضع هذه الأدوية على البشرة من أجل الحد من الاحمرار والحكة اللذين يسببها بعض المشاكل الجلد، المعروفة بداء الصدفية أو التهاب الجلد.
الصدفية هو مرض جلدي يؤدي إلى بروز بقع متقشرة ووردية اللون تسبب الحكة في منطقة المرفق والركبة وفروة الرأس ومناطق أخرى من الجسم. أما الالتهاب الجلدي فهو عبارة عن حالة مرضية يسببها تفاعل البشرة مع عوامل خارجية مثل مواد التنظيف، ما يؤدي إلى احمرار البشرة والحكة.

٢- قبل استخدام إليزون.
لا تستخدم إليزون في الحالات التالية:
- إذا كان لديك حساسية (حساسية مفرطة) من فيورات مومیتازون، أو من أي مكون من مكونات **إليزون** الأخرى، أو من أيّة أدوية مشابهة.
- أو كانت لديك مشاكل جلدية أخرى، إذ أن هذا الكريم قد يزيدها سوءا، لا سيما:
- الحد الوردي (مشكلة جلدية تصيب الوجه)
- حب الشباب
- ضمور جلدي (ترقق البشرة)
- التهاب الجلد حول الفم
- حكة في الأعضاء التناسلية
- طفح جلدي بسبب الحفاض
- القرح الجلدية بسبب البرد
-جدري الماء
- الهربس النطاقي
- التأليل
- البشرة المتقرحة
- الجروح
- التهابات البشرة الأخرى

إسأل الطبيب أو الصيدلاني في حال لم تكن متأكدا.

المحاذير والاحتياطات
اتصل بالطبيب إذا ازداد سوء الصدفية لديك ، أو أذا ظهرت دمامل ممتلئة بالصديد تحت الجلد.
اتصل بطبيبك فورا إذا عانيت من عدم وضوح الرؤية أو الاضطرابات البصرية الأخرى.
في حال أصبيت بشرتك بالتهيج أو التحسّس بعد استخدام **إليزون** ، سيكون عليك التوقف عن استخدام **إليزون** وتبليغ الطبيب بالأمر. يجب أن تخبر طبيبك في حال حدوث التهاب في الجلد أثناء استخدام **إليزون**.
الأعرض الجانبية التي قد تحدث مع الكورتيكوستيرويدات المستنشقة أو عن طريق الفم ، قد تحدث أيضا مع الكورتيكوستيرويدات المستخدمة على الجلد، وخاصة في الرضع والأطفال. إذا كنت تستخدم أكثر من الكمية الصحيحة من الكريم و/أو تستخدمها لفترة أطول من الازم، يمكن أن يؤثر هذا على مستويات بعض الهرمونات في الجسم، ولا سيما الرضع والأطفال. في حالات نادرة عند البالغين قد تؤدي التغيرات في مستويات الهرمونات، الى تورم أو انتفاخ الوجه والضعف، والتعب، والدوخة عند الوقوف أو الجلوس.
إذا كان هناك تفاقم في حالتك أثناء الاستخدام ، فاستشر الواصف - قد تكون تعاني من رد فعل تحسسي أو لديك عدوى أو تتطلب حالتك علاجًا مختلفًا.
يجب الامتناع عن التدخين أو الاقتراب من النيران المكشوفة – خطر الإصابة بحروق بالغة.
فالقماش (الملابس، وبياضات السرير، والضمادات، الخ) يحترق بسهولة أكبر بعد اتصاله بهذا المستحضر، ويتسبّب بخطر الحريق. يمكن لغسل الملابس والبياضات أن يخفّف من تراكم المستحضر ولكنه لا يزيله بالكامل.
إذا واجهت تكرارًا لحالتك بعد فترة وجيزة من التوقف عن العلاج، في غضون أسبوعين، فلا تقم بإعادة استخدام المرهم دون استشارة الواصف إلا إذا نصحك الواصف بذلك مسبقاً. إذا تم علاج حالتك وامتد الاحمرار إلى ما بعد منطقة العلاج الأولية عند تكراره وتعرضت لإحساس حارق ، فيرجى طلب المشورة الطبية قبل بدء العلاج مرة أخرى.

٣- كيف تستخدم إليزون:
استخدم دائما **إليزون** بناء على وصفة الطبيب. عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلاني في حال الشك.
استخدام إليزون مع الأطفال
لا يوصى باستخدام **إليزون** مع الأطفال دون عمر السنتين.
الجرعة
مع البالغين والأطفال فوق عمر السنتين، يجب دهن طبقة رقيقة من كريم **إليزون** وتدليكها برفق على المنطقة المصابة من البشرة، مرة واحدة في اليوم.
عليك دائما اتباع التوجيهات التالية عند استخدام إليزون:
- لا تستخدم الكريم على وجهك لأكثر من خمسة أيام.
- لا تستخدم الكريم على الأطفال أو على أي جزء من جسمهم لأكثر من خمسة أيام.
- لا تستخدم الكريم تحت حفاض طفلك إذ أن ذلك يسهل عبور المادة الدوائية من خلال البشرة و قد يسبب بعض الآثار الغير المرغوب بها.
- عليك التأكد من طبيبك قبل تغطية المناطق المعالجة بواسطة ضمادة أو لاصق طبي. يجب عدم تغطية المناطق المعالجة على الوجه بواسطة ضمادة أو لاصق طبي.
- يجب عدم استخدام كمية كبيرة من الكريم على أجزاء كبيرة من الجسم لفترة زمنية طويلة (مثلا، كل يوم لأسابيع أو أشهر عديدة).
- لا تستخدم الكريم في العينين ، بما في ذلك الجفنين، أو من حولهما.

في حال إستخدام كمية زائدة من إليزون:
في حال ابتلعت (أو ابتلع شخص آخر) الكريم من غير قصد، لن يسبب ذلك أي مشكلة. لكن، إذا كنت قلقا، عليك مراجعة طبيبك.
في حال استخدمت الكريم بكمية أكثر من الموصى به أو على مناطق واسعة من جسمك ، قد يؤثر ذلك على بعض هرموناتك. بالنسبة إلى الأطفال، قد يؤثر ذلك على نموهم و تطورهم.
في حال لم تستخدم الكريم بناءا على الوصفة التي أعطيت إليك و استخدمته بوتيرة عالية جدا و/أو لفترة زمنية طويلة ، عليك إخبار طبيبك بذلك.

في حال نسيت استخدام إليزون
في حال نسيت استخدام إليزون في الوقت الصحيح، استخدمه عندما تتذكر و تابع بالوتيرة التي كنت عليها.

في حال توقفت عن استخدام إليزون.
في حال كنت تستخدم إليزون لفترة زمنية طويلة و يبدو أن مشكلة بشرتك تتحسن، عليك ألا تتوقف فجأة عن استخدام الكريم.

في هذه الحالة، قد تلاحظ احمرار بشرتك و قد تلاحظ وخزا أو حرقاً. لتفادي ذلك، عليك التحدث إلى الطبيب الذي سيقلص تدريجيا و تيرة استخدام الكريم حتى ايقاف العلاج بالكامل.

٤- الاثار الجانبية المحتملة.
مثل جميع الأدوية، **إليزون** يمكن أن يسبب آثار جانبية مع أنها قد لا تظهر عند جميع المرضى.
قد يلاحظ بعض الأشخاص أنهم يعانون من بعض الآثار الجانبية التالية بعد استخدام **إليزون**:
ردود فعل تحسسية للبشرة، التهابات الثانوية و البكتيرية،حب الشباب،التهاب مسام الشعر،ترقق البشرة، العلامات الحمراء المرتبطة بالطفح الجلدي الحر،تقدان لون البشرة، الحريق،الوخز، الحكاك،النخز، نمو الشعر المفرط،تلين البشرة و التجعدات الصغيرة (ظهور علامات تمدد الجلد) بالإضافة إلى عدم وضوح بالرؤية.
تفاقل انسحاب الستيرويد: إذا تم استخدامه بشكل مستمر لفترات طويلة ، فقد يحدث تفاعل انسحاب عند إيقاف العلاج ببعض أو كل الميزات التالية: احمرار الجلد الذي يمكن أن يمتد إلى ما بعد المنطقة المعالجة الأولية ، وحرقان أو وخز، وحكة شديدة، تقشير الجلد، ترشيح القروح المفتوحة.

من الآثار الجانبية الأخرى التي قد تظهر عند استخدام الكورتيكوستيرويد الموضعي، البشرة الجافة و تهيج البشرة و التهاب البشرة، و التهاب البشرة من حول الفم، و توسع الأوعية الدموية الصغيرة.
في حال ازدادت خطورة اي من الآثار الجانبية أو في حال لاحظت أي آثار غير مدرجة في هذه النشرة، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلاني.

٥- كيف تخزن إليزون.
- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- يحفظ لدرجة حرارة تصل إلى ٢٥ درجة مئوية.

٦- معلومات إضافية:
المادة الفعالة في **إليزون** هي فيورات الوميتازون.
المكونات الأخرى: زيوت معدنية، لابرافيل ٢١٣٠، توين ٨٠، سبان ٨٠، غليسيريل أحادي ستيرات، البرافين اللين الأبيض،ميثيل بارابين، بروبيل بارابين،بروبيلين غلايكول، كحول السيتاريل و ستيريت ٢٠، ثنائي فوسفات الصوديوم الالماني، حمض الستريك الالماني، مياه عالية النقاوة.

التعبئة: أنبوب ألومنيوم سعة ١٥غم و ٣٠ غم.

إنتاج وتسويق:
شركة عمان للصناعات الدوائية
مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية-سحاب.
عمان، الأردن

المعلومات الأخرى:

الأردن:

مؤسسة الغذاء و الدواء رقم الهاتف: ٠٦٥٦٢٢٠٠٠ الموقع الالكتروني: www.jfda.jo تطبيق الهواتف الذكية: jordan fda نموذج البلاغ الورقي: yellow card

الإمارات العربية المتحدة:

قسم اليقظة الدوائية و اعتمادات الطبية صندوق بريد: ١٨٣٢ رقم الهاتف: ٨٠٠١١١١ البريد الالكتروني: pv@mohap.gov.ae قسم الدواء وزارة الصحة ووقاية المجتمع دبي

المملكة العربية السعودية:

المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية الهيئة العامة للغذاء والدواء- مركز الاتصال الموحد: ١٩٩٩٩ البريد الالكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa الموقع: https://ade.sfda.gov.sa

عُمان

دائرة اليقظة و المعلومات الدوائية مركز سلامة الدواء وزارة الصحة ، سلطنة عمان هاتف: ٢٢٣٥٧٦٨٦ / ٢٢٣٥٧٦٨٧ فاكس: ٢٢٣٥٨٤٨٩ البريد الالكتروني: pharma-vigil@moh.gov.om الموقع الالكتروني: www.moh.gov.om

دول الخليج الأخرى:
الرجاء الاتصال بالمؤسسات والهيئات الوطنية في كل دولة

070203006
AERev. 11/2023