

ألوكلير®

التركيب

يحتوي ألوكلير على عامل تكوين الغشاء بوليفينيل بايروليدون (PVP)، ماء منقى، مالتودكسترين، بروبيلين جليكول، خلاصة الصبار، سوربات البوتاسيوم، بنزوات الصوديوم، هيدروكسي ايثيل سيليلوز، PEG-40، زيت الخروع مهدرج، اديتيت ثنائي الصوديوم، بنزلكونيوم كلوريد، رائحة، ساكرين الصوديوم، حمض الغليسيريكتينك، هيلورينات الصوديوم.

المفعول

ألوكلير هو مستحضر لتخفيف حالات القرحة القلاعية، ألوكلير يحتوي على مواد، تعمل على تكوين غشاء حماية رقيق في الفم وبذلك يعمل على تخفيف الآلام التي تسببها القرحات الفمية وغيرها من الرضوض الخفيفة مثل تلك التي تسببها الوجبات ومشابك الأسنان.

دواعي الاستعمال

يستخدم ألوكلير لتخفيف الآلام التي تسببها القرحة الفمية وغيرها من الرضوض الخفيفة. ألوكلير مع خلاصة الصبار، له خاصية فعل ميكانيكية تعمل على تخفيف الآلام من خلال التصاقه بالغشاء المخاطي، تهدئة جميع أنواع الآفات الفمية، التهاب الفم القلاعي، الآفات الثانوية، الحكّة، الجروح المتقرحة التي تسببها المشابك وأطقم الأسنان الصناعية غير الملائمة. ألوكلير يستخدم أيضا في تخفيف القرحة القلاعية المنتشرة.

الجرعة وطريقة الاستعمال

- إملا غطاء القياس المرفق للحصول على كمية ٥ ملل أو ١٠ ملل.
- إغسل الفم بالسائل لمدة لا تقل عن ٦٠ ثانية.
- تفرغر وابصقه خارجا.
- استخدم حسب الحاجة، لحد أقصى من ٣-٤ مرات يوميا.
- يمكن استخدامه من قبل الأطفال الذين يبلغون من العمر حدا يمكنهم معه التقيد بتعليمات الاستخدام.

مضادات الاستعمال

ألوكلير لا يستخدم للمرضى اللذين لديهم فرط حساسية لأي من المكونات.

التداخلات الدوائية
لا يوجد أي تداخلات مع الأدوية أو أي منتجات أخرى. يمكن استخدام
ألوكلير أثناء الحمل والارضاع.

التأثيرات الجانبية
غير معروفة.

فرط الجرعة
حتى وقت اصدار هذه النشرة لم يقدم تقرير عن أي حالة ابتلاع. ومع هذا
لا يتوقع أعراض جانبية خطيرة في حال حصول مثل هذا الأمر.

الأشكال الصيدلانية
غسول للفم:

ألوكلير متوفر بحجم ١٠٠ ملل و ٦٠ ملل في زجاجة معتمدة مع غطاء أمان
وغطاء قياس مرفق.

SINCLAIR

شركة أدوية الحكمة عمان - الأردن



لا تترك الأدوية في متناول الأطفال
ZINACR-AEF-10/2009