

# أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠



نشرة معلومات للمريض  
أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ ميلigram

أقراص مغوية مغلفة تحتوي على ١٠٠ ميلigram حامض أسيتيل السالسيليك

- الرجاء قراءة نشرة معلومات المريض بالكامل وبعناية، لأنها تحتوي على معلومات هامة تخص تناول الدواء.
- هذا الدواء يصرف بدون تذكرة طبية. للحصول على أحسن النتائج العلاجية الممكنة، يجب برغم ذلك تناول أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ كما هو مذكور في تعليمات الاستخدام.
- احتفظ بشرة معلومات المريض، فقد ترغب في قرائتها مرة أخرى فيما بعد.
- إذا كان لديك أية أسئلة إضافية أو تحتاج إلى نصيحة فالرجاء استشارة الصيدلي.
- إذا أصبحت حالتك أسوأ أو لم تتحسن، في أيٍ من هذه الحالات يجب عليك استشارة الطبيب.

ماذا تحتوي هذه النشرة؟

- ما الذي تحتاج إلى لحماية القلب ١٠٠ وفيه يستخدم؟
- كيفية استخدام أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠
- الآثار الجانبية المحتملة

٤. الآثار الجانبية المحتملة

٥. كميات العبوة ومعلومات إضافية

٦. ملخص المحتوى

- ما هو أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ وفيم يستخدم؟  
أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ يحتوي على العنصر الدوائي الفعّال حمض أسيتيل السالسيليك وهو يمنع تجلط (تختّر) الصفائح الدموية حتى في الترkitات الصغيرة، ويسهل التغليف المعمي، فإن الفرق يذوب في الأمعاء الدقيقة، لذلك فإن أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ لا يمكّن تناوله على طفالة المعدة.
- الروائية من المثار الشرياني بعد العمليات الجراحية التي تشمل الأوعية التاجية (عملية تحويلية وازالة تضييق الأوعية التاجية).
- الروائية من المطارات الدموية (جلطات الدم في الأوعية التاجية) (نوبات افتراق عالقة لها (TIA) وارتفاع ضغط الدم في الماء الوريدي) وذلك تزيف في الجهاز الهضمي وقرح معدية معوية، والذي نادراً ما قد يؤدي إلى حدوث حالات انفجارات.
- الروائية من احتشاء عضلة القلب في المرض بعد حدوث الماحل العالقة لها (نوبات افتراق عالقة لها) (TIA) وذلك تزيف في الجهاز الهضمي وقرح معدية معوية، والتي ينبع من ارتفاع ضغط الدم في الماء الوريدي.
- علاج احتشاء عضلة القلب العالقة غير المتنبطة.
- الروائية من المثار الشرياني بعد العمليات الجراحية في الأوعية الدموية.

لا ينبع تناول أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ لفترة ممتدة من نفس الوقت أو بجرعات أعلى دون استشارة الطبيب.

ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟  
إذا أصبت بتناول تناول أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ في الحالات الآتية.

- أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ يحتوي على مركبات، أو عاليات من مشاكل في التغذية أو مصادر الالتهاب التي تسمى الأدوية المصادة للالتهابات غير السيرروبيدي.
- إذا كان لديك مرض ضموري تزداد للزفاف.
- إذا كنت تعاني من قشر شديد بالذيل أو الكلى.
- إذا كنت تعاني من قشر شديد بالقلب.
- إذا كان علىك تناول بيوبروكستين في نفس الوقت بجرعة تزيد عن ١٥ مجم في الأسبوع.
- فيما ينبع تناول أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ في الحالات الآتية.

من الممكن أن تحدث فرحة في الجهاز الهضمي العلوي في أثناء العلاج بأسيبيرين لحماية القلب ١٠٠. كما يمكن أن يحدث تزف في حالات نادرة أو انقباض (انقباض معدى أو معموي) في حالات فردية. من الممكن أن تحدث هذه المضاعفات في أي وقت في أثناء العلاج دون إرادة أو معرفة. تصل طببك إذا سعرت بالآن في المعدة وبيه وبين تناول لها الدواء وبين تناول لها الداء.

من الممكن أن يؤدي تناول أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ إلى ضرر بظائف الكلية، إذا كنت تعاني من مشاكل في ارتفاع ضغط الدم أو تراكم مبررات البول، مما يتطلب انتزاع تحويل الأجيونتشين (إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب أو الكلية، إذا كنت تعاني من مشاكل في ارتفاع ضغط الدم على سبيل المثال).

يجب أن يؤخذ الدواء فقط وفق تعليمات صاربة من الطبيب في حالة اضطرابات الجهاز الهضمي المزمنة أو في حالة مرض تادر في خلايا الماء الوريدي. يسمى «عور نازع» (غير وظيفي) (فوسفات) وكذلك في حالة العلاج بمضادات التخثر («مضادات الدم») أو عوامل خفض ضغط الدم (أدوية خفض ضغط الدم المترافق).

لا ينبع باستخدام أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ للأطفال والمرأهين الذين دون سن ١٨.

١٠٠ فقط وفقاً لتعليمات الطبيب وبخيار ثان فقط. استشر الطبيب فوراً إذا حدث اضطرابات في الوعي مع فيء في أثناء هذه الأمراض أو بعد أن تهدأ.

تناول أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ في نفس الوقت مع أدوية السكري (مثل: الأنسولين، سفونيل بوريا) من الممكن أن يؤدي إلى

ينبع أن تحدث إلى طببك إذا كنت تتناول أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ في نفس الوقت مع أي أدوية مُسكتة أو مضادة للالتهاب (مثل: المكثفات العالقة الغالبة بيوبروفين أو نابروكسين)، لأن هذه الأدوية قد تضعف من تأثير أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠.

إذا تم تناول ميتواميزول (مثبط دوائي لعلاج الألم والحرقان) في نفس الوقت مع أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠، فقد يقلل من تأثير حمض أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ على تراكم الصفائح الدموية (تكل الصفائح الدموية) وتكون الحالة. إنك يجب الحذر عند استخدام هذا المنتج.

من الممكن أن يقل تأثير أدوية القشر (بيوبروكستين) ومترايل (البيوتين) أو ميتواميزول (والتي يتم تناولها على سبيل المثال لعلاج التهاب المفاصل المزمن) أطراف أيضاً قسم «لا

تناول أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ في الحالات الآتية»، فقد تفاقم التأثيرات العكسية. في حالة مرض تادر في خلايا الماء الوريدي، ومرققات الدم والبيوكسجين، ومستحضرات الليتيوم المضادة للأكتينات. فإن تأثير هذه الأدوية قد يزداد. كما يمكن أن تزداد التأثيرات

العصبية لهذه المنتجات الطبية.

إذا تم تناوله بالتزامن مع منتجات الكورتيزون أو الكحول أو المنتجات الدوائية من مجموعة شمسية لمثبتات إعادة انتصاف السيرروبيدي، فإن أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ قد يزيد من خطر التهاب المفاصل المزمن، مما أن الاستخدام المتزامن لأنسيبيرين لحماية

القلب ١٠٠ مع منتجات الكورتيزون أو الكحول قد يزيد من خطر الإصابة بالقرحة المعدية المعوية.

حمض أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ بعد التناول ليسه طبيعية مثل في الإنسان.

يعلو هذا الدواء على أقل من ١ مللي مول من الصوديوم (٢٣ مجم) بكل قرص، وهذا يعني أنه «حال من الصوديوم» بشكل أساسي.

أble طببك أو الصيدلي إذا.

كنت مصابة أي نوع من الحساسية، أو

اسأل أو أبلغ طببك أو طبيب الأسنان عن استخدام الدواء قبل التدخلات الجراحية.

هل يمكن تناول أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ في أثناء فترة الحمل والرضاعة الطبيعية؟

إذا أصبحت حاملاً أو تخططين للحمل، يجب عليك التحدث إلى طببك قبل تناول أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠، إذا بدأت أو استمررت في العلاج بأسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ في أثناء الحمل، يجب طببك تعلميات طببك، فإن هذا ممكن فقط في ظل الامتناع المثاب.

الخطر المحتمل على المقابل الذي لم يولد بعد، وخطر حدوث تزيف وتآكل متحمّل في موعد الولادة.

إذا كنت تتناولين أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠، اعتماداً من الأمبوغ ٢٠ من الحمل، فقد يتسبب ذلك في تضييق الأوعية الدموية (القناة

الرشانية السالكية) في قلب طفلك. إذا كنت بحاجة إلى تناول أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠، فقد يوصي طببك بمرأبة إضافية.

لا ينبع تناول أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ في أثناء الرضاعة الطبيعية ما لم يخبرك طببك بذلك صراحة.

## ٣. كيفية استخدام أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠

إذا لم يصف الطبيب خلاف ذلك: للوقاية من المثار الشرياني دون إجراء جراحة تحويلية للأوعية التاجية وبعد التوسيع (توسيع بالون) للأوعية التاجية المتضيقة (مصابية بالتضيق):

١٠٠ مجم يوماً للوقاية من المثار الشرياني بعد إجراء جراحة تحويلية للأوعية التاجية وبعد التوسيع (توسيع بالون) للأوعية التاجية المتضيقة (المصابية بالتضيق):

١٠٠ مجم يوماً للوقاية من السكتات الدماغية:

١٠٠ مجم يوماً للوقاية من المثار الشرياني بعد احتشاء عضلة القلب وعلاج النوبة الصردية غير المستقرة:

١٠٠ مجم يوماً للوقاية من التوبات القلبية في المرضى بعد أن قرر الطبيب وجود مخاطر عالية:

١٠٠ مجم يوماً من المستحسن تناول الأقراص مع القليل من السوائل قبل تناول الطعام بنصف ساعة على الأقل. اشرب حوالي نصف إلى ١ كوب من

السائل بعد ذلك. لا ينبع حقن الأقراص، أو كسرها أو مضغها.

إذا أصبحت حالات احتشاء عضلة القلب الحاد، في المستشفى، فسوف يتم إعطاؤك ٢٠٠ - ٣٠٠ مجم من حمض أسيتيل السالسيليك عن طريق الوريد. وبلا من ذلك، قد يتم إعطاؤك مستحضر حمض أسيتيل السالسيليك سريع الامتصاص (شكل غير معوي) والذي يمكنه

أن تتناوله عن طريق الفم، أما بالطحون أو المضغ لكي يتم امتصاص المكونات الدوائية الفعالة بسرعة أكبر. اعتماداً من اليوم التالي

سوف يقر الطبيب المعالج الجرعة ومدة الاستخدام.

لا تغير الجرعة الموصوفة من تناول نفسك، تحدث إلى طببك أو الصيدلي إذا كنت تعتقد أن تأثير الدواء خفيف جداً أو شديد (قويء جداً).

استشر الطبيب على الفور في حالة وجود تناول غير منضبط (جرعة زائدة). طنين الأذن و/أو التعرق قد يشير إلى وجود جرعة زائدة.

لا ينبع استخدام أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ للأطفال والمرأهين الذين دون سن ١٨.

## ٤. الآثار الجانبية المحتملة

شائعة (تؤثر على مستخدم واحد إلى ١٠٠ مستخدمين من بين كل ١٠٠ مستخدم):

مشاكل المعدة هي أحد الآثار الجانبية الشائعة.

غير شائعة (تؤثر على مستخدم واحد إلى ١٠٠ مستخدمين من بين كل ١٠٠ مستخدم):

تم الإبلاغ عن حدوث زباد، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وغثيان، وقيء، وآهال في بعض الأحيان.

نادرة (تؤثر على مستخدم واحد إلى ١٠٠ مستخدمين من بين كل ١٠٠ مستخدم):

في حالات نادرة، قد تحدث تفاعلات فرط الحساسية (مثل: تورم الجلد والأعصاب المخاطية (مثل انسداد الأنف)، والطفح الجلدي، وضيق

التنفس، وأخافض ضغط الدم) يصل إلى الصدمة) وكذلك تزيف في الجهاز الهضمي وقرح معدية معوية، والذي نادراً ما قد

يؤدي إلى حدوث حالات انفجارات.

فضلاً عن احتلال وظائف الكبد والكلوي، وظيفتين، وضغط البصر، وضغط السمع، وحالات من الارتجاع، وفقد (أنيبيا) بسبب نقص الحديد

في حالات نادرة إلى تأثير جذل، تم الإبلاغ عن حالات تزيف شديد، خاصة في المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير

المتوافق، أو الذين يعالجون بـ «مرفات الدم» (مضادات التخثر) بالتزامن، ومن الممكن أن تكون هذه الحالات مهددة للحياة في

حالات مفجدة.

قد تتضمن الآثار الجانبية الشائعة جذل، ملائمة لليل، متلازمة فرط الماء، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع

جهازية، وانخفاض نسبة السكر في الدم، وأضطرابات في التوازن الحمضي الفاعلي بالإضافة إلى متلازمة راي عند الأطفال.

كما لو حظت حدوث كدمات ونزيف في الأنف ونزيف في اللثة ونزيف في الجهاز البولي التناسلي ونزيف بعد التدخلات الجراحية. ومن

الممكن أن يحدث إطالة في وقت التزف.

معدل التكرار غير معروف (لا يمكن تقديره من واقع البيانات المتاحة)

تم الإبلاغ عن وجود تغيرات في حذار الأمعاء، خاصة مع الاستخدام طول الأمد.

يجب أن يؤخذ الدواء طفلاً وفق تعليمات الطبيب واستشارة الطبيب إذا ظهرت أي علامات لتفاعلات فرط الحساسية.

في حالة حدوث بزاز آسود أو قيء دموي في أثناء العلاج، يجب إيقاف المنتج الدوائي، ومن الممكن أن تزداد هذه التغيرات.

إذا ظهرت لديك أيه آثار جانبية، ينبع إيقاع طببك أو الصيدلي. يتصل ذلك على وجه التحديد بآثار جانبية مهددة للحياة غير المدرجة في هذه النشرة.

### للإبلاغ عن أي (أي) آثار (أثار) جانبية:

قسم الاستخدام الرشيد والبيوطة الدوائية-مؤسسة الغذاء والدواء بالأردن

هاتف: ٠٦-٤٦٠٢٠٠٠

فاكس: ٠٦-٥٦٢٦٣٢٥

البريد الإلكتروني: jpc@jfda.jo

الصفحة الإلكترونية: <http://www.jfda.jo>

٥. كيفية تخزين أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠

يحظى بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.

يحظى في درجة حرارة لا تزيد عن ٢٥ درجة مئوية.

لا تستخدمن هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة بعد EXP».

سوف يعطيك طببك أو الصيدلي معلومات أكثر تفصيلاً. فليهما معلومات مفصلة لمتخصصي الرعاية الصحية.

٦. محتويات العبوة ومعلومات إضافية

ما هي محتويات أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠؟

يحتوي الفرط الواحد من أسيبيرين لحماية القلب ١٠٠ المغلف بالغطاء المعوي على:

المادة الفعالة: ١٠٠ مجم من حمض أسيتيل السالسيليك

المكونات الأخرى: ثنا الترثة، مسحوق السليولوز، كوبوليمر حمض الميوكربيليك وإيثيل الأكريلات (١:١)، E487، بولي سوربات، ٨٠، لوريل سلفات الصوديوم (يعادل صوديوم ١٠٠ مجم، تلك (E553b)، تراي إيثيل سيرات

ما هي أحجام العبوات المتوفرة؟

أقراص مغوية مغلفة ١٠٠ مجم، ٢٠، ٣٠، ٤٠.

قد لا يتم تسويق جميع العبوات في الأسواق.

مصنع البلاك: باير آيه جي، ليفركوزن، المانيا.

المصنف: باير آيه فايلد جي إم بي آيش، المانيا لصالح باير كتسيمور كير آيه جي، بازل، سويسرا.

تمت آخر مراجعة للنشرة في أغسطس ٢٠٢٣

مجلس وزراء الصحة العرب

اتحاد الصيادلة العرب

باير

90130913