ليفوفلوكس® ٥ مغ/مل

ليفوفلوكساسين

٥ مغ /مل، محلول للتسريب الوريدي

اقرأ النشرة كاملة بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى
- إذا كان لديك المزيد من الأسئلة فاسأل طبيبك أو الصيدلي
- تم وصف هذا الدواء لك أنت. لذا لا تنصح به أشخاصا آخرين ، فقد يؤذيهم حتى وإن كانت لديهم أعراض مماثلة لك.
- إذا أصبحت أي من الأعراض الجانبية خطيرة أو لاحظت أية أعراض جانبية غير مذكورة بهذه النشرة فيرجى استشارة طبيبك أوالصيدلي.

في هذه النشرة:

١. الأعراض الجانبية الخطيرة

٢. ما هو ليفوفلوكس ٥ مغ/مل وماهي دواعي استعماله.

٣.قبل القيام بتناول اواستعمال ليفوفلوكس ٥ مغ /مل.

٤.طريقة إستخدام ليفوفلوكس٥ مغ/مل.

٥. الاعراض الجانبية.

٦.ظروف تخزين ليفوفلوكس ٥ مغ/مل.

٧. معلومات إضافية.

١. الأعراض الجانبية الخطيرة

توقف عن تعاطي ليفوفلوكس ٥ مغ/مل واستشر طبيبك أو الممرضة فورا إذا لاحظت الأعراض الجانبية التالية:

نادر جدا (قد يصيب ١ من كل ١٠٠٠٠ شخص)

- عندك رد فعل تحسسي. قد تتضمن العلامات: الطفح والتورم ومشاكل التنفس وتورم الشفاه والوجه والحلق واللسان

توقف عن تعاطي ليفوفلوكس ٥ مغ/مل واستشر طبيبك أو الممرضة فورا إذا لاحظت الأعراض الجانبية الخطيرة التالية – قد تحتاج علاج طبي فوري:

نادر (قد يصيب ١ من كل ١٠٠٠ شخص)

- الإسهال الشديد والذي قد يحتوي على دم فيه، وغالبا ما يصاحبه تقلصات بالمعدة وارتفاع في درجة الحرارة. قد تكون هذه علامات على مشاكل جديدة بالأمعاء
- ألم والتهاب في الأوتار أو الأربطة والتي قد تصل للتمزق. ويعتبر وتر أخيليس أكثرها عرضة لذلك.
- نوبات الصرع.

نادر جدا (قد يصيب ١ من كل ١٠٠٠٠ شخص)

الحرقان والتنميل والخدر. قد تكون تلك علامات ما يعرف بالاعتلال العصبي.

غير معروف (لا يمكن تقدير تكرار حدوث تلك الأعراض من المعلومات المتاحة)

- طفح جلدي حاد قد يتضمن بثور أو قشور من الجلد حول الشفاه والأعين والفم والأنف والأعضاء التناسلية.
- فقدان الشهية واصفرار الجلد والأعين وبول داكن اللون والحكة وألم البطن.

قد تدل هذه العلامات على مشاكل بالكبد.

إذا شعرت بضعف في نظرك أو أي اختلال آخر بالعين خلال تعاطيك لليفوفلوكس ٥ مغ/مل ، فاستشر أخصائي عيون فورا.

٢. ما هو ليفوفلوكس ٥ مغ/مل وماهي دواعي استعماله

إن اسم دوائك هو ليفوفلوكس ٥ مغ/مل محلول للتسريب الوريدي.

يحتوي ليفوفلوكس ٥ مغ/مل محلول للتسريب الوريدي على دواء يسمى ليفوفلوكساسين.

وهو ينتمي لمجموعة من الأدوية تسمى المضادات الحيوية.

ليفوفلوكساسين هو مضاد حيوي من مجموعة الكوينولون، وهي تؤدي عملها بقتل البكتيريا المسببة للعدوى في جسمك.

يمكن استخدام ليفوفلوكس ٥ مغ/مل محلول للتسريب الوريدي في علاج العدوى في:

- الرئة، لدى الأشخاص المصابين بالالتهاب الرئوي.
- المجرى البولي، بما في ذلك الكليتين أو المثانة
- غدة البروستاتا، إذا كنت تعاني من عدوى طويلة المدى.
- الجلد والأنسجة بأسفله، بما في ذلك العضلات. وتسمى في بعض الأحيان بالأنسجة الرخوة.

في بعض الأحيان يتم استخدام ليفوفلوكس ٥ مغ/مل محلول للتسريب الوريدي لتقليل فرص الإصابة بمرض الرئة المسمى بالجمرة الخبيثة أو تدهور المرض بعد التعرض للبكتريا المسببة للجمرة الخبيثة.

٣. قبل القيام بتناول اواستعمال ليفوفلوكس ٥ مغ /مل

الخبيثة أو تدهور المرض بعد التعرض للبكتريا المسببة للجمرة الخبيثة.

أ. موانع استعمال ليفوفلوكس ٥ مغ/مل

لا تتناول هذا الدواء وأخبر طبيبك إن:

- كنت مصاب بالحساسية من مادة الفلوكساسين أو أي مضاد حيوي آخر من فئة الكينولون مثل الموكسيفلوكساسين أو السيبروفلوكساسين أو الأفلوكساسين أو أيا من مكونات الدواء الأخرى (المدرجة بالفقرة السادسة).
- كانت أعراض رد الفعل التحسسي تحتوي على ما يلي: طفح جلدي أو تورم أو صعوبة التنفس أو تورم الشفاه أو الوجه أو الحلق أواللسان.
- أصبت بالصرع قبل ذلك.
- عانيت من قبل من مشاكل بالأوتار مثل التهاب الأوتار الناتج عن العلاج "بمضادات حيوية من فئة الكينولون". الوتر هو الحبل الذي يربط عضلاتك بالهيكل العظمي.
- كنت طفلا أو مراهقا في طور النمو.
- كنت حاملا أو في سبيلك للحمل أو تظنين أنك حامل.
- كنت ترضعين رضاعة طبيعية.

لا تتناول هذا الدواء إذا انطبقت عليك أي من المحاذير السابقة.

وإن لم تكن متأكدا، فاستشر طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي قبل تعاطي ليفوفلوكس ٥ مغ/مل .

ب. الاحتياطات عند استعمال ليفوفلوكس ٥ مغ/مل

تحدث إلى طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي قبل تناول دوائك إن:

- كان عمرك ٦٠ عاما أو أكثر.
- كنت تتعاطى الكورتيزون، والذي يسمى في بعض الاحيان بالستيرويد (أنظر فقرة "الأدوية الأخرى وليفوفلوكس ٥ مغ/مل ").
- عانيت من قبل من نوبة صرع.
- عانيت من ضرر بالمخ نتيجة جلطة أو أي إصابة أخرى للمخ.
- كان لديك مشاكل بالكلى.
- كان لديك ما يسمى "عوز نازعة هيدرجين الجلوكوز -٦-فسفات (الفوال)"
- كان من المحتمل أن تعاني من مشاكل خطيرة بالدم في حالة تناول هذا الدواء.
- عانيت قبلا من اعتلال السلامة العقلية.
- عانيت قبلا من أمراض القلب.

يجب توخي الحذر عند تناول هذا الدواء إذا ولدت باستطالة فاصل QR أو كان في اسرتك من يعاني منه (والذي يظهر في رسم القلب، وهو التخطيط الكهربي للقلب) أو لديك اختلال توازن الأملاح بالدم (وخاصة تدني مستوى البوتاسيوم أو الماغنيسيوم في الدم) أو لديك بطء شديد في وتيرة ضربات القلب أو لديك قلب ضعيف (اعتلال قلبي) أو لديك سابقة من النوبة القلبية (احتشاء عضلة القلب) أو إن كنت امرأة أو مسن أو تتناول أية أدوية أخرى تتسبب في تغيرات غير طبيعية في التخطيط القلبي (أنظر فقرة "العلاجات الأخرى وليفوفلوكس ٥ مغ/مل ").

- إذا كنت مصابا بداء السكري
- إذا عانيت من قبل من مشاكل بالكبد.
- إذا كنت مصابا بمرض وهن العضلات الوبيل.

إذا لم تكن متأكدا أن أيا من المحاذير السابقة ينطبق عليك، تحدث إلى طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي قبل تعاطي ليفوفلوكس ٥ مغ/مل .

ج .التداخلات الدوائية من أخذ هذا المستحضر مع أي أدوية أخرى أو أعشاب أو مكملات غذائية

- أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتعاطى أو تناولت مؤخرا أو قد تتناول أية أدوية أخرى. لأن ليفوفلوكس ٥ مغ/مل قد يؤثر على فاعلية الأدوية الأخرى. وقد تؤثر أيضا بعض الأدوية على كيفية عمل ليفوفلوكس ٥ مغ/مل .

وبشكل خاص أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أيا من الأدوية التالية.

هذا لأنها قد تزيد من احتمالات تعرضك للآثار الجانبية عند تناول ليفوفلوكس ٥ مغ/مل :

- الكورتيزونات، المسماة في بعض الأحيان بالستيرويد—المستخدمة لعلاج الالتهابات. فقد تصبح أكثر عرضة للالتهاب و/أو تمزق الأوتار.
- الوارفرين – المستخدم في زيادة سيولة الدم.

فقد يزيد من احتمالية تعرضك للنزيف.

قد يحتاج طبيبك لعمل تحاليل دم بصورة منتظمة لمتابعة قدرة ٦ دمك على التجلط.

- الثيوفيللين – المستخدم لمشاكل التنفس.

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بنوبة صرع إذا تناولته مع الليفوفلوكس ٥ مغ/مل .

- مضادات الإلتهابات اللاستيرويدية – المستخدمة لعلاج الألم والالتهابات مثل الاسبرين والإيبوبروفين وفينوبوفين وكيتوبروفين وإندوميثاثين. قد تصبح أكثر عرضة للإصابة بنوبات الصرع إذا تناولت أحد هذه الأدوية مع الليفوفلوكس ٥ مغ/مل .
- سيكلوسبورين – الذي يستخدم بعد زراعة الأعضاء. فقد تصبح أكثر عرضة للآثار الجانبية للسيكلوسبورين.
- الأدوية المعروفة بالتأثير على ضربات القلب. وهذا يتضمن أيضا الادوية المستخدمة لعلاج اختلال وتيرة ضربات القلب (مثل الكوينيدين والهيدروكوينيدين وديزوبراميد وسوتالول ودوفيليتيد وإيبوتيليد وأميودارون) وأدوية الاكتئاب (مضادات الاكتئاب من فئة الترايسايكليك مثل أميتريبتلين وإميبرامايد) وللأمراض النفسية (مضادات الذهان) وأدوية العدوى البكتيرية (المضادات الحيوية من فئة المايكروليد مثل إريثرومايسين وأزيسرومايسين وكلاريثرومايسين).
- البروبينسيد– يستخدم لعلاج النقرس. قد يريد طبيبك استخدام جرعة أقل إذا كانت لديك مشاكل بالكلي.
- سيميتدين – يستخدم لعلاج القرح وحرقة المعدة. قد يريد طبيبك استخدام جرعة أقل إذا كانت لديك مشاكل بالكلى.

أخبر طبيبك إذا انطبقت عليك أحد المحاذير أعلاه.

اختبار البول للمواد الأفيونية

قد تعطي اختبارات البول نتائج "إيجابية زائفة" لمجموعة علاج الألم القوية المسماة (المواد الأفيونية) في الأشخاص الذين يتعاطون ليفوفلوكس ٥ مغ/مل .

إذا وصف لك طبيبك عمل اختبار بول، فأخبره أنك تتعاطى ليفوفلوكس ٥ مغ/مل .

اختبار الدرن

هذا الدواء قد يسبب نتيجة "إيجابية زائفة" لبعض الاختبارات المعملية التي تبحث عن البكتريا المسببة للدرن.

ه. الحمل والرضاعة

لا تتناولين هذا الدواء إذا كنت:

- حاملا أو على وشك الحمل أو تظنين أنك قد تكونين حاملا.
- ترضعين رضاعة طبيعية أو تخططين لذلك.

و. تأثير ليفوفلوكس ٥ مغ/مل على القيادة واستخدام الآلات

قد تتعرض لآثار جانبية بعد تناول هذا الدواء منها الإحساس بالدوخة والنعاس والدوار وتغيرات بنظرك.

بعض هذه التغيرات تؤثر على قدرتك على التركيز وسرعة استجابتك.

لا تقود السيارة أو تمارس أي عمل يحتاج درجة عالية من الانتباه.

ز. معلومات هامة حول بعض مكونات ليفوفلوكس ٥ مغ/مل

ليفوفلوكس ٥ مغ/مل محلول للتسريب الوريدي يحتوي على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على٨٤٠ مغ صوديوم في كل جرعة تقدر بـ ٥٠٠ مغ ليفوفلوكساسين. يجب أخذ هذا الأمر بالاعتبار في حالة المرضى الذين يتبعون حمية غذائية للتحكم بالصوديوم.

4. طريقة إستخدام ليفوفلوكس٥ مغ/مل.

كيف يعطى ليفوفلوكس ٥ مغ/مل ؟

- ليفوفلوكس ٥ مغ/مل محلول للتسريب الوريدي هو مستحضر دوائي للاستخدام بالمستشفيات.
- وسيتم إعطاؤه لك بواسطة الطبيب أو الممرضة من خلال الحقن. هذه الحقنة سيتم ضخها في أحد أوردتك على مدى فترة من الوقت (وتسمى التسريب الوريدي).
- لحقن ٥٠٠ مغ ليفوفلوكس ٥ مغ/مل محلول وريدي فإن وقت التسريب يجب أن يكون ٦٠ دقيقة أو يزيد ويجب مراقبة نبض قلبك وضغط دمك جيدا

ضغط الدم. إذا انخفض ضغط دمك بشكل ملحوظ خلال الحقن فسيتم إيقافه فورا.

ذلك لأن من الآثار الجانبية المحتملة التي لوحظت خلال حقن مثل ذلك المضاد الحيوي تسارع نبض القلب بشكل غير معتاد وانخفاض

ما مقدار ما يعطى من ليفوفلوكس ٥ مغ/مل للتسريب الوريدي؟

إذا لم تكن متأكدا من أسباب اعطائك ليفوفلوكس ٥ مغ/مل أو لديك أية أسئلة عن مقدار ما تأخذه من ليفوفلوكس ٥ مغ/مل فتحدث لطبيبك أو الممرضة أو الصيدلي.

- سيقرر طبيبك مقدار ليفوفلوكس ٥ مغ/مل الذي يجب اعطاؤه لك، وستعتمد الجرعة على نوعية العدوى التي أصبت بها ومكانها في جسمك
- تتحدد مدة علاجك وفقا لمدى خطورة العدوى.

البالغون وكبار السن

- الالتهاب الرئوي: ٥٠٠ مغ مرة واحدة أو مرتان باليوم.
- عدوى المجرى البولي (بما في ذلك كليتاك والمثانة): ٥٠٠ مغ مرة باليوم.
- عدوى غدة البروستاتا: ٥٠٠ مغ مرة باليوم.
- عدوى الجلد والأنسجة أسفله بما في ذلك العضلات: ٥٠٠ مغ مرة أو مرتان باليوم.

البالغون وكبار السن الذين يعانون من مشاكل بالكلى

قد يحتاج طبيبك لإعطائك جرعة أقل.

الأطفال والمراهقون

يجب عدم إعطاء هذا العلاج للأطفال والمراهقين.

أحم بشرتك من أشعة الشمس

بتعد عن أشعة الشمس المباشرة خلال تعاطي هذا الدواء ولمدة يومين بعد التوقف عن استعماله. هذا لأن الجلد سيصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس وقد يُصاب بالحروق أوالتنميل أو البثور الشديدة إذا لم تراعي الاحتياطات التالية:

- أحرص على استخدام كريم شمس عالي الوقاية.
- دوما أرتدي قبعة وملابس تغطي ذراعيك وساقيك.
- تجنب حمامات اكتساب السمرة.

أ. الجرعة الزائدة من ليفوفلوكس مغ/مل .

من غير المحتمل أن يعطيك طبيبك أو الممرضة جرعة زائدة من الدواء.

وسيراقب طبيبك أو الممرضة تقدمك وسيتحققون من الدواء الذي يتم اعطاؤه لك.

دوما اسأل إذا لم تكن متأكدا من سبب تناولك لجرعة من العلاج.

تعاطي الكثير من ليفوفلوكس ٥ مغ/مل قد يسبب أي من الأعراض الآتية:

نوبات الصرع والإحساس بالارتباك والدوخة وتراخي الوعي والرعشة ومشاكل القلب – مما يؤدي لدقات قلب غير متساوية كما يسبب الغثيان.

ب. نسيان تناول جرعة ليفوفلوكس ٥ مغ/مل

سيكون لدى طبيبك أو الممرضة التعليمات عن وقت إعطائك هذا الدواء. ومن غير المحتمل ألا يتم إعطاؤك الدواء كما وصف الطبيب. ومع ذلك فإذا ظننت أنك قد فاتتك جرعة فأخبر طبيبك أو الممرضة.

ج. التوقف عن تناول ليفوفلوكس ٥ مغ/مل

سيستمر طبيبك أو الممرضة في إعطاؤك ليفوفلوكس ٥ مغ/مل ، حتى إذا شعرت بتحسن.

إذ تم إيقافه مبكرا فقد تعود العدوى وقد تسوء حالتك أو قد تصبح البكتريا مقاومة للدواء.

بعد عدة أيام من العلاج بمحلول التسريب الوريدي قد يقرر طبيبك الانتقال إلى استخدام الأقراص من هذا الدواء لإكمال برنامج العلاج.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة عن استخدام هذا الدواء، فاستشر طبيبك أو الممرضة أو الصيدلي.

٥. الاعراض الجانبية

مثل جميع الأدوية، يمكن لهذا الدواء أن يتسبب في آثار جانبية رغم انها لا تصيب الجميع.

هذه الآثار عادة ما تكون ضعيفة أو معتدلة وغالبا ما تختفي بعد وقت قصير.

توقف عن تعاطي ليفوفلوكس ٥ مغ/مل واستشر طبيبك أو الممرضة فورا إذا لاحظت الأعراض الجانبية التالية:

نادر جدا (قد يصيب ١ من كل ١٠٠٠٠ شخص)

- عندك رد فعل تحسسي. قد تتضمن العلامات: الطفح والتورم ومشاكل التنفس وتورم الشفاه والوجه والحلق واللسان.

توقف عن تعاطي ليفوفلوكس ٥ مغ/مل واستشر طبيبك أو الممرضة فورا إذا لاحظت الأعراض الجانبية الخطيرة التالية – قد تحتاج علاج طبي فوري:

نادر (قد يصيب ١ من كل ١٠٠٠ شخص)

- الإسهال الشديد والذي قد يحتوي على دم فيه، وغالبا ما يصاحبه تقلصات بالمعدة وارتفاع في درجة الحرارة. قد تكون هذه علامات على مشاكل جديدة بالأمعاء.
- ألم والتهاب في الأوتار أو الأربطة والتي قد تصل للتمزق. ويعتبر وتر أخيليس أكثرها عرضة لذلك.
- نوبات الصرع.

نادر جدا (قد يصيب ١ من كل ١٠٠٠٠ شخص)

- الحرقان والتنميل والخدر. قد تكون تلك علامات ما يعرف بالاعتلال العصبي.

غير معروف (لا يمكن تقدير تكرار حدوث تلك الأعراض من المعلومات المتاحة)

- طفح جلدي حاد قد يتضمن بثور أو قشور من الجلد حول الشفاه والأعين والفم والأنف والأعضاء التناسلية.
- فقدان الشهية واصفرار الجلد والأعين وبول داكن اللون والحكة وألم البطن

قد تدل هذه علامات على مشاكل بالكبد.

إذا شعرت بضعف في نظرك أو أي اختلال آخر بالعين خلال تعاطيك لليفوفلوكس ٥ مغ/مل ، فاستشر أخصائي عيون فورا.

أخبر طبيبك إذا اشتدت أي من الآثار الجانبية التالية أو استمرت لأكثر من عدة أيام:

شائع (يصيب أكثر من ١ في كل ١٠ أشخاص)

- مشاكل النوم.
- الصداع والشعور بالدوخة.
- الغثيان والقيء والإسهال.
- زيادة بعض إنزيمات الكبد في الدم.
- حساسية في موضع التسريب الوريدي.
- التهاب الوريد.

غير شائع (قد يصيب أكثر من ١ من كل ١٠٠ شخص)

- تغير عددي للبكتريا والفطريات الأخرى،
- العدوى بالفطر المسمى كانديدا الذي قد يحتاج لعلاج
- تغير عددي في كرات الدم البيضاء يظهر في نتائج بعض تحاليل الدم (انخفاض عدد كرات الدم البيضاء بالدم وارتفاع اليوزينيات في الدم)
- الشعور بالتوتر والارتباك والعصبية والنعاس والارتعاش والدوار.
- ضيق النفس (النهجان).
- تغير في طعم الأشياء أو فقدان الشهية أو اضطرابات المعدة أو الهضم أو ألم بمنطقة المعدة أو الشعور بالانتفاخ والغازات أو المساك.
- الحكة والطفح الجلدي والحكة الشديدة أو الطفح الواسع (ارتكاريا) والتعرق كثيرا.
- آلام المفاصل أو آلام العضلات.
- تحاليل الدم قد تظهر نتائج غير معتادة بسبب مشاكل الكبد (ارتفاع البيليروبين) أو مشاكل الكلى (ارتفاع الكرياتينين).
- ضعف عام.

نادر (قد يصيب ١ من كل ١٠٠٠ شخص)

- سهولة الكدمات والنزيف بسبب انخفاض عدد الصفائح الدموية.
- انخفاض عدد كرات الدم البيضاء.
- رد الفعل المناعي الزائد (الحساسية الحادة).
- انخفاض مستوى السكر بالدم.

هذا مهم للأشخاص المصابين بداء السكري.

- رؤية أو سماع أشياء غير حقيقية (هلوسة وجنون الارتياب والاضطهاد) وتغير في الآراء والأفكار (ردود فعل ذهانيه) مع احتمال أن تراوده بعض الأفكار أو الأفعال الانتحارية والشعور بالاكتئاب والمشاكل العقلية والشعور بالتهيج والأحلام الغريبة والكوابيس.
- شعور بالتنميل في الأيدي والأقدام.
- مشاكل بالسمع (طنين) أو الرؤية (عدم وضوح الرؤية والزغللة).
- ضربات قلب سريعة غير معتادة (تسارع نبض القلب) أو انخفاض ضغط الدم
- ضعف العضلات. هذا مهم في الأشخاص المصابون بمرض وهن العضلات الوبيل (مرض نادر للجهاز العصبي).
- تغيرات بطريقة عمل كليتيك وفي بعض الأحيان فشل كلوي، ربما يكون بسبب رد فعل تحسسي للكلى يسمى التهاب الكلى الخلالي.
- الحمى.

غير معروف (لا يمكن تقدير تكرار حدوث تلك الأعراض من المعلومات المتاحة)

- انخفاض عدد كرات الدم الحمراء (أنيميا): قد تسبب شحوب أو اصفرار الجلد بسبب ضمور كرات الدم الحمراء أو انخفاض في عدد كل خلايا الدم (انخفاض الكريات الشامل).
- الحمى والتهاب الحلق وإحساس عام بالمرض وهي أعراض لا تزول.

قد يكون ذلك بسبب انخفاض عدد كرات الدم البيضاء.

- توقف الدورة الدموية (صدمة شبيهة بصدمة الحساسية التاقية).
- ارتفاع مستوى السكر بالدم أو انخفاض مستوى السكر بالدم مما يؤدي لغيبوبة (غيبوبة انخفاض السكر بالدم). هذه مهمة للأشخاص المصابون بمرض السكري.
- تغير في روائح الأشياء وفقدان الإحساس بالرائحة والطعم.
- مشاكل بالحركة والمشي (خلل بالحركة واضطرابات خارجية)
- فقدان الوعي المؤقت والإغماء.
- العمى المؤقت
- ضعف أو فقد السمع.
- تسارع وتيرة ضربات القلب بشكل شاذ واختلال وتيرة ضربات القلب الشديد المهدد للحياة بما في ذلك تغير وتيرة ضربات القلب (المسماة "استطالة فاصل QR" التي ترى في نشاط القلب على تخطيط القلب الكهربائي "رسم القلب").
- صعوبة التنفس وأزيز الصدر (انقباض وضيق الشعب الهوائية) ورد فعل الرئة التحسسي.
- التهاب البنكرياس.
- التهاب الكبد.
- زيادة حساسية البشرة للشمس والأشعة فوق البنفسجية (التحسس الضوئي).
- التهاب الأوعية الدموية في الجسم بسبب رد الفعل التحسسي (الالتهاب الوعائي).
- التهاب الأنسجة داخل الفم.
- تمزق العضلات وضمور العضلات (انحلال الربيدات).
- احمرار وتورم المفاصل (التهاب المفاصل).
- الألم بما في ذلك ألم الظهر والصدر والأطراف.
- نوبات البروفيريا في الأشخاص المصابينفي الأساس بالبروفيريا (مرض أيضي نادر جدا).
- صداع مستمر مع أو بدون زغللة بالعين (فرط ضغط الدم الحميد داخل القحف).

إذا أصبحت أي من هذه الآثار الجانبية خطيرة، أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المذكورة في هذه النشرة، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

٦ ..ظروف تخزين ليفوفلوكس ٥ مغ/مل

احتفظ بالدواء بعيدا عن متناول ونظر الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠ درجة مئوية وبعيدا عن الضوء.

لا تستخدم هذا الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المكتوب على العبوة الكارتونية والقارورة. تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى آخر يوم في ذلك الشهر.

لا تلقي أي دواء في مصارف المياه أو القمامة المنزلية. اسأل الممرضة أو الصيدلي عن طريقة التخلص من أي دواء لا تستعمله.

هذه الاحتياطات تساعدك على الحفاظ على البيئة.

مدة الصلاحية: ٣٦ شهر

٧. معلومات إضافية

أ. ماهي محتويات ليفوفلوكس ٥ مغ/مل :

المكون الفعال هو الليفوفلوكساسين هميهيدرات ٥١٢ مغ (٥٠٠ مغ أساس)

واحد مل من المحلول للتسريب الوريدي يحتوي على٥ مغ من ليفوفلوكس.

المكونات الأخرى هي: كلورات الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك وماء للحقن.

ب. ماهو الشكل الصيدلاني ليفوفلوكس ٥ مغ/مل ووصفه وحجم عبوته

ليفوفلوكس ٥ مغ/مل محلول للتسريب الوريدي هو سائل شفاف مصفر قليلا.

موضوع في قارورة زجاجية ذات ١٠٠مل متوفرة في عبوة واحدة.

ج.اسم و عنوان مالك رخصة التسويق والمصنع:

مختبرات ميديس – إس.إيه.
طريق تونس – كم ٧ – ص.ب ٢٠٦-٨٠٠٠ نابل – تونس.
هاتف: ٧٢٢٣٥٠٠٦ (٢١٦) فاكس: ٧٢٢٣٥١٠٦ (٢١٦)
الكتروني ب: marketing.ventes@medis.com.tn

لمزيد من المعلومات عن هذا المنتج الدوائي، يرجى الاتصال بوكيل حقوق التسويق المحلي:

مؤسسة الصالحية للتجارة (للمعدات الطبية والصناعات الدوائية)
صندوق بريد: ٩٩١ الرياض ١١٤٢١ – المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٠٩٦٦١٤٦٤٦٩٥٥ فاكس: ٠٠٩٦٦١٤٦٣٤٣٦٢

د.تم الموافقة على هذه النشرة بتاريخ " أغسطس/ ٢٠١٤" رقم النسخة "٠٠".

٨. الابلاغ عن الاعراض الجانبية :

المملكة العربية السعودية :

-المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية.

- ○ فاكس: ٧٦٦٢-٢٠٥-١١-٩٦٦ +
- ○ لاتصال بالادارة التنفيذية للتيقظ و ادارة الازمات هاتف ٢٠٣٨٢٢٢-١١-٩٦٦ + تحويلة: ٢٣٤٠ -٢٣٣٤-٢٣٥٣-٢٣٥٣- ٢٣٥٦-٢٣١٧
- ○ الهاتف المجاني: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠
- ○ البريد الالكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa
- ○ الموقع الالكتروني : www.sfda.gov.sa/npc

دول الخليج الأخرى :

- الرجاء الاتصال بالمؤسسات و الهيئات الوطنية في كل دولة.

و -ارشادات الصادرة من مجلس وزراء الصحة العرب

هذا دواء

- الدواء هو مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- ان الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وبمنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
واتحاد الصيادلة العرب

ز.تمت المصادقة على هذه النشرة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية

NO0051
V00