

ريسيكال[®]

(سلفونات بوليستيرين الكالسيوم)
مسحوق - ٣٠٠ غ

نشرة اعلامية للمريض:

الرجاء قراءة هذه النشرة قبل البدء بتناول الدواء فهي تؤمن ملخصا مفيدا للمعلومات الضرورية واللازمة حول هذا الدواء. اذا كان لديك أي اسئلة او اذا كنت بحاجة لمعلومات اضافية الرجاء استشارة الطبيب او الصيدلي.
يطلق على هذا الدواء اسم **ريسيكال** ويشكل سلفونات بوليستيرين الكالسيوم المادة النشطة فيه.

ما هو هذا الدواء؟

يتضمن **ريسيكال** ٩٣,٥ W / W من سلفونات بوليستيرين الكالسيوم اضافة الى الفانيلين، السكروز والسكرارين.

ريسيكال هو مسحوق اصفر برتقالي اللون ومعلب في حاويات من ٣٠٠ غ مع ملعقة.

ان هذا الدواء هو راتين (Resin) مبادل شوارد (Ion) الكالسيوم.

دواعي الاستعمال:

يستعمل دواء **ريسيكال** لازالة فائض معدلات البوتاسيوم من الجسم بالاخص عند المرضى الذين يعانون من مشاكل كلوية والذين يخضعون لغسيل الكلى.

قبل تناول الدواء

يجب عدم تناول / استعمال **ريسيكال** في الحالات التالية:

- معدلات بوتاسيوم البلازما اقل من ٥ ملمول / ليتر.

- حساسية تجاه راتين (Resin) بوليستيرين السلفونات.

- مرض امعائي مسد.

- فرط الدرقية (فرط نشاط الغدد الدرقية).

- الغرناوية - عقد صغيرة في انحاء مختلفة من الجسم.

- سرطان انتقالي.

- تقويم متعدد - نوع من سرطان النقي.

- قصور كلوي.

- فرط الكلسمية - فرط الكالسيوم في الدم.

الاطفال وحديثو الولادة:

يجب عدم اعطاء هذا الدواء الى حديثي الولادة عبر الفم ويجب عدم اعطاؤه ابدا الى حديثي الولادة الذين يعانون من نشاط امعائي محدود.

يجب اخذ الحذر عند اعطاء الدواء عبر المجرى المستقيمي عند الاطفال وحديثي الولادة ان قد تؤدي جرعة زائدة او جرعة مخففة غير مناسبة الى الامساك بسبب الراتين (Resin) كما يجب ايلاء عناية خاصة للرضع الخدج والرضع ذوي وزن منخفض عند الولادة.

في حال الحمل او التخطيط للحمل او الرضاعة، يجب استشارة الطبيب قبل تناول / استعمال هذا الدواء

في حال تناول ادوية اخرى قد يطرأ تغير على مفعول **ريسيكال** او على مفعول الدواء الثاني. لذا يرجى استشارة الطبيب في حال تناول التالي:

- ملينات

- مضادات للحموضة

- نيجوكسين - دواء مستعمل لمشاكل القلب

- ثيروكسين

- ليثيوم

- مواد اخرى مماثلة لل**ريسيكال**

لايجب خلط الحفنة مع السوربيتول ان قد يؤدي ذلك الى تلف جزء من المعاء

كما قد يؤدي استنشاق المسحوق الجاف الى الاصابة بالتهاب شعبي وبذات الرئة

كيفية تناول هذا الدواء:

يمكن اعطاء **ريسيكال** عبر الفم أو عبر حقنة مستقيمة
الجرعة العادية للكبار هي ١٥ غم ثلاث أو أربع مرات في اليوم يمكن اخذها مع قليل من الماء أو على شكل معجون مع شيء حلو.
يجب عدم خلط الراتين (Resin) مع هريسة الفواكه إذ تحتوي هذه الأخيرة على معدل عال من البوتاسيوم قد يطغى على مفعول الراتين (Resin). الجرعة المستقيمة العادية للكبار هي ٣٠ غم من الراتين (Resin) توضع في حقنة مع ١٠٠ ملل من الماء و ١٠٠٠ ملل من ٢٪
من محلول الميثيل سيلولوز. اذا امكن يجب الاحتفاظ بهذه الحقنة في المجرى الخلفي لمدة ٩ ساعات على الأقل. في بعض الحالات يمكن اعطاء **ريسيكال** عبر الفم وعبر حقنة مستقيمة في الوقت ذاته بغية تخفيض مستوى البوتاسيوم بشكل سريع.
اما الجرعة العادية للأطفال فيتم تحديدها وفق وزن الطفل **ريسيكال**. الجرعة اليومية هي ١ غم لكل كغم من وزن الجسم ومن الممكن تخفيض هذه الجرعة الى ٠.٥ غم يوميا لكل كغم وذلك عندما يبدأ **ريسيكال** باعطاء مفعوله. يجب اعطاء الراتين عبر الفم اما مع شراب (ليس مع هريسة الفواكه) او ممزوج على شكل معجون مع القليل من المربي او العسل. إذا لم يكن بإمكان الطفل اخذ الدواء عبر الفم يمكن القيام بذلك عبر حقنة مستقيمة مخففة كما هي الحال عند الكبار. اذا تم اعطاء الدواء عبر حقنة مستقيمة فيجب نزع الراتين عبر الغسيل فورا بعد ذلك.

لحديثي الولادة يجب اعطاء الراتين فقط عبر حقنة مستقيمة تتراوح الجرعة العادية بين ٠.٥ غم و ١ غم لكل كغم من الوزن مخففة كما هي الحال عند الكبار ويجب نزع الراتين من المجرى الخلفي عبر الغسيل فيما بعد.
كما يجب استعمال الملعقة الموجودة في العلبة وتحتوي كل ملعقة على ١٥ غم من الراتين.
يقوم الطبيب بتحديد الجرعة المناسبة وفق الحالة المرضية. في حال الشك بعد مراجعة المصاغة يجب استشارة الطبيب او الصيدلي.
اذا نسيت تناول الجرعة في وقتها المحدد فعليك تناولها فور التذكر وبعدها تناول الجرعات المتبقية في اوقاتها المحددة.
قد تشكل جرعة مفرطة من هذا الدواء خطرا على المريض.
كما يجب اعلام الطبيب على الفور او الذهاب الى اقرب مستشفى في حال تناول جرعة مفرطة.

خلال تناول هذا الدواء:

يجب قياس معدلات البوتاسيوم والمغنيزيوم الكالسيوم في الدم بشكل منتظم خلال تناول هذا الدواء إذ قد تخضع هذه المعدلات الى تغيير مفاجيء خاصة عند المرضى الذين يعانون من قصور كليوي كما قد يرتفع معدل الصوديوم في الدم قد يسبب هذا الدواء مشاكل عند

بعض الاشخاص اذ قد يؤدي الى غثيان، تقيؤ، اسهال، اضطراب امعائي وفقدان الشهية. في بعض الاحيان قد يتصلب الراتين او قد يلتصق عند اعطائه للأطفال عبر حقن مستقيمة هذا نادرا ما يحدث عند الكبار لكن في حال حدوثه قد يعني ان الجرعة قوية جدا او انها قد مزجت بشكل خاطيء. كما قد ظهرت تقرحات في الجهاز الهضمي عند عدد قليل من المرضى الذين يتناولون نوع اخر من **ريسيسود**. في حال اختبار هذه العوارض او غيرها يجب اعلام الطبيب على الفور
في حال الاسماك الحاد يجب وقف العلاج حتى انتهاء المشكلة وعدم تناول المسهلات التي تحتوي على المغنيزيوم.

يجب عدم تناول هذا الدواء بعد تاريخ الإنتهاء المذكور على العلبة.
يجب حفظ هذا الدواء بدرجة حرارة ما دون ٣٠ م وفي مكان جاف.
لا تحتوي هذه النشرة على كل المعلومات الضرورية حول الدواء. اذا كان لديك اي اسئلة او في حال الشك يجب استشارة الطبيب او الصيدلي.

تاريخ مراجعة: ٢٠٠٩/١٢

إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وأستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وبضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- احفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب
اتحاد الصيدالة العرب



Science & Nature ... For Life

شركة نهر الأردن للصناعات الدوائية ذ.م.م.
عمان - الأردن