

يحتوي كل قرص مهبلية على: كلوتريازول ١٠٠ ملغم

السواغات: نشأ الذرة، ميكروكريستالين سيليلوز، لاکتوز أحادي التميح، النشأ الجيلاتيني، جلابكولات نشأ الصوديوم،

بوليسوربيت ٨٠، بوفيدون، كروسوفيدون، ثاني أكسيد السيليكون الغروي، ستيرات المغنسيوم .

#### التأثير والتواضع:

-كلوتريازول مضاد فطري واسع الطيف، فبالإضافة الى خواصة المضادة للوحيجات الشعرية ( الترياكوموناس المهبلية)،

له نشاط فعال مضاد لبعض انواع البكتيريا موجبة وسالبة الغرام

له نشاط فعال مضاد للسعفة (خمج الجلد الفطري) والحمائر والقطريات الأخرى

#### الاستجابات الدوائية:

١. خمج المهبل الطفيلي الناجم عن الإصابة بالوحيجات الشعرية ( الترياكوموناس المهبلية)

٢. افرازات المهبل الوبائية

٣. خمج الفرج والمهبل الفطري الناجم عن الإصابة بالمبيضات الدقيقة

٤. الخمج المهلي البكتيري الناجم عن الإصابة بالبكتيريا المستنجبة للعلاج بكاناجين مثل المكورات العنقودية السحجية وغيرها

٥. لتظهير المهبل قبل الولادة ب ٤ - ٦ اسابيع

#### مضادات الاستطباب :

الحساسية الزائدة لمادة الكلوتريازول

#### الجرعة وطريقة الاستعمال:

١. طريقة العلاج لمدة ستة ايام وهي الطريقة المفضلة في حالة الخمج الفطري المتكرر او عند وجود خمج ممنوع بالمكروبات التي تستجيب للعلاج بكاناجين .

بتم ادخال قرص مهبلية واحد من كاناجين عميقاً مرة واحدة مساءً يومياً لمدة ٦ ايام متتالية. اذا تطلب الامر يمكن تكرار العلاج او زيادة الجرعة الى قرصين من

كاناجين المهبلية يوماً، فرص واحد في الصباح والاخر في المساء لمدة ٦ - ١٢ يوماً.

٢. طريقة العلاج لمدة ٣ ايام وهي الطريقة المنبغة في علاج حالات الإصابة لأول مرة

بتم ادخال قرص كاناجين عميقاً في المهبل مرة واحدة مساءً يوماً لمدة ٣ ليال باستخدام الدافعة.

#### طريقة وضع اقراص كاناجين المهبلية باستعمال انبوب الادخال:

١. اسحب المكبس A الى الخارج حتى النهاية ووضعي القرص المهبلية في الانبوب B انظر الشكل (١)

٢. ادخلي الانبوب بعناية وبه القرص داخل المهبل الى اعنى مكان ممكن. وافضل وضعية لذلك عند الاستلقاء على الظهر

ب- ادفعي المكبس A برفق حتى يتوقف وبذلك يستقر القرص في داخل المهبل في نفس الوقت ثم اخرجي انبوب الادخال من المهبل انظر الشكل (٢)

٣. اخرجي المكبس A من الانبوب B واغسليه جيداً دافئ (لا يغلي) ثم اشطفيه وجفجه جيداً

#### التأثيرات الجانبية :

١. قد تحدث في حالات نادرة تفاعلات جلدية، حرقة، لدغة او احمرار

٢. لم تسجل اية مضاعفات جانبية على الام الحامل

#### احتياطات:

١. اثناء الحمل يجب اتباع ارشادات الطبيب بدقة فيما يتعلق باستخدام الدافعة

٢. يجب توقيت العلاج بتجنب فترة الحيض وان يتم الانتهاء من العلاج قبل بدء الحيض

٣. لمنع انتكاس المرض قد يستلزم علاج الزوج بكمز الكلوتريازول خاصة اذا كانت المرأة مصابة بخمج فطري فرجي او كان الزوج مصاباً بخمج فطري ايضاً

٤. في حال عدم الاستجابة للعلاج بشكل جيد يجب اعادة النظر في تشخيص المرض

#### الاشكال الصيدلانية:

يتوفر كاناجين بالاحجام التالية:

اقراص مهبلية ١٠٠٠ ملغم ٦٠

#### إن هـذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وبمفعه وبضرره.
- إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغيه وبضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
- احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب  
اتحاد الصيادلة العرب