

CANAGYN[®]

Clotrimazol

Comprimés vaginaux

Antifongique à large spectre pour un traitement de jours.

Composition:

Chaque comprimé vaginal contient: Clotrimazole 100 mg

Excipients: Amidon de maïs, Cellulose microcristalline, lactose monohydraté, amidon Pregelatinized, glycolate d'amidon sodique, polysorbate «₁», povidone, croscopolidone, dioxyde de silicium colloïdal, stéarate de magnésium.

PROPRIÉTÉS ET ACTIONS:

- Clotrimazole est un antifongique à large spectre, il est aussi actif sur les trichomonas vaginaux.
- Il est efficace contre certaines bactéries Gram+ve et Gram-ve.
- Il est actif contre des espèces pathogènes de dermatophytes, levures et autres champignons.

INDICATIONS:

1. Trichomonas vaginalis,
2. Secrétions vaginales infectées.
3. Candidoses vulvovaginites
4. Vaginite causée par des bactéries sensibles au traitement par CANAGYN comme les streptocoques, staphylocoques et autres
5. Hygiène du vagin dans les dernières 4 à 6 semaines de la grossesse

CONTRE-INDICATIONS:

Hypersensibilité au Clotrimazole

POSOLOGIE ET MODE D'EMLOI:

1. 6 jours de traitement est le meilleur remède en cas d'infections répétées et d'infections mixtes avec des micro-organismes sensibles au Clotrim. Introduire, profondément dans le vagin, 1 comprimé vaginal pendant 6 nuits consécutives. Si nécessaire, le traitement peut être renouvelé ou la dose peut être augmentée à 2 comprimés/jour, 1 le matin et 1 le soir pendant 6 à 12 jours.
2. Traitement des infections survenues pour la première fois, traitement pendant 3 jours. Introduire deux comprimés vaginaux de CANAGYN dans le vagin pendant 3 nuits consécutives en utilisant l'applicateur.

MODE D'EMLOI DES COMPRIMÉS VAGINAUX AVEC L'APPLICATEUR:

1. Tirez le piston (A) jusqu'à ce qu'il s'arrête. Placez le comprimé vaginal dans l'applicateur (B), dessin (1).
2. A. Introduisez avec précaution l'applicateur contenant le comprimé le plus profondément possible dans le vagin. La meilleure position pour introduire l'applicateur est d'être allongée sur le dos.
B. Poussez le piston (A) avec précaution jusqu'à son arrêt. Cela placera le comprimé dans le vagin. Et après enlevez l'applicateur du vagin (dessin (2))




figure (1)



figure (2)

3. Après l'utilisation, enlevez le piston (A) de l'applicateur (B). Nettoyez-le avec de l'eau tiède (non-bouillante), rincez et séchez-le bien.

EFFETS INDESIRABLES:

1. Reactions cutanées comme la sensation de brûlure, picotement, erythème pendant l'appareil dans de rares occasions.
2. Pas d'effets indésirables notés avec l'utilisation de CANAGYN chez la femme enceinte.

PRECAUTIONS D'EMLOI:

1. Chez la femme enceinte, il faut suivre les indications du médecin concernant l'utilisation de l'applicateur.
2. A ne pas utiliser pendant ou avant les règles.
3. Envisagez un traitement par Clotrimazol crème chez le partenaire pour empêcher une ré-infection surtout s'il existe une candidose vulvite ou balanite.
4. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, il faut redéterminer le diagnostic.

PRESENTATIONS:

CANAGYN existe sous les formes suivantes:
Comprimé vaginal 100mg - 6.

This is a medication:

- A medication is a product that affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medication.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep out of reach of children.

Council of Arab Health Ministers
Union of Arab Pharmacists

Jordan River Pharmaceutical Industries L.L.C. (Amman - Jordan)
www.joriver.com



Science & Nature ... For Life