

## اكزوفين®

فيكسوفينادين هايدروكلورايد  
الوصف:

اكزوفين® اكزوفين (فيكسوفينادين هايدروكلورايد) هو المستقلب النشط من ترفينادين الذي يعتبر مضاد إنقائي لمستقبلات الهستامين H<sub>1</sub> الطرفية، يمتلك عند تناوله بالجرعات الموصى بها فاعلية سريعة وطويلة المفعول دون أن يترك أثراً مهدئاً أو مضادة للفعل الكوليnergic. خلال الدراسات السريرية، لم تظهر أية تأثيرات سامة للقلب؛ حتى عند تناوله بجرعات تفوق الجرعات الموصى بها.

### الخواص:

يتميز امتصاص فيكسوفينادين بشكل سريع بعد الجرعة الفموية ويرتبط بنسبة ٦٠ - ٧٠٪ ببروتينات المصل. لا يتم استقلاب فيكسوفينادين في الكبد.

يتم طرح فيكسوفينادين غالباً في الصفراء و ١٠٪ من الجرعة المعطاة تطرح بشكل دواء غير متحول في البول.  
يلغى عمر نصف الطرح لفيكسوفينادين ١١ - ١٥ ساعة بعد تناول الجرعة بشكل متكرر.  
دوعي الاستعمال:

اكزوفين® ١٢٠ ملغم: المعالجة العرضية لإلتهاب الأنف التحسسي الموسمي عند البالغين والأطفال فوق عمر الثانية عشرة.  
اكزوفين® ١٨٠ ملغم: المعالجة العرضية للحكمة المترافق مع الشرى المزمن عند البالغين والأطفال فوق عمر الثانية عشرة.  
الجرعات وطريقة الاستعمال:

### البالغون والاطفال فوق عمر الثانية عشرة:

اكزوفين® ١٢٠ ملغم: ١٢٠ ملغم يومياً كجرعة مفردة (قرص اكزوفين® ١٢٠ ملغم مرة واحدة يومياً).  
اكزوفين® ١٨٠ ملغم: ١٨٠ ملغم يومياً كجرعة مفردة (قرص اكزوفين® ١٨٠ ملغم مرة واحدة يومياً).  
موانع الاستعمال:

- المرضى الذين يعانون من فرط حساسية معروفة لأي من المكونات.
- الأطفال تحت عمر الثانية عشرة، لعدم وجود معلومات عن مدى فاعلية وسلامة الدواء عند هؤلاء الفتية من المرضى.  
محاذير الاستعمال:

يجب إعطاء فيكسوفينادين بحذر لكبار السن والمرضى البالغين الذين يعانون من قصور في وظائف الكلى أو الكبد، وذلك لوجود معلومات محدودة لمعظم الأدوية الجديدة عند هؤلاء الفتية من المرضى.  
الاستعمال خلال فترة الحمل والإرضاع:

### فترة الحمل ج

يفضل من باب الاحتياط عدم إستعمال فيكسوفينادين أثناء فترة الحمل.

لم يثبت حدوث أي تشوّهات خلقية في الدراسات على الحيوان. لعدم حدوث أي تشوّهات خلقية في الحيوان، فإن احتمالية حدوث تشوّهات مميّة في الإنسان غير واردة. لا يوجد معلومات سريرية مؤكدة لتقييم التأثير المشوب على الجنين أو السمية التي يحتمل أن يسبّبها فيكسوفينادين عند تناوله أثناء فترة الحمل.  
لا ينصح بتناول فيكسوفينادين من قبل الأم المرضع.

لا يوجد معلومات مؤكدة ما إذا كان فيكسوفينادين يفرز في حليب الأم. ومع ذلك، فإن فيكسوفينادين تم كشفه في حليب الأم بعد إعطاء ترفينادين للأم المرضع.

#### التدخلات المواتية:

المجموع على المونتلهي التي تستلزم الحيوطة عند تناولها:

مضادات الحموضة: تقلل من إمتصاص فيكسوفينادين من الجهاز الهضمي. يجب عدم تناول فيكسوفينادين مع مضادات الحموضة في آن واحد (إذا أمكن، على الأقل ساعتين قبله أو بعده).

المجموع على المونتلهي التي يجبأخذها بعين الاعتبار:

• إيربئرومايسين: يزيد التوازن الحيوي بسبب زيادة الإمتصاص المعيوي وإنخفاض التصفية الصفرافية.

• كيتوكونازول: يزيد التوازن الحيوي بسبب زيادة الإمتصاص المعيوي وإنخفاض إفرازات الجهاز الهضمي.  
ملحوظات للمربيين:

• لم يلاحظ حدوث تفاعلات سريرية ذات أهمية (مثل، تأثير في فترة QT) بعد تناول فيكسوفينادين بشكل متزامن مع إيربئرومايسين أو كيتوكونازول.

• يظهر أن التفاعلات التي تم تسجيلها هي ذات طابع يختص بحركة الدواء في الجسم فقط لإزدياد التوازن الحيوي لفيكسوفينادين.

#### الأعراض الجانبية:

إن معظم الأعراض الجانبية التي تم تسجيلها في الدراسات المحكمة هي صداع، دوار، غثيان ودوخة. إن نسبة حدوث مثل هذه الأعراض مع فيكسوفينادين كانت مشابهة لنسبة حدوثها في الدواء الكاذب.

في حالات نادرة، تم تسجيل حدوث طفح جلدي، شرى، حكة وتفاعلات فرط حساسية تتضمن وذمة وعائية، ضيق في الصدر، عسر في التنفس، إحمار وتحسس جهازي.

#### فرط الجرعة:

الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة التسمم المفرط:

• معالجة عرضية.

• مراقبة الوظائف الحيوية.

إن فيكسوفينادين غير قابل للذلة. لا يوجد ترباق معروف.

#### ظروف الحفظ:

اكزوفين® ١٢٠: يحفظ حتى ٣٠° م.

اكزوفين® ١٨٠: يحفظ حتى ٣٠° م.

#### كيفية التزود:

اكزوفين® ١٢٠: كل قرص مغلف يحتوي على ١٢٠ ملغم فيكسوفينادين هايدروكلورايد في عبوات سعة ١٥ قرصاً.

اكزوفين® ١٨٠: كل قرص مغلف يحتوي على ١٨٠ ملغم فيكسوفينادين هايدروكلورايد في عبوات سعة ١٥ قرصاً.

عبوات المستحببات متوفرة أيضاً

إن هذا دواء

ـ الدواء منحضر يوزع على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

ـ إن الطبيب والميدالي، بما يغيران بالدواء وبنقاشه وضرره.

ـ لا تقطع هذه الملاجىء المحددة ذلك من تقام نفسك.

ـ لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

ـ احفظ الدواء بعيداً عن متناول الأطفال.