

[illegible]

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل أخذ رينغيبلا
موانع الاستعمال
لا تأخذ رينغيبلا إذا
كانت تعاني من حساسية ضد المادة الفاعلة أو ضد أي
مكون آخر من مكونات هذا الدواء (المذكورة في القسم 4).
كانت تتناول الكونسلات في نمك متخلطة (سوف يتفاعل هيدوكسي
كلوروكين مع السند في الأمعاء
تحذيرات واحتياطات
تحدث إلى طبيبك قبل أخذ رينغيبلا إذا كانت إحدى الحالات أدناه تطبق عليك:
مشاكل في البع، يمكن أن يصف طبيبك رينغيبلا معوق
لتجنب مستقبل قصير
مشاكل في الحركة (المزعة) في معتك وألمك
المرض في كل من الأجزاء
التهاب فاعل في الأمعاء
يمكن استعماله لدى المرضى الذين يخضعون لفصل الدموي
(غير استعمال أثناء فترة الحمل أو عند الثدي المرضي)
عندما يتم صنع سائل في داخل العين ويقوم عدسة
داخلية في الجسم بخصية الدم)
• المرضى المسنين بمرض كلوي مزمن (طويل الأمد)
ولكن لا يخضعون لفصل الكلى ويكون مستوى فوسفور
المصل (الدم) لديهم مساوياً لـ 7.82 مللغ/ل أو أعلى.
يجب استعمال هذا الدواء مع علاجات أخرى مثل مكملات الكالسيوم
والفيتامين د لمنع الإصابة بمرض في العظم.
يمكن أن تؤدي زيادة مستويات فوسفور الدم إلى تشنجات
عضلية في جسدك، أحياناً تشنجات. يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى
تصلب أوتار عصبك، المصنوعة من بعض عضلات ضيق الدم في جميع أنحاء
الجسم. ويمكن أن تؤدي أيضاً زيادة مستويات فوسفور الدم إلى حكة جلدية
وإحمرار العينين وألم العظم وكسور العظم.

• الخضوع لجراحة كبيرة في المعدة أو الأمعاء تحدث إلى طبيبك وأنت تأخذ ريفيتا؛

• إذا أصبت بآلام حادة في البطن أو بانتفاخات في المعدة أو الأمعاء أو دم في البراز (نزيف معدي معوي)، يمكن أن يكون سبب هذه الأعراض مرض التهاب أمعاء خطير ناتج عن رواسب بوليتا بيفالامين في أمعائك. اتصل بطبيبك الذي يهتزم بمواصلة العلاج أو لا.

العلاجات الإضافية

إذا سبب حالة كليكيب أو علاج غسيل الكلى الذي تخضع له يمكن أن:

• تتخفف أو تزداد مستويات الكالسيوم في دمك، بما أن هذا الدواء لا يحتوي على الكالسيوم، قد يصف لك طبيبك فوسفاتاً إضافية من الكالسيوم.

من هذا الخطر عبر الالتزام الدقيق بقرائات التعقيم خلال تغيير الأكياس، يجب أن نعلم طبيبك على الفور إذا أصبحت بأي إشارات أو أعراض جديدة مثل تلك المعوي أو انتفاخ البطن أو ألم البطن أو إيلام البطن عند لمس أو تصطب البطن أو الإسهال أو الحمى أو الصداع أو الغثان أو التقيؤ.

الأطفال
لم تتم دراسة السلامة والفعالية لدى الأطفال (أولئك الذين هم من 1 إلى 11 سنة). لذلك لا يوصى باستخدام هذا الدواء لدى الأطفال الذين هم من 1 إلى 11 سنة.

أدوية أخرى وريفيليا
أعلم طبيبك إذا كنت تأخذ حاليًا أو أخذت مؤخرًا أو قد تأخذ أي أدوية أخرى.

١٠ • الأدوية التي تعالج حرقه المعدة وارتجاع المعدة أو المريء، مثل أوميبرازول أو بانتوبرازول أو لاسوبرازول المعروفة بـ"مضادات حموضة البروتين"، يمكن أن تعد من فعالة رينيفيل. يمكن أن يراقب طبيب مسكني السموم والتسممات في دمك، سوف يتحقق طبيبك من أي تفاعلات بين رينيفيل وأدوية أخرى بشكل منتظم.

في بعض الحالات التي ينبغي فيها أخذ رينيفيل في الوقت ذاته مع دواء آخر، قد يتسبب طبيبك بأخذ هذا الدواء قبل ساعة من أخذ رينيفيل أو بعد 3 ساعات من أخذه، أو قد يفكر أيضا في فحص مستويات ذلك الدواء في الدم.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملا أو مرضعة، أو كنت تعتقدن نفسك حاملا أو كنت تخططين للحمل، استشري طبيبك قبل أخذ هذا الدواء.

23 ملغ) في القصر، أي أنه "خالٍ من السوديوم" بشكل أساسي.

3. كيف تؤخذ رينفيللا
يجب عليك أن تأخذ رينفيللا وفقاً لوصفة طبيبك. سوف يحدد الطبيب الجرعة وفقاً لمستوى فوسفور الدم لديك.

تبلغ الجرعة الموصى بها من أفراص رينفيللا للبالغين والمسنين فرضاً إلى فرضين من 800 ملغ مع كل وجبة طعام، 3 مرات في اليوم. تحقق مع الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة إذا لم تكن متأكدًا.

خذ رينفيللا بعد وجبتك أو مع الطعام.

يجب بلع الأقراص كاملة، لا تسحقها أو تسحقها أو تكسرها.

إذا توقفت عن أخذ ريفيلا
إن أخذ علاج ريفيلا مهم للحفاظ على مستوى مناسب من
الفيروسات في دمك، إن التوقف عن أخذ ريفيلا يؤدي إلى
نتائج مهمة مثل التلصق في الأوعية الدموية. إذا فكرت
في إيقاف علاج ريفيلا الذي تأخذه، اتصل بطبيبك أو
بالمستشفى أولاً.

إذا كان لديك أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء،
اسألها على الطبيب أو الصيدلي.

4. **التأثيرات الجانبية المحتملة**
مثل الأدوية كلها، يمكن أن يسبب هذا الدواء تأثيرات
جانبية لا تصيب المرضى كلهم.

• **أفيد عن انسداد الأمعاء (تضيق العوارض):** الانتفاخ الشديد وآلم البطن والقيء والتورم والتشنجات والامساك الشديد). عدد مرات الحصول غير معروف (لا يمكن تقدير عدد مرات الحصول من البيانات المتوافرة).

• **أفيد عن شقوق في جدار الأمعاء (تضيق العوارض):** ألم المعدة الحاد والقيء والغثاس والحمى والغثاس والقيء أو ألم البطن عند لمس). عدد مرات الحصول غير معروف.

• **أفيد عن التهاب خطير للأمعاء الغليظة (تضيق العوارض):** ألم البطن الشديد؛ اضطرابات معدية أو معدية، أو دم في البراز (إزيف معدى معوي) ورواسب بظفر في الأمعاء. عدد مرات الحصول غير معروف.

هذا على أي تأثيرات جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة.

بالإبلاغ عن التأثيرات الجانبية، تساهم في تزويد المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

5. كيف يُحفظ رينفيليا

يُحفظ هذا الدواء بعيداً عن نظر الأطفال ومناولهم. لا تستعمل هذا الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية المدون على الزجاجة وعلبة الكرتون بعد الأهراف "EXP". يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم

6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

ماذا يحتوي رينفلا

- المادة الفاعلة هي سيفلامير كربونات. يحتوي كل قرص مغلف على 800 ملغ من سيفلامير كربونات.
- المكونات الأخرى هي سلولوز دقيق البلورية وكلوريد الصوديوم وستيرات الزنك، يحتوي غلاف القرص على هيدروميلوز (إي 464) وأحادي الغليسريد الثلاثي الأسيتيل.

كيف هو شكل رينفلا ومحتويات العلبة

أقرص رينفلا المغلفة هي أقرص بيضاوية بيضاء مطور عليها RV800 على جهة واحدة، الأقرص موشية في زجاجات إيثيلين متعدد عالي الكثافة مع غطاء من مادة البولي بروبيلين وختم تعريفي.

أحجام العب:

تحتوي كل زجاجة على 30 قرصاً أو 180 قرصاً.

عب من زجاجة واحدة من 30 أو 180 قرصاً (ما من عبية كربوتية خارجية) وعبية متعددة تحتوي على 180 (6 زجاجات من 30) قرصاً.

قد لا تكون أحجام العلب ميسّرة.

تتمت مراجعة هذه النشرة للمرة الأخيرة في: حزيران/يونيو 2023

1105 BP Amsterdam
The Netherlands

المصنع
Sanofi Winthrop Industrie
1 rue de la Vierge
Ambarès et Lagrave
33565 Carbon Blanc cedex
France

ان هذا الدواء

مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر .

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك .

- * الطبيب والصيدلي هما الخياران في الدواء وفي نفعه وضرره .
- * لا تضلع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .
- * لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب .
- * لا تترك الادوية في متناول الاطفال .

مجلس وزراء الصحة العرب
 واتحاد الصيدالوج العرب