

Composition: Contient 27 mg de bromhydrate de dextrométorphane par 15 ml de sirop.

Excipients: Saccharose, acide citrique anhydre, parahydroxybenzoate de méthyle, arôme liquide d'orange, éthanol à 96 pour cent et eau purifiée.

Forme Pharmaceutique: Sirop.

Catégorie Pharmaco-thérapeutique: DIACOL est un antitussif.

Indications: DIACOL est utilisé comme soulagement temporaire de la toux non-productive causée par l'irritation des voies respiratoires supérieures et inférieures.

Contre-indications: Les contre-indications sont les maladies ou les situations dans lesquelles un certain médicament ne doit pas être administré.

DIACOL est contre-indiqué dans les cas d'allergie (hypersensibilité) à l'un de ses constituants. Il ne doit pas être utilisé en cas de toux avec expectoration. Ne pas administrer si vous faites du traitement avec des médicaments appartenant à la classe des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (MAO).

Effets indésirables: Effets indésirables sont ceux effets qui peuvent survenir quand on administre un certain médicament. Les effets indésirables du DIACOL sont rares, se manifestant, parfois, par des troubles légères au niveau du tractus gastro-intestinal, tels que nausées, vomissements, douleurs abdominales, étourdissements et vertiges.

Interactions: On appelle interaction l'influence qu'un certain médicament peut avoir sur les autres médicaments ou sur le résultat des analyses.

Ne pas utiliser simultanément DIACOL et inhibiteurs de la monoamine-oxydase (MAO). Il faut respecter une période de 14 jours entre l'arrêt des inhibiteurs de la MAO et l'introduction du DIACOL.

Si vous faites du traitement avec des médicaments déprimeurs du système nerveux central, leurs effets peuvent être majorés dû à l'administration de DIACOL.

Le risque d'apparition d'effets adverses est accru quand on administre simultanément la quinidine, la fluoxétine, la paroxétine et la venlafaxine et le DIACOL.

Précautions spéciales d'utilisation: Utiliser avec précaution chez les patients avec de l'asthme bronchique ou des allergies. Aussi chez les malades débilisés ou ayant maladie hépatique. Si la toux se maintient plus d'une semaine, ou si elle réapparaît ou se fait accompagner de fièvre élevée, éruption cutanée, ou céphalées intenses, il faut consulter le médecin.

DIACOL contient 121,64 g de saccharose par 200 ml de sirop. Une dose de 15 ml contient environ 9,1 g de saccharose. Ne pas utiliser chez les patients ayant d'intolérance héréditaire au fructose,

syndrome de malabsorption de glucose-galactose ou déficience de saccharase-isomaltase.

DIACOL contient 2,75 g d'éthanol à 96% par 200 ml de sirop. Une dose de 15 ml contient, environ, 0,20 g d'éthanol à 96%. Il peut être nuisible pour les patients qui souffrent d'alcoolisme, maladie hépatique, épilepsie, maladie ou traumatisme cérébral, et aussi chez la femme enceinte et enfants. Il peut altérer ou majorer l'effet d'autres médicaments.

MISES EN GARDE: Grossesse et allaitement: DIACOL n'est pas recommandé au cours de la grossesse et allaitement.

Effets sur la capacité de conduite et d'utiliser des machines: Dans les doses recommandées on n'a pas rapporté des interférences.

Posologie et mode d'administration: Sauf indication médicale en contraire, on administrera DIACOL comme suit:
Adolescents, sujets âgés et adultes: 15 ml chaque 6 ou 8 heures. Dose journalière maximale de 60 ml.

Enfants de 2 à 12 ans: posologie selon indication médicale. Entre les 6 et 12 ans, la dose journalière maximale est 30 ml, et entre les 2 et 6 ans, la dose journalière maximale est 15 ml.

Enfants âgés moins de 2 ans: on ne recommande pas son utilisation.

DIACOL peut être administré chaque 4 heures, en réduisant la quantité de sirop par prise, de façon à ne pas excéder la dose journalière maximale.

Ne pas excéder les doses recommandées ni utiliser continuellement pendant de longues périodes.

Le sirop peut être ingéré pur ou dilué dans un peu d'eau.

SURDOSAGE OU INTOXICATION : En cas d'ingestion excessive de DIACOL il faut aller immédiatement au Centre de Santé plus prochain. On peut observer des altérations digestives ou au niveau du système nerveux et cela exige surveillance et traitement urgents.

Avis: DIACOL contient du saccharose et éthanol (voir précautions spéciales d'utilisation).

DIACOL est un médicament de vente sans prescription médicale. En cas de survenue d'effets indésirables non mentionnés dans cette littérature informez le médecin ou le pharmacien. Tenir hors de portée des enfants.

Vérifiez la date de péremption du médicament.

Présentation: DIACOL est présenté en flacons de 200 ml de sirop.

Sans prescription médicale.

Date de révision de la notice: JUIN/01.