

49

۱۸

- | | |
|---|--|
| <p>انها قد تكون حاماً او تحيط للإدخاب، فاستثيري الطبيب او الصيدلي قبل تناول هذا الدواء</p> <p>القيادة واستخدام الآلات</p> <p>قد يكون لأجمنتين اثار جانبية وأعراض قد تجعلك غير مؤهل للقيادة.</p> <p>تجنب قيادة السيارات او تسيير الآلات الا إذا كنت على ما يرام.</p> <p>يحتوي أجمنتين على الاسبرتام، كحول البنزيل والمالتوكسترين:</p> <ul style="list-style-type: none"> يحتوي أجمنتين على الاسيتراتم (E951) وهو مصدر للبنزيل الابن، وقد يضر هذا بالاطفال الذين يتناولون مصايبن مرض يطلق عليه "بيلة البنزيل الكيتوينية". بيلة البنزيل كيتوين (PKU)، وهو اضطراب وراثي نادر يظهر في البنزيل الابن ينراكم لأن الجسم لا يستطيع ازالته بشكل صحيح. يحتوي أجمنتين على أكثر من كحول البنزيل. قد يسبب كحول البنزيل ردود الفعل التحسسية. تم ربط كحول البنزيل بخطر الآثار الجانبية الشديدة بما في ذلك مشاكل في التنفس ("تسمى "متلازمة المثلث") عند الأطفال الصغار. لا تعطيه لطفلك حديث الولادة (حتى عمر ٤ أسابيع)، إلا إذا كان أوصي به طبيبك. لا يستخدم لأكثر من أسبوع عند الأطفال الصغار (أقل من ٣ سنوات) إلا إذا نصحك طبيبك أو الصيدلي. يحتوي أجمنتين على مالتوكسترين (جلوكوز)، وإذا كان الطبيب قد أخبر الوالدين أن الملل العصبي يمكنه أن عدم تحمل بعض السكريات، يجب استشارة الطبيب قبل تناول هذا المنتج الواني. | <p>62000000089771</p> <p>GSK</p> <p>نشرة العبوة: معلومات المستخدم</p> |
|---|--|

٢ طریقة اعطاء اوجمنتين

- باعتراضه هذا الدواء دافعاً بالطريقية التي يوصي بها الطبيب أو الصيدلي بالضبط. وينبع انتشار المرض بين الأطباء والصيادلة في حالة مذاكر ذلك من طرفة الاستعمال.

لابد من التأكيد على أن كيلوجراماً واحداً يعادل المليون للآباء والأطفال ومن زنهم كيلوجراماً أو أكثر. انتشار المرض بين الأطباء والصيادلة يعود إلى انتشار المرض بين الآباء والأطفال ومن زنهم كيلوجراماً أو أكثر.

حسب جميع الجرعات على أساس وزن الطفل بالكيلوجرامات.

- رسوف يوضح الطبيب حرمة الأموال ممتلكات التي يجب اطلاعها للمضيع أو الطفل. كما قد تتوفر ملحة أو كوب لغليسيرول المرة أو حفنة، وينبغي استخدامها لإعطاء المرضي والطفل المرة الصادحة. حرمة الموصى بها: أو مجم ١٥٦ مجم / مل - ٢٠ مجم / مل من المعلق / كجم / يوم (٤،٨) أو مجم ١٥٠ مجم / كجم / يوم (٤،٦) من المعلق / كجم / يوم (٤،٩) تعطى على ثلاث

مقدمة جرارات

قد يقلل الطبيب الجرعة إذا كان الطفل يعاني من مشكلات بالكلية

- الطيب ترکیباً مختلفاً أو دواء آخر.
إذا كان المطلوب علاج من مشكلات بالكيد فقد يخضع لإجراءات تحاليل الدم بشكل أكثر
وكثراً للكشف على وظائف الكبد.

يجب تناول الجرّعات على فترات زمنية متساوية خلال اليوم، م

- يجب عدم تأول جرعتين خلال ساعتين واحدة، ويفضل اعطاء الطفل اوجنتين على الاقل، يجب عدم تأول جرعتين خلال ساعتين والاخر؛ ساعتان على الاقل.

ي حاله إعطاء الطفل جرعة رانده من أو جمليس، قد تتضمن العلامات المعدة (شمعة بالغثيان أو التعب أو الإمساك) أو تشنج ضبط اب فـ.

- طبيعته في سرع وفت، كما يجبأخذ زجاجة الدواء رعايتها على الطبيب.**

في حالة نسيان إعطاء الطفل حرجمة عصبية، يجب أخذ جرعة الدواء رعايتها على الطبيب.

حالات نسيان إعطاء الطفل حرجمة عصبية، يجب أخذ جرعة الدواء الثانية بعد ذلك مباشرة، بل انتظر حوالي 4 ساعات قبل إعطاء جرعة الدورة الثالثة. لا تتكرر جرعة مضاعفة لتعويض الدورة الفائتة.

٦٣ توقف الطفل عن تناول أوجمنتين

- موجب موصولة إعطاء الطفل أوجنتين حتى استكمال العلاج، حتى في حالة الشعور بضرر التخسيس. ينصح بتحايل على كل حرج عن مسامحته على مقاومة العدو. إذا نجح بعض المقربين بذريعة أنهم يقتربون باقتصاد في عودة العدو مرة أخرى، فما زلت أعتقد أن المقربين يذريعون بأسباب أخرى. ما زلت أعتقد أن المقربين يذريعون بأسباب أخرى. ما زلت أعتقد أن المقربين يذريعون بأسباب أخرى.

الآثار الجانبية المحتملة

- مثله مثل جميع الأدوية، يمكن أن يتسبب هذا الدواء في حدوث أثار جانبية، لكن ليس بالضرر أن يصاب بها جميع الأشخاص. ويمكن أن تحدث الآثار الجانبية التالية عند تناول هذا الدواء:

الحالات التي تتطلب انتباه لها:

 - الحالات الحساسية:
 - المفاجئ الحادى
 - التهاب الأوردة المدموية (الانهاب الوعائى) الذي يمكن أن يظهر على هيئة بقع بارزة حمراء أو رجوانية على الجلد، كما يمكن أن تصيب الأجزاء الأخرى من الجسم.
 - الحمى أو المغافض أو توسيم العدد بالرفقة أو الأبطأ أو الأربيبة.
 - التقرن الذي يصيب الوجه أو الحلق أحياناً (الرنمة الوعائية) مما يؤدي إلى صعوبة التنفس.
 - إغماء.
 - الالم في الصدر يمكن أن يكون علامة على رد فعل تحسسي خطير محتمل تسمى متلازمة كوكسون.
 - يجب احتساب بالطبع على الفور إذا أصيب الطفل بأى من هذه الأعراض. وتوقف عن تناول أى جنطين.

١ معلومات عن أوجمنتين ودواعي استعماله

- إن أوجتنين هو أحد المضادات الحيوانية الذي يقضي على البكتيريا التي تسبب العدوى. ويحتوي على دوائين مختلفين هما الأموكسيسيللين وحمض الكلافلاتيك، وبتهي الأموكسيسيللين إلى جماعة الأدوية التي تسمى "فينسلينات" والتي يمكن إيقاف تأثيرها على بعض الأحيان (إيقاف نشاطها). بينما يعدل المكون النشط الآخر (حمض الكلافلاتيك) على منع إيقاف تأثير الأموكسيسيللين.

ويُستخدم أوجتنين لعلاج الرضع والأطفال من أنواع العدوى التالية:

 - عدوى الأذن الوسطى والعدوى الجيبية
 - عدوى الجهاز التنفسي
 - عدوى المسالك البولية
 - عدوى البشرة والأنسجة الرخوة بما في ذلك التهابات الأسنان

٢ المعلومات الواجب الاطلاع عليها قبل إعطاء أو جمتنين

- لا يجوز إعطاء الطفل أوجمتنين في الحالات التالية:**

 - إذا كان الطفل يعاني من الحساسية تجاه أموكسيسيلين أو حمض الكلافولازيك أو البنسلين أو غير ذلك من مكونات الماء (الماء) حساسية تجاه أي مضادات حيوية أخرى.
 - إذا أصيب الطفل سفراً بتفاعلات حساسية تجاه أي مضادات حيوية أخرى.
 - ويمكن أن يتضمن هذه التفاعلات الفحص الجاهي أو فحص الماء أو الحقن.
 - إذا عانى الطفل من قبل من مشكلات بالكبد أو اليرقان (اصفرار الجلد) عند تناول مضادات الحيوية.

لا يجوز إعطاء أوجمتنين للطفل إذا انطبقت عليه أي حالة من الحالات المذكورة

أعلاه، وإذا كنت غير متأكد يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء أوجمتنين للطفل.

تحذيرات واحتياطات

- التأليف:** ينتهي مراجعه الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة قبل إعطاء أوامنهنن للطفل، في الحالات التالية:

 - إذا كان يعاني من الحمى العقدية
 - إذا كان يتعالج من مشكلات في الكبد أو الكلى
 - إذا كان لا يلتقط بالأنظمة
 - إذا كان لديه متلازمة غير ملائكة في ظاهرها
 - إذا كان يتناول أدوية قد تؤدي إلى اضطرابات في امتصاصه أو امتصاص الماء
 - في بعض الحالات، يجب تأخير الطبيب نوع التكثيريا التي تسبب العدوى لدى الطفل.

الوقاية: يمكن احتفاظ الطبيب ببعض الماء في مكعبات مبردة، قد يستخدمه في حالات الطوارئ.

قد يزيد أو يحتمل من تفاقم بعض الحالات المرضية الحالية أو قد يسبب أثراً جانبياً خطيراً، ولهذه هذه الأعراض تفاعلات الحساسية والتشنجات (التواب)، الما في الاتهام الخطأة، والذالك يجب تزويق بعض الأعراض المحددة آثاراً خارجية للأرجمنتنين تقليل خطورة تعريضه لأي مشكلات. نظر "حالات بنيغي الاتهام لها

القسم ٢ .

